





† K281
.R4
V.23



ICONES
FLORAE GERMANICAE ET HELVETICAE

SIMUL

PEDEMONTANAE, LOMBARDOVENETAЕ, ISTRIACAE, DALMATICAЕ, HUNGARICAЕ,
TRANSsylvanicaЕ, BORUSSICAЕ, DANICAЕ, BELGICAЕ, HOLLANDICAЕ, ALSATICAЕ,

ERGO

MEDIAE EUROPAE.

ICONOGRAPHIA ET SUPPLEMENTUM AD OPERA WILLDENOWII, SCHUMMEREI, PERSOONII,
DECANDELLII, GAUDINI, KOCHII, ALIORUMQUE

NUPERRIME DETECTIS NOVITIIS ADDITIS

EXHIBENS

COLLECTIONEM COMPENDIOSAM IMAGINUM CHARACTERISTICARUM OMNIUM GENERUM ATQUE SPECIERUM

IN

FLORA GERMANICA EXCURSORIA

RECENSITARUM

AUCTORIBUS

L. REICHENBACH ET H. G. REICHENBACH FILIO.

VOLUMEN XXIII.

AUCTORE

F. G. KOHL.

GERAE

SUMPTIBUS FRIEDERICI DE ZEZSCHWITZ.

1898 — 1899.

ONAGRACEAE, MYRIOPHYLLACEAE, HIPPURIDACEAE,
CERATOPHYLLACEAE, LYTHRACEAE, CRASSULACEAE,
SAXIFRAGACEAE, ADOXACEAE, GROSSULARIACEAE,
ARALIACEAE

IN

FLORA GERMANICA RECENSITAE.

AUCTORE

F. G. KOHL.

TABULAE AENEAE CXLIII.

LIBRARIUS
N. 10
BOTANICUS
GARDEN.

GERAE.

SUMPTIBUS FRIEDERICI DE ZEZSCHWITZ.

1898—1899.

ONAGRACEAE Juss.

Herbae v. frutices. Folia opposita v. alterna, simplicia, penninervia, integra, integerrima v. serrata, epunctata, exstipulata. Flores perfecti, regulares v. rarius irregulares, nunc axillares solitarii, nunc in racemos sive spicas dispositi, saepe fugaces. Calyx herbaceus v. coloratus, tubo cum germine connato, saepissime longe ultra germen producto, limbo quadripartito, rarius tri-v. bipartito, lobis aestivatione valvatis, persistentibus seu deciduis. Corollae petala summae calycis fauci, tori lamina aequaliter marginatae v. in glandulas plus minus manifestas tumentis inserta, ejusdem laciniis numero aequalia et alterna, magis aut minus distincte unguiculata, interdum emarginata v. bifida, aestivatione contorta v. decidua. Stamina cum petalis inserta nunc iisdem numero aequalia et alterna, nunc dupla, uni-biseriata, rarissime uno v. altero sterile petaliformi petalis pauciora. Filamenta filiformia v. subulata, libera. Antherae introrsae, biloculares, erectae v. incumbentes, longitudinaliter dehiscences.

Germen inferum v. semiinferum (Trapa), saepe tori margine glanduloso coronatum, plerumque quadriloculare, rarius biloculare. Gemmulae in loculis plurimae, angulo centrali insertae, rarius paucae v. subdefinitae, adscendentes v. pendulae, anatropae. Stylus filiformis; stigmata loculorum numero, linearia, intus papillosa, rarius coalita. Fructus capsularis v. baccatus, rarius nucamentaceus, quadri-v. bilocularis, interdum septis oblitteratis unilocularis, loculicide v. septicide dehiscens, valvis medio septiferis, v. columna seminifera demum libera, angulis septante. Semina plurima, rarius abortu paucæ v. solitaria, adscendentia seu pendula. Integumentum crustaceum v. membranaceum, aequabile aut in aliam productum, nunc ad chalazam apicalem in marginem membranaceum fimbriatum v. in eam producto v. integumento in parte superiore spongioso incrassato. Embryo exalbuminosus, orthotropus. Cotyledones foliaceae v. subcarnosae, basi saepe biauriculatae v. valde inaequales, altera maxima crassissima; farinosa, altera minima, squamulaeformis, paullo demissius inserta. Radicula conica, cylindrica v. levissime incurva, supera aut infera, hilo proxima, rarius centripeta.

- | | |
|--|----------------------|
| 0. Plantae terrestres vel ripariae | 1. |
| 0. Plantae aquaticae vel palustres, perianthum et stamina quaternata | 4. |
| 1. Flores diandri calyce bipartito, corolla dipetala alba | 4. Circaea. |
| 1. Flores octandri | 2. |
| 2. Flores lutei | 2. Oenothera. |
| 2. Flores albi v. rubri | 3. |
| 3. Semina pappo piloso coronata | 1. Epilobium. |
| 4. Folia ovoidea; in aquis vel | 3. Isnardia. |
| 5. Folia natantes rhomboidea. Plantae aquaticae. Fructus spinæ e sepalis | 5. Trapa. |

A. *Epilobium* L.

Herbae perennes v. annuae, pro maxima parte uliginosae umbraticolaeque, caulibus ramisque teretibus v. angulatis, simplicibus v. ramosis. Folia alterna v. sparsa, v. opposito-decussata, rarius verticillata, integra, penninervia, integerrima v. dentata, floralia caulinis similia v. ad bracteas parvas reducta. Calyx gamophyllus ad ovarii apicem circumscissus, deciduus; laciniis per aestivationem volutatis. Flores ut supra demonstravimus. Corolla cruciata, esplanata v. infundibuliformis. Petala 4. Stamina 8, 4 longiora, exteriora petalis alterna calycis tubo inserta, 4 breviora, interiora, petalis opposita calycis fauci inserta. Filamenta filiformia, saepe basi dilatata. Stylus stamina superans. Stigmata 4, cruciata vel ad clavam s. caput conglutinata. Ovarium inferum, lineare, tetragonum, quadriculcum. Suleis cum dissepimentis alternantibus, quadriloculare. Ovula anatropa, superposita, in singulis loculis numerosa uniseriata. Capsula linearis, obtuse tetragona pedicellata, quadrisulca, in rostrum asperum breviter attenuata, quadrilocularis, polysperma. Valvae lineares e medio septiferae, dehiscencia per acta persistentes, divergentes, arcuatae. Columna placentifera, membranacea compressa, demum libera decidua angulis septante. Semina adscendentia superposita parva, obovoidea v. m. m. fusiformia, torso convexa, facie complanata et raphi longitudinali carinata unita, laevia v. papillosa, apice rotundata v. attenuata et saepe ad chalazam appendiculo membranaceo pellucido aucta. Testa exterior coriacea, interior membranacea tenuis, ad chalazam apicalem ad comam. — saepe per appendiculum pellucidum producta. Embryo semini conformis, orthotropus, exalbuminosus, dimidio major embryone. Coma e pilis sericeis albitis formata.

Dispositio.

Sect. I. **Chamaenerion.**

Foliis flaccidis transversim reticulato-venosis, racemo superne bracteato, seminibus glaberrimis:

E. angustifolium L.

Foliis linearibus v. lineari-lanceolatis rigidis aveniis, racemo bracteato, seminibus papillosis:

E. Dodonaei Vill.

Foliis lanceolatis rigidis aveniis v. subvenosis, racemo foliato, seminibus glaberrimis:

E. latifolium L.

Sect. II. **Lysimachion.**

Div. I. **Schizostigma.** Stigma 4-fidum, caules teretes, lineis decurrent destituti.

A. Semina papillosa.

a. Semina oblonga apice m. m. attenuata pellucido-appendiculata: **E. Duriaei Gay.**

b. Semina obovoidea apice rotundata.

‡ Folia breviter petiolata, basi sub- v. cordata.

Foliis majusculis, intermediis dense denticulatis; alabastris ovoideis breviter apiculatis; floribus mediocribus, 8—10 mm longis: **E. montanum L.**

Foliis parvis, intermediis remote denticulatis; alabastris subgloboso-ovoides obtusis; floribus parvis, 4—6 mm longis: **E. collinum Gmel.**

Foliis majusculis, omnibus integerrimis: **E. hypericifolium Tausch.**

‡‡ Folia manifeste petiolata, basi sensim angustata.

Foliis intermediis grosse denticulatis; floribus mediocribus, ab initio albis dein roseis: **E. lanceolatum Seb. & Mauri.**

+++ Folia sessilia v. subsessilia.

Foliis intermediis minute denticulatis; floribus medioeribus roseo-violaceis:

E. parviflorum Schreb.

Foliis intermediis amplexi caulibus, argute serrulatis; floribus speciosis purpureis: **E. hirsutum L.**

Div. II. **Synstigma.** Stigma integrum, caules (excl. *E. palustre*) m. m. lineis decurrentibus notati, hinc m. m. angulosi.

A. Semina papillosa.

a. Semina obovoidea apice rotundata.

† Folia longiuseule petiolata; flores virgin. nutantes, parvi.

Foliis basi late cuneato-angustatis; dense denticulatis; alabastris apiculatis laciniis distantibus: **E. roseum Schreb.**

++ Folia sessilia v. brevissime petiolata.

— Resuliferae, floribus parvis erectis.

Pallide virens, fol. intermediis e basi latiore sensim in apicem acutum angustatis, argute denticulatis, floribus carneis, alabastris utrinque sensim attenuatis, ellipsoideis: **E. adnatum Griseb.**

Glauco-virens, foliis breviter petiolatis v. basi angustato sessilibus, remote subdenticulatis, floribus laete roseis, alabastris obovoideis, basi abrupte attenuatis: **E. Lamyi F. Schultz.**

= Steloniferae, floribus parvis.

Foliis intermediis in petiolum breviter angustatis remote denticulatis v. sessilibus basi rotundatis, floribus roseo-lilacinis: **E. obscurum Schreb.**

b. Semina oblonga, apice m. m. attenuata pellucido-appendiculata.

÷ Steloniferae, floribus parvis violaceis.

Caule pumilo simplici, distincte lineato, foliis ovatis v. obovatis, obiter denticulatis: **E. nutans Schmidt.**

++ Turioniferae, floribus majusculis violaceis.

Caule elato tereti, lineis pilosis non elevatis 2—4 notato, foliis ternatis rarius oppositis, ovato v. oblongo-lanceolatis, basi rotundatis sessilibus, remote denticulatis: **E. trigonum Schrank.**

+++ Soboliferae, floribus medioeribus violaceis.

Folia integerrima margine revoluta.

Caule tereti clineato, superne manifeste piloso, foliis sessilibus oblongo-lanceolatis v. lanceolata-linearibus, capsulis adpresse pilosis: **E. palustre L.**

B. Semina glabra: herbae m. m. glabrescentes, lineis decurrentibus notatae.

† Soboliferae, caule plerumque ramoso, compacto, floribus medioeribus violaceis.

Foliis ovatis v. ovato-ellipticis, in petiolum contractis, irregulariter denticulatis: **E. alsinefolium Vill.**

++ Steloniferae, caule simplici pumilo, floribus parvis.

Tenellum, caulibus e basi decumbenti adscendente, fol. parvis sessilibus v. subsessilibus, intermediis elliptico-ovatis, integerrimis v. obiter subdenticulatis, floribus roseis: **E. anagallidifolium Lam.**

Sect. I. **Chamaenerion**: Rhizoma perenne, soboles nunquam solutos edens. Folia omnia fere semper sparsa. Calyx profunda 4 partitus, segmentis patentibus divergentibus, tubo subnullo. Stamina uniseriata, nectarii margini inserta, declinato adscendentia. Filamenta basi dilatata. Stylus deflexo-declinatus, basi pubescens (rarius glaber). Stigmata 4 fida lobis demum revolutis. Flores explanati.

E. angustifolium L. Syn. Chamaenerion C. Gesn. Commentar. I. 14. a. H. 378. b. ap. Schmidel C. Gesneri hist. plant. fasc. II. 26. No. 70 (1770). Icon. t. 21. Lysimachia vulgo altera J. Camerar. h. med. 91 (1588). Lysimachia omnium maxima Tahl. Silv. hanc. 70 (1588). Cham. latifolium vulgare Tourn. elem. bot. (1694). Cham. altissimum sylvaticum. Rupp. Fl. Jen. 29 (1718). Epilobium latifolium glabrum flore valde speciosum Dill. Cat. Gies. 131 (1718). Ep. flore difformi, fol. lanceol. transversim nervosis Hall. hist. stirp. helv. II. 126. No. 1000 (1768). Cham. angustifolium Scop. Carn. ed. 2. 271. No. 455 (1772). E. spicatum Lam. Fl. Fr. III. 482 (1778). Ep. latifolium Mattuschka, Fl. Sil. I. 332. No. 267 (1776). E. Antonianum Al. Juss. in h. Par.

Icon. C. Gesner in V. Cord. hist. app. 215 (1561). Besler h. Eystot. aestio. I. f. 8 (1613). Oeder. fl. dan. II. f. 5. t. 269 (1765). Svensk bot. II. t. 130 (1803). — St. kil. fl. gall. II. t. 134 (1808). Schkuhr Handb. t. 106 (1808). Schrenk Fl. Mon. II. 107 (1811). Sturm Fl. 18. 81 (1840) etc.

Rhiz. soboles pallidi, foliis innovatoriis sparsis albido roseis. Caule tereti v. folio excurrente angulato; rarius superne ramoso, virgato. Foliis errumpentibus revolutis, petiolis basi non connatis, lineari-lanceolatis, acuminatis, sessilibus v. breviter petiolatis, basi abrupte rotundatis v. sensim in petiolum angustatis, margine subrevolutis non raro undulatis. Racemo terminali multifloro, elongato pyramidato, superne bracteato. Floribus 3 cm per medium occupantibus petalis purpureis, rarius albis, obovatis. Calycis laciniis obliquis acuminatis lineari-lanceolatis, extus rubescentibus tenuissime pubescentibus, petalis aequantibus v. subbrevioribus. Stylo basi pilosinseculo v. rarius glabro. Stigmatibus lobis ante anthesin conniventibus demum revolutis. Capsulis 4—6 cm longis. Seminibus pallide fuscis, oblongis, utrinque attenuatis, basi acutis, 1—1,25 mm longis, 0,3 mm latis, testa glaberrima.

Flor. fine Jun. ad med. Aug. v. med. Septemb.

Formae:

- a) *foliosa*: racemo fere ad apicem usque foliis evolutis praedito.
- b) *ramosa*: caule plerumque in parte inferiore ramulis florigeris adscendentibus praedito.
- c) *pubescens*: caule et foliis subtus v. ad nervum intermedium tentum tenuiter puberulis, calycis lacin. mag. canescentibus.
- d) *stenophylla*: fol. lineari-lanceolatis, 5—8 mm latis.
- e) *macrophylla*: fol. amplis, — 2 d. m. et ultra longis, 2—4 cm latis, plerumque sessilibus, basi m. m. rotundatis, subtus nervis secundariis magis prominentibus.
- f) *cuspidata*: foliis in apicem elongatum angustatis, manifeste cuspidatis.
- g) *sessifolia*: foliis sessilibus, lamina ad basin m. m. rotundatum usque decurrente.
- h) *petiolata*: fol. breviter petiolatis, lamina sensim in petiolum decurrente.
- i) *obovoides*: alabastris brevibus apice dilatatis obovatois, breviter abrupteque apiculatis.
- k) *oblonga*: alabastris longioribus angustioribusque, sensim in apicem elongatum attenuatis.
- l) *parviflora*: floribus dimidio minoribus, petalis angustioribus.
- m) *albiflora*: petalis albis, sepalis pallidioribus.

Hab. in Europa tota in loc. sterilibus sylvaticis ericetosis, ad vias praecipue recenter structas, in silvis montanis usque ad reg. alp. 1—6000' s. m. Meridiem versus in omnibus territoriis cisalpinis loca collina planaue, in Italia supermontana et subalpina occupat, in Dalmatia in sylvaticis montis Biokovo (Vis. flor. Calm. p. 198), in Croatia, Slavonia haud rarum, probabiliter etiam in Bosnia et relig. territor. europ. anstr. proveniens.

Leon. t. 1. **Caulis floridi apex.** 1. Flos inferne visus. 2. a latere visus. 3. Stamen a) antice et b) a dorso visum. 4. Semina antice et a latere visa.

Epilobium Dodonaei Villars. *a angustissimum* — **E. angustissimum Weber.** Syn. Chamaenerion sextum, minus fol. angustioribus, C. Gesn. app. in V. Cord. hist. 216 (1560). Chamaenerion aliud C. Gesner Comment. I. 18. a. t. 22. No. 71. A. B. C. ed Schmiedel in hist. pl. Gesneri fasc. 2. p. 28. No. 71 (1770). Pseudolysimachium purpureum minus Dodon. pempt. (1583) lib. III. p. 85 (ed. 1616). Chamaenerion angustifolium Alpinum, flore purpureo (v. fl. albo v. variegato) Tournef. inst. r. hb. 1700) p. 302 — 3 ed. 3 (1719). E. flore difforni, fol. linearibus Hall. hist. I. 427. No. 1001 (1768). Cham. palustre Scop. Fl. Carn. ed. 2. 271. No. 456 (1772). E. Dodonaei Vill. prosp. 45 (1779). E. angustissimum Weber pl. minus cogn. dec. p. 3 (1784). E. rosmarinifolium Haenke in Jacq. Coll. II. 50 (1788).

Icon. C. Gesner Comment. I. 18. t. 22. ed. Schmiedel. hist. fasc. II (1770). Dodon. pempt. lib. III. (1583) p. 85. f. 2 (ed. 1616). Sturm. Fl. 17. 72 (1838).

Rhiz. soboles purpurascens. Caule tereti, simplici v. ramoso, inferne glabrescente, subluceo, saepissime erubescens, florenti tempore ramulos nondum evolutos in axillis foliorum gerente. Foliis confertis rigidis crassiusculis linearibus, sessilibus v. subsessilibus, integerrimis v. calloso denticulatis, aveniis, glabris v. adpresse pilosiusculis, rarius albido subtomentosis. Racemo terminali laxifloro, demum elongato rarius abbreviato, subcorymboso usque ad apicem bracteato. Floribus 2,5—3 cm per medium occupantibus. Petalis lacte roseis, rarius albis, oblongo obovatis v. elliptico oblongis, calyce $\frac{1}{4}$ longioribus. Calycis laciniis lanceolata-linearibus, erubescens, m. m. pilis brevissimis ad pressis obsitis, tubo dense ad pressequae albido incano. Stylo inferne ad tertiam partem albo villosa. Stigmatibus laciniis ab initio conniventibus demum revolutis. Capsulis — 6 cm longis. Seminibus oblongis, basin versus longe attenuatis, apice subattenuatis, $1\frac{3}{4}$ —2 mm longis, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ mm latis. Testa tenuiter papillosa.

Flor. Jul.—Sept.

Formae:

- a) *ramosa*: caulibus erectis, a basi ad apicem ramulis florigeris praeditis, racemis abbreviatis paucifloris.
- b) *decumbens*: caulibus basi decumbentibus, ramulis elongatis virgatis m. m. floribundis, racemis elongatis latifloris.
- c) *longifolia*: fol. 4—6 cm longis, angustissimis, 1—2 mm latis, margine integerrimis subrevolutis.
- d) *brevifolia*: fol. brevibus, 3 mm latis, 2—3 mm longis, margine remote calloso-subdenticulatis.
- e) *glabrescens*: caulibus foliisque glabrescentibus; in frigidis altioribus secus torrentes proveniens.

Hab. in Germania austr. versus fines helvet. in vic. fl. Rheni ex alpebus allatum, in Alsatia, territ. Badensi, Württemberg, in Bavaria. — In Germ. austro-orient. in Silesia. — In Polonia, Galicia, Bucovina, Hungaria, Slavonia, Transsylvania, Croatia, Hercegovina, Albania. — In Austria, Steiermark, Salzburg, Kärnthen, Krain, Illyrien, Friaul, Tirol, Helvetia.

Icon. t. 2. **Plantae florentis apex.** 1. Semen antice et 2. a latere visum. 3. Folium.

7. **Fleischeri.** Caulibus numerosis prostratis v. basi decumbentibus subtortuosis, basi sublignescens, nitidis glabris v. superne pilis crispulis brevissimis tenuiter obsitis, saepe in axillis fol. ramulos nondum evolutos gerentibus. Foliis crassiusculis sessilibus, lanceol. v. lineari-lanceol., plerumque infra medium dilatatis, lacte viridibus concoloribus glabris 2,5—3 cm longis, 3—5 mm latis, saepissime calloso denticulatis. Racemo abbreviato subcorymboso, m. m. paucifloro. Alabastris obovoideis grossis, obscure viridibus v. purpurascens glabrescentibus, breviter abrupteque apiculatis, v. oblongis sensim apiculatis. Filamentis purpureis, antheris cinereis. Stylo crassiusculo, stamin. dimidio brevior, ad medium usque ubi flectitur albo-villoso, declinato. Capsulis junior. dense albo-tomentosis, adultis erubescens, adpresse pilosiusculis, 3—5 cm longis. Reliq. ut in *a*. Duae formae a) stenophylla; b) platyphylla.

Syn. *Lysimachia Chamaenerion dicta alpina* C. Bauh. Phytopin. 168. No. 12 (1596) ej. Pin. lib. VII. p. 215; ej. prodr. 116 (1671). *Cham. latifolium alpinum* Tournet. inst. (1700) p. 302 (ed. 3. 1719); ej. Elem. bot. ed. Juss. II. 119 (1797). *Ep. angustifolium* γ L. Spec. pl. 317 (1753). *E. rosmarinifolium* β *alpinum* Lam. et DC. Fl. Fr. V. 121 (1815). *E. angustissimum* Rehb. ic. IV. 33. No. 523 (1826). *E. Fleischeri* Hochst. in Bot. Ztg. 1826. p. 85.

Icon. Sturm. Fl. 17. 72 (1838). Rehb. ic. IV. t. 523 (1826). Dietr. Fl. univers. II. Sect. 69. t. 577 (1839).

Hab. in alpinis graniticis et schistosis. In Bavaria, Tirol, Helvetia, Krain, Jura, Transylvania.

Icon. t. 3. **Plantae florentis apex.** 1. Petalum. 2a. Semen antice; 2b. a latere visum. 3. Capsula. 4. Folium.

Sect. II. **Lysimachion:** Radix annua, denique per innovationem rhizomata perenni. innovationis organa tandem soluta. Folia inferiora opposita. Calyx 4 fidus, segmentis erectis v. suberectis, sub- v. campanulatus. Stamina 2-seriata, calycino tubo et fauce inserta, erecta. Filamenta filiformia. Stylus filiformis rectus basi glaber. Stigmata 4-fida vel connexa. Flores infundibuliformes.

Div. I. **Schizostigma:** Stigma 4-fidum, caules teretes, lineis decurrent. destituti. Semina papillosa.

Epilobium Duriaei Gay. Syn. *E. organifolium* Kirschleger Prodr. 38 (1836). *E. montanum* var. *Duriaei* F. Schultz in Flora 1850. p. 200; ej. Arch. I. 252 (1854).

Icon. Cus. et Ansb. IX. t. 11 (1868). Hauskn. Mon. t. II. fig. 26 (ic. sem.).

Caule e basi breviter decumbente adscendente, pallido, folioso, undique pilis crispulis brevissimis quasi farinaceo-consperso. Foliis brevibus ad inflorescentiam usque oppositis, imis minoribus ovato-oblongis, in petiolum longe decurrentibus, subintegerrimis, obtusis, sequentibus ovalibus utrinque aequaliter angustatis basi rotundatis, apice obtusis, remote subdenticulatis; intermediis 2—3 cm longis, 1—2 cm latis, subsessilibus, e basi abrupte rotundata subcordata-ovatis, in petiolum vix 1—2 mm longum contractis, in parte tertia superiori breviter angustatis, obtusiusculis v. calloso-mucronulatis, denticulis remotis arentis callosis parum repandis creprius notatis; superioribus e basi cordata longius in apicem acutum productis v. e basi rotundata lanceolatis aentis, repando arguteque denticulatis, utrinque pilis brevissimis tenuissime quasi farinaceo-conspersis, praecipue ad nervos prominentes et ad margines. Inflorescentia pauciflora, glanduloso-pilosa. Floribus 10—12 mm longis, virgineis subnutandibus. Petalis roseis, obovatis, obtuse emarginatis venosis calyce duplo longioribus. Calycis laciniis ovato-lanceolatis, apice breviter angustatis, pallide viridibus subglabrescentibus, 6 mm longis, basi $1\frac{3}{4}$ latis; tubo infundibuliformi, tenuiter pilosiusculo, 2 mm longi, apice $2\frac{1}{2}$ mm lato. Capsulis crassiusculis, pallide viridibus, 5—6 cm longis, pilis brevibus glandulosis patentibus obsitis; pedicellis $\frac{1}{2}$ —2 cm longis, tenuissime glanduloso-pilosis. Seminibus obovoidea-oblongis, apice in appendiculum brevissimum attenuatis, basin versus longe attenuatis obtusiusculis 2 : $\frac{1}{2}$ mm long. lat., testa dense papillosa.

Hab. in mont. altior. granitic. Vogesiatis, in mont. Juratensibus.

Formae hybridae:

E. alsinefolium × *Duriaei* v. *E. alsinefolium* Vill.

E. collinum × *Duriaei* v. *E. collinum* Gmel.

E. Duriaei × *montanum*.

E. Duriaei × *palustre*.

Icon. t. 1. **Planta florens et fructifera.** 1. Flos ex parte calyce et corolla privata. 2. Semen antice et 3. a latere visum.

Epilobium montanum L. Syn. Antoniana v. St. Antonii herba minor C. Gesn. h. Germ. 247 (1561); Pseudolysimachium purpureum L. Dodon. pempt. lib. III. 85 (1583, 1616). Chamaenerion glabrum majus Tournef. elem. bot. (1694); Cham. glabrum latifolium majus Rupp. Fl. Jen. 30 (1718). Epilobium glabrum majus purpureo flore Dill. cat. Gis. 91. albolore 128 (1719). E. fol. (oppositis) ovatis dentatis L. syst. nat. II. 999 (1735). E. montanum L. spec. pl. 348 (1753). E. fol. ovato-lanceolatis glabris dentatis Hall. hist. st. helv. I. 426. No. 996 a (1768). Cham. montanum Scop. Carn. ed. 2. 270. No. 453 (1772).

Leon. Lobel pl. s. stirp. hist. 185 (1576). J. Gesn. tab. phytogr. ed. Schinz t. 26. No. 426. No. 1 (1795). Rehb. icon. II. t. 189. f. 328 (1821). Sturm Fl. 17. 72 (1838). Dietr. Fl. univers. II. sect. 69. t. 577 (1839). Hausskn. Mon. t. I. fig. 19 (ie. sem.).

E. radice simplici v. rhizom. m. m. elongato radicante, non raro pluricipiti, turiones autumnales subhypogaeos v. epigaeos erectos sessiles; foliis innovatoriis dense plicato-imbricatis, pallidis carnosis rigidis, saepe erubescens. Caulis stricto erecto v. e basi breviter arcuato adscendente, saepe ad collem foliis innovatoriis emortuis brunneis praedito, spithameo v. pluripedali, tenero, simplici v. ramoso, remote foliato, paucifloro v. floribundo, saepe erubescens, tereti, lineis decurrentibus destituto, utrinque pilis brevibus crispulis incurvatis puberulo, ante anthesin apice mutante. Foliis ad inflor. usque oppositis v. in parte dimidia superiore alternis, rarius ternatis; infimis obl. v. ovato-oblongis obtusis, remote denticulatis, sensim in petiolum decurrentibus; intermediis breviter petiolatis, ovatis v. elliptico-ovatis, basi abrupte rotundatis, non raro leviter cordatis, in petiolum brevem dilatatum contractis, apice acutis v. acuminatis, irregulariter denticulatis, denticulis repandis, apice callosis antice curvatis, supra subpuberulis, laete v. saturate viridibus, opacis, subtus pallidioribus, ad margines nervosque puberulis; floralibus angustis, elliptico-lanceolatis, in petiolum cuneato-decurrentibus, arcute denticulatis. Racemo laxo foliato patulo. Alabastris tenuiter pilosiusculis. Floribus erectis, 8—10 mm longis; petalis dilute rubellis, rarius albis, obcordatis, basin versus cuneato-angustatis, veniis 5—6 obscurioribus percursis, acute (1 mm) emarginatis, calyce duplo longioribus, lobis oblongis rotundatis. Calycis laciniis 4—5 mm longis, basi 1½ mm latis, oblongo-lanceolatis, leviter minerviis, acutis; tubo 2 mm longo latoque. Filamentis pallidis. Capsulis 6—9 cm longis, puberulis, junioribus tenuiter patentim glanduloso-pilosis; pedicellis 1—2 cm longis, foliis fuler. brevioribus. Seminibus griseis v. fuscis, obovoideis, apice rotundatis, basi parum attenuatis obtusis, papillis elongatis dense obsitis, 1 : 1½ mm longis latisque.

Haussknecht formas sequentes enumerat: a) minor, b) ramosa, c) aprica, d) umbrosa, e) subcordata, f) latifolia, g) glaucescens, h) alternifolia, i) verticillata, k) albiflora, e) putata.

Flor. Jul.—Aug.

Hab. Tota Europa in silvis planitierum umbrosis, in humidis tumetosis demissioribus, ad pagos ubique frequens, in rupestribus silvarum, in alpibus ad regionem inferalpinam usque 1400 m adscendens.

Formae hybridae:

- E. adnatum × montanum v. E. adnatum Griseb.
- E. alsinefolium × montanum v. E. alsinefolium Vill.
- E. collinum × montanum v. E. collinum Gmel.
- E. hirsutum × montanum v. E. hirsutum L.
- E. Lamyi × montanum v. E. Lamyi F. Sch.
- E. lanceolatum × montanum v. E. lanceolatum S. et M.
- E. montanum × obscurum.
- E. montanum × palustre.
- E. montanum × parviflorum.
- E. montanum × roseum.
- E. montanum × trigonum.

Leon t. 5. **Planta florentis apex.** 1. Flos calyce et corolla ex parte privata. 2. Somen antice et 3 a latere visum.

Epilobium collinum Gmel. Syn. *Chamaenerion Alpinum minus*, *Prunellae foliis* Tournef. inst. 303. p. p. (1700, 1719). *Cham. glabrum latifolium minus* Rupp. Fl. Jen. 330 (1718). *E. montanum* β . *Chamaenerion alpinum fol. splendent. denticulatis* Lam. encycl. II. 375 (1786). *E. montanum* β . *alpestre* Pers. spec. pl. II. 70 (1819). *E. collinum* Gmel. fl. bad. suppl. IV. 265 (1826). *E. nitidum* Host. fl. austr. I. 169 (1827). *E. montanum* var. *collinum* Spenn. fl. Frib. 793 γ (1829). *E. montanum* var. *parvifolium* Tsch. Hb. Boh. 522. *E. montanum* var. *alsinefolia* Rehb. ap. Mössl. I. 611 (1833). *E. montanum de alternifolium* Neill. fl. n. Oestr. 873 (1859).

E. radice simplici denique fasciculata, v. rhiz. brevi truncato vix subelongato. Caule breviter adscendente v. stricte erecto, saepe subflexuoso, tenero, duro, simplici v. ramosissimo, pumilo v. pedali, dense foliato, florifero apice nutante, pilis valde incurvatis, eglandulosis undique cinereo-puberulo, basi nudo vel in specim. per innovat. ortis foliis innovatoriis emortuis confertis obsito. Foliis parvis, ad inflorentiam usque oppositis v. a medio ad apicem spiraliter alternis, 1—4 cm longis, 5—15 cm latis, manifeste petiolatis, subnitides, glabriusculis, margine c. nerve dorsali puberulus; infimis oblongis apice rotundatis, in petiolum 5—8 mm longum sensim decurrentibus, integerrimis, sequentibus ovato-ellipticis, apice obtusis, in petiolum breviorum cuneato decurrentibus, remote leviterque subdenticulatis; intermediis ovatis, basi rotundatis v. in petiolum cuneato decurrentibus, in apicem breviter angustatis, obtusis v. calloso-mucronulatis; superioribus elliptico-lanceolatis, magis denticulatis, calloso-mucronulatis. Floribus parvis, virgineis nutantibus, 1—6 mm longis; petalis pallide roseis, bilobis, obtusis, calyce subduplo longioribus. Calycis laciniis lanceolatis, obtusiusculis glabrescentibus, $2\frac{1}{2}$ —3 mm longis, basi 1 mm latis. Capsulis adpresse pilosis, eglandulosis 4—6 cm longis, pedicellis $\frac{1}{2}$ —1 cm longis, fol. fule. subaequilongis v. brevioribus. Semn. obovodeo-oblongis, apice rotundatis, basi abrupte attenuatis, obtusiusculis, 1 : $\frac{1}{2}$ long. lat., testa breviter papillosa.

Flor. Jun.—Sept.

Formae, quas Haussknecht in Monogr. Epilobii generis enumerat: a) elatior, b) minor, c) verticillata, d) latifolia, e) angustifolia, f) umbrosa, g) stricta.

Hab. In rupestribus apricis silic. montium humilior usque ad region. alpinam adscendens. In Germania: Silesia, Saxonia, Sylva Hare., Hassia, Thuringia, Franconia, Guestphalia, Rhenania, Vosego, Bavaria, Belgia, Helvetia: Austria: Bohemia, Austria sup., inf., Salzburgia, Steiermark, Tirol, Kärnthen. Illyrien, Central-Karpathen, Bucovina, Pedemontana.

Formae hybridae:

- E. alsinefolium* \times *collinum* v. *alsinefolium* Vill.
- E. collinum* \times *Duriaci*.
- E. collinum* \times *lanceolatum*.
- E. collinum* \times *montanum*.
- E. collinum* \times *obscurum*.
- E. collinum* \times *palustre*.
- E. collinum* \times *parviflorum*.
- E. collinum* \times *roseum*.

Icon t. 6. *Planta florens et fructifera.* 1. Alabastrum a latere visum. 2 et 3. Flos intus et a latere visus.

Epilobium hypericifolium Tausch. Syn. *Epilobium mutabile* Wenderoth mss. ind. h. Marbg. *E. montanum* h. *hypericifolium* Celak. pr. Boh. 587 (1867).

Icon. Tausch. h. Canal. I. No. 7 (1823). Sturm Fl. 17. 72 (1838).

E. ad collem radicis foliis innovatoriis emortuis nigricantibus obsito. Caule erecto v. basi adscendente, folioso multifloro, ante anthesin apice subnutante, tereti utrinque pilis crispulis brevissimis,

in inflorescentia glandulosis patentibus sparse intermixtis tenuiter puberulo, saepe purpurascenti. Foliis inferioribus oblongis obtusis, in petiolum dilatatum angustatis; intermediis ovatis, e basi latiori subeordato breviter in petiolum contractis, apicem versus sensim angustatis acutis, ad margines nervosque pubescentibus, integerrimis, subtus pallidioribus, —7 cm longis, —3 cm latis; superioribus floralibus elliptico-lanceolatis, in petiolum sensim decurrentibus. Floribus 5—6 mm longis erectis, virgineis subnulantibus; petalis obovatis, primo albis, dein incarnatis, acute emarginatis, calyce subduplo longioribus. Filamentis albidis, dein leviter roseis. Calycis laciniis lanceolatis acutis, 1—5 mm longis, saepissime erubescenscentibus. Capsulis 5—6 cm longis, pilis glandulosis patentibus, crispulis intermixtis breviter pubescentibus; pedicellis —1 cm longis, foliis fuler, multo brevioribus. Seminibus oblongis, apice rotundatis, basi obtusis, parum attenuatis, 1—1¼ mm longis, ½ mm latis, testa dense papillosa.

Flor. Jun.—Sept.

Forma: triphylla.

Hab. In silvaticis montosis Bohemiae.

Icon. t. VII. *Planta florens et fructifera*. Flos a latere et intus visus. Semen antice et a latere visum.

Epilobium lanceolatum Seb. et Mauri. Syn. *Ep. lanceolatum* Hook. Brit. Fl. ed. 5. 111. 7. 149. Rehb. (Sax. 355 (1842). Koch syn. ed. 2. suppl. 1022 (1843). Kirschleger Fl. Als. I. 267. Karschl. Fl. Westph. 185 (1853). Dösch et Scriba Hess. 559 (1873). Garcke D. Fl. ed. 13. 139. *E. virgatum* Spreng. syst. II. 233 (1865). *E. roseo* × *montanum* Rehb. Wirtg. exs. *E. virgatum* β *lanceolatum* Rehb. fl. exc. 636. No. 4089 (1830). *E. montanum* β *lanceolatum* Rehb. Kirschl. Fl. Vog. Rh. 187 (1870). Lanterer Exc. Freib. 146 (1874).

Icon. Seb. et Mauri Fl. Rom. t. 1. f. 2 (1818). Sturm Fl. 17. 72 (1838).

E. radice simplicis v. rhizom. brevi, rosulas autumnales flaccidas, ab initio sessiles demum elongatas, fol. innovatoriis frondosis ovato-oblongis apice rotundatis, grossiuscule denticulatis, subtus valde nervosis edente. Caule e basi arcuata erecto, simplicis v. ramoso, ramulis stricte erectis elongatis praedito, tenero, lineis decurr. destituto, glauco, saepe purpurascente, folioso, ante anthesin apice erecto, pilis brevissimo adpressis, in inflorescentia glandulosis brevissimis patentibus crebris inmixtis obsito. Foliis flaccidis glaucis v. inferioribus subtus purpurascentibus, subluclidis, oblongis obtusis, basi non laterioribus sed utrinque aequaliter angustatis, e basi integerrimo cuneato in petiolum 4—8 mm longum decurrentibus, ad nervos marginesque tenuiter puberulis, 3—6 cm longis, 1—1.5 cm latis, infimis deflexis. Alabastris ovoideo-oblongis obtusis v. brevissime apiculatis, canescentibus. Floribus 6—10 mm longis, virgineis subnulantibus; petalis ab initio albidis dein roseis, calyce ¼ longioribus. Calyc. lacin. ovato-lanceolatis 4—5 mm longis, tubo 1.5—2 mm longo. Stigm. 4 fido, lobis ab initio erecto-patentibus, demum sub-revolutis. Capsulis 6—7 cm longis, canescentibus, pilis glandulosis brevissimis intermixtis obsitis; pedicellis glandulosa-puberulis, strictis, —1 cm longis. Sem. fuscis, obovoideo-oblongis, apice rotundatis, basi obtusis. 1—1⅓ mm long. latis, testa papillis brevibus dense obsita.

Flor. Jul.—Sept.

Formae (Mon. Hausskn.): a) simplex, b) parvula, c) ramosa, d) umbrosa, e) triphylla, f) putata.

Hab. In rupestris praecipue silic., rarius calcareis. Oberau apud Dresden, Ettersberg apud Weimar rarum, in Franken in monte Altenberg apud Kissingen rarum, Provinz Hannover in monte Klüt apud Hameln. In Guestphalia apud Herford, apud Höxter inde a Bufzen usque ad Fürstenberg, Lauenförde, Rottminde, ad sinistram ripam fluminis Weser. Im Ruhrland apud Mühlheim. In proclivis locis soli expositis per totam vallem fluvii Rheni disperse idem in vallibus vicinis ut in Ahrthal et in tota terra Eifel, im Brohlthal, an der Mosel etc. Wiesbaden, in Odenwald et Schwarzwald crebro, passim in

arenosis aggeribus viae ferreae apud Darmstadt. In terra Pfalz in montibus Haardt in rupestris graniticis et basalt. apud Deidesheim, crebro in porphy. montis Donnersberg, im Falkensteiner Thal. In Vosegis creberrime in saxis granit. et porphy. Tournai Prov. Hainaut, in Arduenna silva apud Laroche: Prov. Namur apud Herock, Burnot, Taillefer; Prov. Lüttich inter Remonchamps et Nonceveux; Genappe, Nethen Brabant, Maastricht, Wintershoven, Limburg. Kahlenberg apud Wien. In parte meridiana terrae Tyrol. In Hungaria supra St. Andreas pr. Buda et Dreibrunnenberg; in silvis Bikkalj ad Ipoly-Liske, Karanes ad Somos-Ujfalú, ad Salgó-Tarján etc. In Transsilvania pr. Kronstadt, in alpibus Arpasch. In Dalmatia. In meridiana parte Serbiae.

Formae hybridae:

- E. adnatum \times lanceolatum v. E. adnatum Griseb.
- E. collinum \times lanceolatum v. E. collinum Gmel.
- E. Lamyi \times lanceolatum v. E. Lamyi F. Schultz.
- E. lanceolatum \times montanum.
- E. lanceolatum \times obscurum.
- E. lanceolatum \times palustre.
- E. lanceolatum \times parviflorum.
- E. lanceolatum \times roseum.

Icon. t. 8. *Plantae florentis apex. Folium. Flos intus visus. Semen antice et a latere visum.*

Epilobium parviflorum Schreb Syn. E. villosum Besser Galic. No. 450 (1809). Kirschl. Fl. Als. I. 266 (1852). Ehrhart exs. No. 104. E. molle. Lam. et DC. syn. 328 (1806). Pohl tent. Bot. 61 (1810). Lam. et DC. Fl. Fr. V. 422 No. 3668 (1815). Spreng. syst. veg. II. 233 (1825). Schübl. et Mart. Württemberg. 250 (1834). Hegetschw. Schw. 356 (1840). Le Moont et Dees. Fl. Jard. I. 497. Kirschl. Fl. Vog. Rh. 186 (1870). E. pubescens Pers. syn. I. 110 (1805). Dietr. Lexic. III. 774 (1840). Koch bot. Handb. II. 178 (1808). Schlechtend. Berol. I. 215 (1823). Rothman. bot. I. 555. Lorey et Goull. Fl. Weim. 77 (1851). Hegetschweiler Beitr. 336—347 (1831) ej. Fl. Schw. 356 (1840). E. palustre Vis. stirp. Dalm. 34 (1826). E. vestitum Benth. in Wall. Catal. No. 6327 (1828) etc. etc.

E. radice simplici v. rhizomate m. m. elongato repente radicante, post florendi tempus rosulas sessiles sed mox elongatas stoloniformes edente, foliis innovatoriis frondosis, infimis parvis subrotundis, basi cuneato-angustatis, obscure viridibus glaberrimis lucidis, subtus plerumque purpureo-fuscis, elevato-nervosis. Caule erecto v. adscendente, simplici v. ramoso, tereti clineato, pilis patentibus villosa v. pubescente, hinc inde glandulosis brevioribus sparse immixtis, pedali v. pluripedali, ante anthesin apice erecto. Foliis oblongo- v. ovato-lanceolatis; inferioribus breviter petiolatis, intermediis superioribusque e basi abrupte rotundato v. angustato sessilibus, venticulus valde remotis vix repandis minutis praeditis, pilis patentibus molliter pubescentibus, praecipue in pagina inferiori munitis, v. in umbrosis aquaticis glabrescentibus, —1 dm et ultra longis, 1—3 cm latis. Alabastris globoso-ovoideis obtusis v. brevissime abrupteque apiculatis, pilis longioribus patentibus. Floribus mediocribus, ante anthesin erectis, 5—10 mm longis, petalis obcordatis, obtuse v. acute emarginatis pallide roseis v. violaceis, calyce $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ longioribus. Stigmatibus 4-fido, lobis oblongo-linearibus, erecto patentibus, demum subrevolutis, 1—2 mm longis, in stylum 5 mm longum attenuatis; filamentis pallidis. Calyc. lacin. ovato-lanceolatis obtusiusculis, 1—5 mm longis, basi 2 mm latis, tubo sparse piloso. Capsulis pilis longioribus simplicibus, denique glabrescentibus, sublucidis, 6—8 cm longis; pedicellis 1—2 cm longis. Seminibus fuscis v. denique nigrescentibus, obovoideis, apice rotundatis, basi obtusis, 1: $\frac{1}{2}$ mm long. latis, testa densissime papillis elongatis obsita.

Flor. Jul.—Sept.

Formae:

- a) aprica*: radice simplici v. rhizom. brevi truncato, caule stricte erecto plerumque simplici, dense folioso, pilis mollibus elongatis dense villosis; foliis anguste lanceol., sessilibus, apicem versus longe sensimque ang. acutis, cinereis, subtus tenuiter tomentosis; floribus minoribus, capsulis plerumque purpureiscentibus.
- b) tomentosa*: caule foliisque utrinque dense albido-tomentosis.
- c) umbrosa*: caule robusto altiore, saepe a basi ad apicem ramoso; fol. longioribus latioribusque, flaccidis, lacte viridibus, glabris v. pilis sparsis obsitis, in petiolum manifestum abrupte contractis.
- d) trifoliata*: foliis ternato-verticillatis.
- e) brevifolia*: fol. latioribus brevioribusque, infimis oblongo-ovatis in petiolum brevem subito contractis intermediis superioribusque sessilibus, basi dilatata rotundata v. fere cordata, oblongo-ovatis v. ovato-ellipticis, apice breviter angustatis, lacte viridibus, laxe pilosis; caulibus, alabastris capsulisque pilis patentibus dense dispositis villosis; floribus minoribus persicinis v. albidis.
- f) menthoides*: foliis subrigidis, utrinque pilis adpressis brevibus dense albido-cinereis obsitis; caule pilis patentibus villosis; floribus minoribus pallide roseis.
- g) minor*: caule simplici pumido saepe spithamaeo paucifloro.
- h) pulata*: caule abscisso basi ramosissimo, foliis dimidio minoribus ovatis, apice breviter angustatis, minus denticulatis.

Hab. Passim per Europam totam excl. region. bor. in uliginosis et ad ripas fluviorum planit. ad reg. montanam, in Alpibus et in Europa australiori ad reg. subalpinam (3500—4100') usque ascendens. In Scandinavia vix ultra 60° Lat., in Suevia: Scania-Uplandia, in Norvegia pr. Christiania.

Icon. t. 9.

Epilobium hirsutum L. Syn. E. grandiflorum Weber app. Wigg. prim. fl. Hols. 30. No. 318 (1780). All. Fl. Pedem. I. 279. No. 1018 (1785). Baumg. Fl. Lips. 209. No. 534 (1790). Murr. et Pers. syst. veg. ed. 15. 83 (1797). Link. enum. pl. alt. I. 379. No. 3815. Dietr. Fl. Berl. 391 (1824). E. hirsutum a grandiflorum Vill. hist. Dauph. I. 328 (1786). Chamaenerion grandiflorum Münch. Meth. 677 (1794). E. villosum Thunbg. (fol. alternis lanc. serratis hirsutis) prodr. 75 (1794). Dietr. Syn. II. 1292 (1810). Krauss in Flora 425 (1844). E. aquaticum Thuill. Fl. Par. ed. 2. 191 (1799). E. tomentosum Vent. h. Cels. p. et f. 90 (1800). De. pr. III. 42 (1829). Dietr. Syn. II. 1292 (1810) etc.

Icon. Fuchs hist. stirp. 191 (1542); ej. Kreuterb. cap. 18. 7. t. 277 (1543). Dodon. stirp. hist. comment. 82 (1553). Lonic. Kreuterb. II. 164. f. 3 (1557. 1609). Tabern. Eic. 855 (1590) ej. Kreuterb. II. 526 (1594. 1625). 1237. f. 3 (1664). J. Gesner tab. phytogr. ed. Schinz. t. 26. No. 126. f. 2 (1795). Dietr. Fl. Boruss. VIII. t. 571 (1833). Dietr. Fl. univ. III. t. 575 (1833). Sturm Fl. 18. 81. No. 4 (1810). Hauskn. Mon. t. I. fig. 20 (semo).

E. radice ramosa, tortuosa, multifibrillosa, vel per innov. rhizom. crasso obliquo longaevo, longe lateque repente fibrillis grossis obsito, jam florendi tempore soboles valde elongatos, saepe pluripedales carnosos radicanter plerumque obtusangulos edente, foliis innovatoriis kataphylloideis oppositis, squamiformibus, remote dispositis, basi vaginato-dilatatis, apicem versus longe angustatis acutis; soboles ad apicem epigaeum subito sursum curvati, fol. innov. latioribus subfrondosis, valde elongatis, plicatis, apice rotundatis, rosulato-congessis obsiti. Caule semper fere ramoso, stricte erecto, pedali-orgyali, inferne subanguloso ob nerv. intermedium excurrentem, caeterum tereti, epidermite pallide fusco, serius inferne

lacerato, plerumque pilis longioribus simplicibus patentibus, superne pilis brevioribus glandulosis patentibus immixtis villosis, v. tomentoso eglanduloso v. pilis glandulosis brevibus tantum obsito, rarius subglabrescente, ad nervum excurrentem saepe glabro. Foliis sessilibus amplexicaulibus, intermediis breviter foliaceo-decurrentibus, oblongis, apice breviter angustatis, v. oblongo-lanceolatis, v. anguste lanceol. apicem versus sensim longeque angustatis acutis, rarius ovatis v. obovatis obtusis, subglabrescentibus viridibus v. molliter villosis v. incano-tomentosis, argute serrulatis v. denticulatis, denticulis patulis v. inflexis. Alabastris ovoideo oblongis, subito brevissime constrictaeque apiculatis v. obtusis, laciniis apice plerumque reflexis, subglabrescentibus, v. glanduloso-villosis v. tomentosis. Floribus speciosis, 8 mm—2 cm longis, in racemum terminalem laxum foliosum dispositis, ante anthesin erectis; petalis purpureis obcordatis, valde venosis, lobis late rotundatis obtuse emarginatis, ad basin annulo pilis introrsum directis vestito. Stigmate 4-fido, laciniis crassiusculis, ante anthesin erecto-conuiventibus, demum circinnato-revolutis; antheris pallide flavis, stylo filamentisque pallidis. Calycis lacin. lanceolatis, nervosis, breviter apiculatis, petalis dimidio brevioribus v. subaequilongis; tubo brevi, plerumque 2 : 4 mm longo latoque. Capsulis crassis v. crassiusculis, subglabrescentibus v. glanduloso-villosis v. glandulosis v. eglanduloso-tomentosis; pedicellis fol. fulcr. multo brevioribus, $\frac{1}{2}$ —1,5 cm longis. Seminibus fuscis, obovoideis, apice rotundatis basi obtusis, 1,5—0,5 mm long. lat., testa papillis elongatis dense obsita; coma sordide albida.

Flor. Jul.—Aug.

Formae occurrunt hae:

- a) *virescens*: caulibus foliisque obscure viridibus, m. m. sparse pilosis, pilis glandulosis brevibus, longioribus simplicibus intermixtis obsitis.
- b) *adenocaulon*: caule pilis glandulosis brevibus tantum obsito.
- c) *villosa*: caule pilis longioribus, m. m. brevioribus intermixtis dense obsito, foliis utrinque villosis, cinereo-viridescentibus.
- d) *tomentosa*: caulibus et foliis utrinque dense tomentosis, albido-cinereis, pilis glandulosis destitutis.
- e) *sericea*: foliis utrinque dense adpresseque sericeo-tomentosis.
- f) *oblongifolia*: fol. oblongis v. ovato-oblongis, apice breviter angustatis.
- g) *obovata*: fol. obovatis, plerumque 2 cm longis, 1 cm latis, apice rotundatis, in parte tertia superiori tantum denticulatis, basin versus cuneato-angustis.
- h) *lanceolata*: fol. lanceol. angustis, apicem versus sensim longeque angustatis acutis.
- i) *variegata*: fol. maculis lividis v. flavescenti-albidis munitis.
- k) *grandiflora*: floribus speciosis, 1,5—2 cm longis.
- l) *parviflora*: floribus minoribus, 8—12 mm tantum longis.
- m) *albiflora*: flor. albis, hinc inde e. typo provenit.
- n) *subapetala*: petalis abortivis v. tantum p. p. evolutis, dimidio minoribus, stigmate exserto.
- o) *brachycarpa*: capsulis crassis brevibus, 3—4 cm tantum longis.

Hab. in humidis udis, salicetis, ad pratorum fossarum margines virgultis instructos, in paludosis arundinibus obsessis fere ubique in planit. frequens, in Europa hinc inde in reg. mont. infer.

Formae hybridae:

- E. adnatum* × *hirsutum* v. *E. adnatum* Griseb. = *E. hirsutum* × *montanum*.
E. hirsutum × *palustre*.
E. hirsutum × *parviflorum*.
E. hirsutum × *roseum*.
E. hirsutum × *Tournefortii*.

Icon. t. 10. **Planta florens et fructifera.** 1. Flos petalis privatus. 2. Petalum. 3 et 4. Semen antice et a latere visum.

Epilobium roseum Schreb. Syn. E. s. Chamaenerion spec. altera flore candido C. Gesn. app. in V. Cord. Adnot. Dioscor. 215. b. (1561). Lysimachia minor Tabern. Eie. 854 fig. 2 (1590). Lysimachia siliginosa glabra minor C. Bauhin. Phytopin. 167. No. 8. p. p. (1596). Chamaenerion glabrum minus Tournef. Elem. bot. (1694) etc. Juss. ap. Tournef. Elem. bot. II. 150 (1797). Chamaenerion (Ep.) roseum Schreb. Spicil. Lips. 147 (1771). Pers. Syn. I. 410 (1805). Spreng. Syst. II. 233 (1825). Dietr. Syn. II. 1291 (1840) etc.

Icon. C. Gesner Comment. I. 80. 6. t. 20 ed. Schmidel Hist. fasc. II. 39. No. 73 (1770). Rehb. Ic. crit. II. t. 190. f. 329 (1821). Dietr. Fl. univ. II. sect. 69. t. 578 (1839). Hausskn. Mon. t. II. fig. 32 a b (ic. sem.).

E. radice ab initio simplici, serius fasciculata, ad collem tortuosa v. rhizom. brevi oblique truncato, fibris grossiusculis elongatis obsito, in aetumno turiones breves sessiles subglobosos rarius elongatos, serius rosulae-formes ca. 2 cm longos edente, aut turionibus hypogaeis; fol. innovatoriis kataphylloideis abbreviatis imbricatis pallidis enerviis carnosius leviter emarginatis, ad basin in petiolum brevem dilatatum abrupte contractis, longitudine duplo latioribus. — aut saepe turionibus epigaeis; fol. innov. subfrondosis subtus purpurascens, supra obscure viridibus, 3—4 geminatis, superioribus apice dilatatis rotundatis obovatis, subtus valde nervosis, nervo medio apice recurvato percursis, denticulis minutis callosis praeditis. Caule stricte erecto v. adscendente, ante anthesin apice nutante, simplici v. ramoso, pumilo v. pluripedali, tenero v. crassitie, pennae anserinae obscure viride v. purpurascens, folioso, ob nerv. intermed. decurrent. obsolete 4 gono, in parte dimidia inferiori lineis elevatis 2 glabris, in parte superiori saepe 4 pilosiusculis e basi piloso petiolarum decurrentibus notato, inferne glabro, superne adpresse pilosiusculo, in inflorescentia pilis glandulosis patentibus cinereo-piloso. Foliis superioribus exceptis, oppositis inferioribus glabris, saturate v. sordide viridibus firmis v. flaccidis, intermediis superioribusque ad margines nervosque pilosiusculis, subtus nervis saepe erubescens; infimis ovalibus v. oblongis, repando-remoteque denticulatis, basi subrotunda in petiolum canaliculatum abrupte contractis, longe petiolatis; intermediis longioribus, oblongo-ellipticis, basi integerrimis, in petiolum breviorem cuneato-decurrentibus, apice breviter angustatis, acutiusculis, denticulis callosis argutis repandis inaequaliter confertis munitis; superioribus lanceolato-ellipticis, apicem versus sensim angustatis, acutis. Racemo laxo multifloro. Alabastris ellipsoideis canescentibus, breviter apiculatis, ante anthesin laciniis distantibus. Floribus parvis, 5—6 rarius 8 mm longis, virgineis nutantibus; petalis acute incisis, lobis oblongis apicem versus subangustatis ab initio albidis dein roseis, venis saturatoribus 6—7 percursis, calyce sublongioribus. Calyc. lacin. lanceolatis acutis, adpresse pilosiusculis, subinde rubescentibus; tubo brevi canescente. Stigma obovato-clavato, apice dilatato, 1 : $\frac{3}{4}$ mm longo lato, in stylum 4 mm longum sensim attenuato; filamentis pallidis, antheris flavis. Capsulis pilis adpressis, crispulis, glandulosis patentibus inmixtis dense cinereo-pilosis, 5—6 cm longis; pedicellis glanduloso-pilosis, $\frac{1}{2}$ —1 cm longis, fol. fuler. brevioribus. Sem. griseo-fuscis, cylindrico-obovoideis, basi obtusis vix attenuatis, apice rotundatis, 1 : $1\frac{1}{2}$ mm long. lat., testa papillis elongatis basin versus dilatatis dense obsita.

Flor. Jul.—Sept.

Formae:

- a) *pusilla*: caule pumilosimplici digitali paucifloro; fol. minoribus, ovato-ellipticis, ca. 2 cm longis, 1 cm latis, minus denticulatis, basi magis rotundatis, apice obtusiusculis.
- b) *aprica*: sordide viridis v. erubescens, caule stricte erecto, pedali, breviter stricteque ramoso, superne magis cinereo-piloso; fol. firmioribus brevioribus, utrinque breviter decurrentibus, breviter petiolatis, floribus roseis v. persicinis.

c) umbrosa: saturate viridis, caule tenero flaccido, magis glabrescente, fol. majoribus flaccidis tenuioribusque, —1 dm longis, —3 cm latis, longe petiolatis; intermediis petiolo saepe 8 mm. —2 cm longo, floribus minoribus albidis.

d) angustifolia: saturate viridis, caule erecto pedali simpl. v. superne breviter ramuloso; fol. flacc. angustis, intermediis 6—7 cm longis, in petiolum decurrentibus, denticulis approximatis valde argutis notatis; flor. minutis, dilute cucurnatis, capsulis tenuioribus, 3—4 cm long., pedicellis 1 cm longis.

e) putula: fol. dimidio brevioribus, superioribus ovato-ellipticis, petiolo —8 mm longo.

Hab. In fossis, inter olera hortarum, in ruderalis humidis, ad rivulos et in paludosis passim in Europa fere tota. In Helvetia, Austria, Polonia, in Hungaria, Transsylvania, Croatia, Slavonia, Bosnia, Bucovina, Dobrudscha, in Serbia, Macedonia, Graecia.

Formae hybridae:

- E. adnatum* × *roseum* v. *E. adnatum* Griseb.
- E. alsinefolium* × *roseum* v. *E. alsinefolium* Vill.
- E. collinum* × *roseum* v. *E. collinum* Gmel.
- E. hirsutum* × *roseum* v. *E. hirsutum* L.
- E. Lamyi* × *roseum* v. *E. Lamyi* F. Schultz.
- E. lanceolatum* × *roseum* v. *E. lanceolatum* Seb. et Mauri.
- E. montanum* × *roseum* v. *E. montanum* L.
- E. obscurum* × *roseum* v. *E. obscurum* Schreb.
- E. palustre* × *roseum* v. *E. palustre* L.
- E. parviflorum* × *roseum* v. *E. parviflorum* Schreb.

Icon. t. 11. **Planta florens et fructifera.** 1. Flos. 2. eadem perianthio privato. 3. Petalum et calyc. lacin. 4 a et b. 5 cm antice et a latere visum. 5. Caulis fragm. costis decurrentibus.

Epilobium adnatum Griseb. Syn. Chamaenerion tetragonum Scop. Carn. ed. 2. 271. No. 454 (1772). Mönch meth. 678 (1794). *E. obscurum* Schmidt Fl. boëm. IV. 81. No. 378 (1794). Hall in Hook. Journ. Bot. I. 21. Mich. Fl. Hein. 140 (1845). Nachtr. Aschers. in Verh. Brdbg. Ver. 123 (1866). Chamaenerium obscurum Fl. Dan. fasc. XXII. t. 1267 (1810). *E. decurrens* Spreng. Hort. Hel. sec. Ib. Lips. (1812). *E. adnatum* Griseb. Bot. Ztg. X. 851. 854 (1852). Hausskn. Beitr. i. Bot. Ver. Brdbg. XIII. 154 (1871). *E. Tournefortii* Freyn S. Istr. 97 (1877) etc.

Icon. Fl. Dan. fasc. 22 t. 1267 (1810). Rehb. ic. II. t. 198. f. 340 (1824). Dietr. Fl. univ. II. sect. 69. t. 578 (1865). Hausskn. Mon. t. II. fig. 31 (ic. sem.).

E. radice tenera simplici, ad collem breviter tortuosa, v. rhizom. brevi, abscisso, crassiusculo breviter radicante, multifibrilloso, in autumno rosulas sessiles edente, fol. innovatoriis frondosis, subtus valde nervosis, lacte viridibus, ab initio conniventibus sed mox recurvatis; infinis minoribus obovatis, in petiolum sensim spatulato-angustatis, apice leviter emarginatis, margine integerrimis; sequentibus gradatim majoribus, obovato-oblongis, margine subdenticulatis, in petiolum abrupte angustatis; superior. angustioribus, oblongo-lanceol., obtusis, sensim in petiolum alatum canaliculatum angustatis, argute serrulato-denticulatis. Caule in pl. ☉ striete erecto, tenero, simplici, pumilo, inferne tereti, foliis infinis oppositis petiolis basi connatis; petiolis foliorum superior. basi gradatim solutis et hinc superne caule lincis 2—4 elevatis glabris e foliorum marginibus decurrentibus notato; caule in pl. per reproduct. ort. basi foliis innovatoriis emarcidis confertis obsito, e basi breviter arcuato erecto, tetragono, subalato, lincis 4 elevatis e foliorum marginibus decurrentibus notato, plerumque in parte media superiori ramulis

elongatis strictis praedito, pedali v. pluripedali, pallide viridi v. leviter purpurascente, folioso, floribundo, inferne glabro lucido, in inflorescentia pilis adpressis brevissimis sparse obsito, crassitie penna columbinae et ultra, ante anthesin apice erecto. Foliis pl. ☉ infimis ovato-oblongis obtusis, utrinque aequaliter angustatis, in petiolum manifestum sensim angustatis, 2—4 cm long., 7—15 mm lat., breviter remoteque denticulatis, petiolis basi connatis; sequentibus gradatim longioribus, apicem versus longius, basin versus brevius angustatis, oblongo-lanceolatis, obtusiusculis, superioribus e basi rotundata sessilibus, lingulatis, crebrius denticulatis, subtus nervis minus prominentibus glabris percursis; foliis in pl. per reprod. ort. angustioribus longioribusque, — 8 cm long., — 1 cm lat., lanceolatis, e basi dilatata sensim in apicem angustatis, basi late sessilibus, marginibus m. m. foliacea-decurrentibus, calloso-mucronulatis, serrato-denticulatis, denticulatis valde argutis, dense dispositis repandis, antice curvatis, minoribus interpositis munitis, nervo medio glabro basi excurrente, nervis sec. prominentibus, venis conspicuis, summis ad nervum med. glabrescentibus. Alabastris angustis ellipsoideis, utrinque sensim attenuatis acutis, adpresse pilosis. Floribus minutis, 4—6 mm longis, erectis, petalis pallide roseis, acute incis, calyce sublongioribus. Calyc. lacin. anguste lanceol. acutis, 3.5—4 mm longis, basi 1 mm latis; tubo caescente, 1—1.5 mm longo latoque. Stigm. clavato obovoideo-oblongo, 2.5 : 1 mm long. lat., in stylum aequilongum v. subbreviorem attenuato; filamentis pallide roseis. Capsulis gracilibus, junior. canescentibus, adultis pallide viridibus, breviter adpresseque pilosiusculis, — 8 cm longis; pedicellis — 2 cm longis. Semin. obovoideis apice rotundatis, basi abrupte attenuatis obtusis, 1 mm longis, $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ mm latis, testa papillis elongatis, dense obsita.

Flor. Jul.—Sept.

Formae:

a) simplex. *b) major.* *c) stenophylla.*

Hab. In Germania tota passim ad fossarum et aquarum margines virgultosos, in silvis humidiusculis montosis et demissioribus; in Hollandia, Belgia, in tota Austria plura et in vall. Alpium e. c. in Tirolia ad Girkon, Talfers, St. Antoni, Seis etc.; in Hungaria, Bucovina, Transsilvania, in Banatu, Istria, Dalmatia, Croatia, probabiliter etiam in Bosnia, Serbia et Albania; in Bulgaria, in Dobrudzha.

Formae hybridae:

- E. adnatum* × *hirsutum*.
- E. adnatum* × *Lamyi*.
- E. adnatum* × *lanceolatum*.
- E. adnatum* × *montanum*.
- E. adnatum* × *obscurum*.
- E. adnatum* × *palustre*.
- E. adnatum* × *parviflorum*.
- E. adnatum* × *roseum*.

Icon. t. 12. **Planta florens et fructifera.** 1. et 2. Semina antice et a latere visa. 3. Flos sine perianthio. 4. Blastema et caulis fragmentum.

Epilobium Lamyi F. Schultz. Syn. *E. tetragonum* β *pseudo-virgatum* F. Schultz in hb. Koch (1843). *E. virgatum* Lamy exs. Wirtg. pl. crit. No. 236 bis (1858). *E. tetragonum* β *Lamyi*. F. Schultz in Bull. soc. bot. Belg. XIV (1875).

Icon. Tabernaem. cic. 853 (1510), ej. Kreuterb. II. 527 (ed. 1625). Hausskn. Mon. tab. II. fig. 28 (ic. sem.).

E. radice tenera simpliciter v. rhizom. brevissimo abscisso, fibrillis elongatis grossiusculis numerosis obsito, rosulas autumnales sessiles edente, foliis innovatoriis frondosis ut in E. adnato, sed lucidis subglaucentibus, infimis ovatis obtusis non leviter emarginatis, sequentibus sensim in petiolum angustiores angustatis, vix denticulatis, superioribus denticulis magis remotis minoribusque munitis, petiolis applanatis nec canaliculatis, subtus nervis minus prominentibus percursis. Caule stricte erecto, duro, folioso, pilis subarcuato-adpressis praecipue in inflorescentia dense obsito, ante anthesin apice erecto: in pl. ☉ plerumque simplici pumilo tenero, m. m. paucifloro, inferne ancipiti, superne leviter tetragono, lineis 2—4 pilosis, parum elevatis et petiolorum marginibus decurrentibus notato; in pl. per reproduct. ort. robusto, crassiori, pedali et ultra, ramosissimo, floribundo, a basi ad apicem tetragono; inferne glabro lucido, lineis 1 pilosis manifestis notato, ad collem fol. innovatoriis emarcescentibus praedito. Foliis subglaucescentibus v. saepe erubrescentibus, patulis v. saepe subdeflexis, nervis secundariis parum prominentibus, inferior. obtusis glabrescentibus, intermediis obtusiusculis, 3—4 cm longis, $\frac{1}{2}$ —1 cm latis, superior. acutis mucronulatis, ad nervum med. et ad marg. adpresse pilosis; in pl. ☉ oblongo-lanceolatis, basi subrotundatis, breviter sed manifeste petiolatis, denticulis valde remotis parvis vix repandis munitis; fol. in pl. per. reprod. ort. plerumque minoribus, apicem versus longius angustatis mucronulatis, intermediis abrupte, superioribus fere cuneato-angustatis, limbo non foliaceo-decurrente, denticulis magis acutis crebrioribusque munitis, caulinis sessilibus, ramealibus breviter petiolatis. Alabastris ovoideis, apice breviter acutatis, basi abrupte attenuatis. Floribus ante anthesin erectis, 5—8 mm longis, petalis laete roseis, obovato-rotundatis, breviter incis, venis obscurioribus percursis, calyce $\frac{1}{8}$ longioribus. Calyc. lacin. lanceolatis acutis, praecipue ad nervum medium adpresse pilosis, $3\frac{1}{2}$ —4 mm longis, $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ mm latis; tubo dense adpressequae albido-piloso, $1\frac{1}{2}$ —2 mm longo latoque. Stigm. anguste clavato, 3 : $\frac{3}{4}$ mm long. lat., in stylum aequilongum attenuato. Capsulis junior. dense albido-, adultis cinereo-pilosis, 5—6 cm longis; pedicellis 1— $1\frac{1}{2}$ cm longis v. brevioribus, fol. fuller. brevioribus. Semin. obovoideis, apice rotundatis, basi abrupte attenuatis, 1 : $\frac{1}{2}$ mm long. lat., testa papillis elongatis obsita.

Flor. Jul.—Sept.

Formae:

a) annua, b) biennis, c) aprica, d) umbrosa.

Hab. In lapidinis, in collibus graminosis, in silvis collucatis substrato siliceo vel calcareo. In Germania: Pommern bei Stettin, Holstein bei Steinsbüttel in N. Dithmarschen. Schlesien, Hannover, Westfalen, Lippe; in Thüringen, Franken, in der Rhön. Kurhessen, bei Frankfurt, Heidelberg, Baden, Freiburg, am Feldberg. Im Rhein-, Mosel-, Lahnthal. Nahethal. Im bayrischen Walde auf Gneiss, in den Donauleithen zwischen Passau und Obernzell. Belgien. Schweiz und Oesterreich an vielen Orten. Serbien, Rumelien.

Formae hybridae:

- E. adnatum* × *Lamyi* v. *E. adnatum* Griseb.
- E. Lamyi* × *lanceolatum*.
- E. Lamyi* × *montanum*.
- E. Lamyi* × *obscurum*.
- E. Lamyi* × *parviflorum*.
- E. Lamyi* × *roseum*.

Leon. t. 13. *Planta florens et fructifera.* 1. Folium. 2. Fragmentum caulis et folii basis
3 a b. Semen antice et a latere visum. 4. Flos. perianthium et calyx et stamina
ex parte detr. absc.

Epilobium obscurum Schreb. Syn. *E. tetragonum* Pollich Pal. 1. 377. No. 372 (1776). Fl. Dan. 18. 1029 (1792). Hoffm. germ. ed. 2. 178 p. p. (1800). Sturm Fl. 18. 81. Hegetschw. 258 (1840). Benth.

Handb. Br. Fl. ed. 2. 159, p. p. (1866). Hook. Stud. Fl. 144 (1870). *E. purpurascens* Gilib. Fl. Lith. V. 189 (1781); ej. Exerc. physiol. II. 319 (1792). *E. virgatum* Spreng. Syst. II. 233. excl. syn. (1825). Koch Tschb. ed. 3. 182 (1851). Kirschl. Alsat. I. 268. Flor. Dan. 44. t. 2588 (1858). Hausskn. Beitr. in Verh. Brdkg. XIII. 134 (1871). *E. flaccidum* Brot. Lusit. II. 18 (1804). DC. Prodr. III. 43 (1828). *E. chordorrhizum* Fries Summa 177 (1846). Aschers. in Bot. V. Brdkg. 1866. p. 124. Buchen. Brem. 93 (1877), ed. 2. 100 (1879). O. Fr. Jus. 66 (1881). *E. tetragonum* β caule ramoso Wender. Hess. 115 (1846). Sendtn. Veg. Bair. W. 228 (1860). *E. palustre* \times *tetragonum* Kuntze Fl. Leipz. 256 p. p. (1867).

Icon. Fl. Dan. fasc. 18. t. 1029 (1792), 41. t. 2588 (1858). Lam. Illustr. gen. II. t. 278. No. 4 (1793). Rehb. Ic. II. t. 199. f. 341 (1821). Sturm Fl. 18. 81. sub *E. tetrag.* (1840). Hausskn. Mon. t. II. fig. 33 a b (ic. sem.).

E. radice simpl. tenera elongata v. fasciculata fibrillosa v. rhiz. longe repente radicante tenero, non raro ramoso, multicipiti, in pl. ☉ post florescentiam, in pl. per reprod. ort. jam florendi tempore stolones epigaeos saepe purpurascens decumbentes elongatos laxos, serius radicantes edente, foliis innovatoriis frondosis obscure viridibus v. purpurascens, integerrimis subtus nervosis, infimis parvis obovatis, apice rotundatis, in petiolum manifestum decurrentibus, remote dispositis, superioribus gradatim majoribus, 2—4 cm longis, —1 cm latis, apicem versus spathulato-dilatatis, sequentibus oblongis v. ovato-oblongis, utrinque magis angustatis, apice obtusis, in petiolum fere planum cuneato-decurrentibus, summis magis confertis et elongatis, denique in rosulam laxam dispositis, limbo late decurrentibus. Caule tenero v. crasso, stricte erecte v. basi decumbente, laxo adscendente, simpl. v. a basi ad apicem ramosissimo, ante anthes. apice subnutante, pumilo v. pluripedali, obscure viridi v. purpurascens, facile compressibili, inferne glabro lucido, inflorescentiam versus tenuiter adpresseque cinereo-piloso, lineis parum elevatis 2—4 e fol. marginibus decurrent. glabris, superioribus tantum pilosiusculis v. omnibus pilosis notato, in pl. ☉ basi undo, in pl. per reprod. ort. ad collem plerumque fol. innovatoriis emarcidis munito. Foliis tenuibus flaccidis v. rigidiusculis, stricte erectis, in pl. ☉ infimis minoribus obovatis, reliquis oblongis breviter petiolatis, oppositis petiolis connatis, marginibus bifarium decurrentibus, inferioribus in petiolum cuneato-angustatis, subintegerrimis, obtusis, intermediis superioribusque in petiolum brevius angustatis, acutiusculis, denticulis minimis remotis vix repandis leviter notatis, subtus nervis parum prominentibus munitis, inferioribus utrinque glabris, superioribus ad nervos marginesque tenuiter pilosiusculis; in pl. per reprod. ort. lanceol. sessilibus, limbo ad basin abrupte rotundatis, saepe ad caulem breviter foliaceo-decurrentibus, apicem obtusum versus longe angustatis, denticulis magis manifestis, subtus nervis prominentioribus notatis, ramealibus breviter petiolatis. Alabastris ellipsoideis, obtusiusculis adpresse cano-pilosis. Floribus parvis, 5—7 mm longis, virgineis subnutantibus, petalis obovato-cuneatis, roseo-lilacinis, 2,5—3 mm latis, acute incis, lobis obtusis, apicem versus angustatis, venis obscurioribus 6—7 percursis. Calyx. lacin. lanceolatis, apice breviter angustatis acutis, adpresse cano-pilosis, 3—4 : 1 mm long. lat., tubo dense cano-piloso, 1—1,5 mm longo. Stigm. anguste clavato, 1,5— $\frac{3}{4}$ mm long. lat., in stylum 2,5 mm long. attenuato; filamentis pallide violaceo-roseis. Caps. gracilibus, 5—7 cm longis, c. pedicellis 1—2 cm longis, adpresse cano-pilosis. Semin. pallide cinereis, obovodeis, apice rotundatis, basi breviter attenuatis obtusiusculis, 1 : 0,5 mm long. lat., testa papillis brevibus angustis dense obsita.

Flor. Jun.—Oct.

Formae:

a) *annua.* b) *biennis.* c) *crassicaulis.* d) *strictifolia.* e) *minor.* f) *elatior.* g) *ramosissima.* h) *flaccida.*

Hab. In paludibus praecipue turfosis, in fossis virgultosis, in silvis caeduis, in montosis ad scaturigines rivulosque passim in Germania: Schleswig und Holstein, Lübeck, Neustadt, Hamburg, bei Eppendorf, Flottbeck, Volksdorf, Bergedorf, Eschburg, Trittau; auf den ostfries. Inseln. Bremen, Nien-

burg. Bremervorde, Walsrode. Crantz O. Preuss. In Pommern auf Rügen, Usedom, Swinemünde gen Corswant, Fuss des Golms, Krebssee bei Banzin. Insel Wollin; Grabow in Pos., Sülten. Stuhm am See bei Montken, Prov. Preussen; in der Mark bei Dahlen im Havelabhang, Arendsee, Straussberg, Schwiebus, Krossen. Guben, Dagower See, Friesack, Jüterbog, Lichterfelde bei Berlin, Driesen in N. Mark, Magdeburg, Pirna, Tharandt, Löschwitz, Saloppe bei Dresden, sächs. Schweiz. Bei Leipzig, Wittenberg; in Schlesien in der Oderniederung, Zobtenberg, Strehlen, Hirschberg, Schreiberhau, Schmiedeburg, im Riesengebirge, Krummhübel, Görbersdorf, Friedland, Warmbrunn, Sprottau, Lüben, Eulengebirge, Rabengebirge, Landshut, Adersbach, Oppeln etc. Im Harz; bei Göttingen, Münder am Deister. Hameln. In Lippe. In Oberhessen bei Gelnhausen. Wilhelmshöhe. Im Spessart. In Thüringen, Franken, Westfalen. In der Rheinprovinz, im Ruhrthal, Oden- und Schwarzwald, in der Pfalz, in den Vogesen. In Württemberg, Bayern. In Holland und Belgien. In Luxemburg. In der Schweiz und in Oesterreich an unzähligen Orten. In Croatia.

Formae hybridae:

- E. adnatum* × *obscurum* v. *E. adnatum* Griseb.
- E. alsinefolium* × *obscurum* v. *E. alsinefolium* Vill.
- E. collinum* × *obscurum* v. *E. collinum* Gmel.
- E. Lamyi* × *obscurum* v. *E. Lamyi* F. Schultz.
- E. lanceolatum* × *obscurum* v. *E. lanceolatum* Seb. et Mauri.
- E. montanum* × *obscurum* v. *E. montanum* L.
- E. obscurum* × *palustre*.
- E. obscurum* × *parviflorum*.
- E. obscurum* × *roseum*.
- E. obscurum* × *trigonum*.

Icon. t. 14. **Planta florens et fructifera.** 1. Semen antice et a latere visum.

Epilobium nutans Schmidt. Syn. *E. alpinum* Willd. Hb. p. p. Jacq. Hb. p. p. Kitaib. Hb. pp. Sendtn. Veg. S. B. 771. p. p. (1860). *E. alpinum* β *nutans* Pohl Tent. Boh. 64 (1810). Rehb. Saxon. 353 (1842). Koch Syn. ed. 2. 268 (1843). Koch Tschb. ed. 3. 184 (1851). Rabenh. Saxon. 292 (1859). *E. heterophyllum* Hegetsch. Beitr. crit. Aufz. 337 (1831); ej. Fl. Schw. 359 (1840). *E. palustre* β *nutans* Grab. Fl. O. Schles. 111 (1813). Wimm. Fl. Schles. ed. 3. 609 (1857). *E. sudeticum* Beurl. in Bot. Not. 185 (1853); id. Pl. vase. Scand. 19 (1859).

Icon. Rehb. Ic. crit. II. t. 197 (f). Dietr. Fl. univ. II. sect. 69. t. 577. Hausskn. Mon. tab. II. fig. 31 a b (ic. sem.).

E. rhizoni, tenerrimo repente radicante, stolones epigeos prostratos v. arcuatos apice subrosulatos emittente, foliis innovatoriis frondosis, remotiuscule dispositis, pallide viridibus; inferioribus rotundatis, in petiolum manifestum abrupte decurrentibus; superioribus majoribus, oblongo-ovatis, basi sensim angustatis. Caule e basi radicante breviter adscendente, erecto, pumilo, spithamaeo vel dodrantali; tenero v. crassitie pennae columbinae, simplici, inferne glabrescente, superne pilis brevibus crispulis circum tenuiter pilosiusculo, inferne lineis 2 elevatis glabrescentibus oppositis, superne lineis 4 pilosiusculis e foliorum alternantium marginibus decurrentibus notato, florendi tempore apice nutante, serius erecto. Foliis carnosiusculis, summis exceptis integerrimis, glabris sublucidis, obtusis, margine planis, infimis parvis confertis, obovato-spathulatis, sequentibus ovatis v. obovatis, superioribus ovato-lanceolatis v. oblongis; inferioribus breviter petiolatis, reliquis subsessilibus, limbo ad basin usque sensim decurrente; superioribus remote subdenticulatis, 1—3 cm longis, 2—8 mm latis. Alabastris ovoideo-oblongis, obtusis, glabrescentibus. Floribus parvis, ca. 5 mm longis, virgineis nutantibus; petalis pallide violaceis, calyce

dimidio longioribus. Stigm. clavato. Calyx lacin. lanceolatis, acutis, glabrescentibus, saepissime colore purpureo tinctis, 2,5 : 1 mm long. lat., tubo vix pilosiusculo, 1,5 mm longo. Capsulis junioribus adpresse incano-pilosis, adultis sparse pilosiusculis, plerumque purpurascentibus, ab initio nutantibus, serius erectis, 3,5—4 cm longis; pedicellis tenuiter pilosis, 1,5—2 cm longis, fol. fulcr. plerumque subaequilongis v. longioribus. Semin. fuscis, e basi longe attenuata elongato-fusiformibus, apice sensim in appendiculum elongatum pellucidum attenuatis, vix 1,5 mm longis, 0,5 mm latis; testa minutissime papillosa.

Flor. Jul.—Sept.

Formae:

a) major. b) confertifolia. c) flaccida.

Hab. In pascuis humidis et in rupibus irrigatis reg. subalp. et alpinae. Erzgebirge, Sudeten, häufig im Riesengebirge, im Gesenke am Altvater, Klausen- und Aupagrund, Carlsbad, Teplitz. Im Böhmerwald, im bayrischen Walde, in den westgal. Beskiden. In den Central-Carpathen, im Schwarzwald am Feldberg 4—5000'. In den Vogesen, auf Granit des Hoheneck. In den bayrischen Alpen. In Ungarn, in Oesterreich und der Schweiz an mehreren Stellen: Dachstein, St. Gotthard, Gr. St. Bernhard, Güldenstock. Wengernalp, probabiliter per totam regionem alpinam Helvetiae.

Formae hybridae:

E. alsinefolium × *nutans* v. *E. alsinefolium* Vill.

E. anagallidifolium × *nutans* v. *E. anagallidifolium* Lam.

E. nutans × *palustre*.

Leon. t. 15. **Planta florens et fructifera.** t. Folium. 2 a b. Semen antice et a latere visum.

Epilobium trigonum Schrank. Syn. *Lysimachia siliquosa purpurea Alpina trifoliata* Bocc. Mus. H. 22. t. 5 (1697). Ray. Hist. pl. III. lib. 16. 127 (1704). *E. montanum* var. Vill. Hist. Dauph. I. 285 (1786); ej. var. foliis ternis v. quaternis III. 509 (1789). Schmidt Fl. boëm. incl. IV. 80. No. 376 (1794). Willd. Spec. pl. II. 316 (1799). *E. alpestre* Jacquini Krock. Fl. Sil. I. 605. No. 588 (1787). Hoppe Exs. cent. I (1799). Rehb. Sax. 354 (1812). Kirschleger Fl. Vog. Rh. 187 (1870). Dalla Torre Alp. 209 (1882) etc. etc.

Leon. Cupani Hort. Cath. II. t. 5 (1697). Rehb. Ic. II. t. 200 f. 342 (1824). Dietr. Fl. univ. II. sect. 69. t. 577 (1839). Sturm Fl. 18. 81 (1840). Hausskn. Mon. tab. II. fig. 35 a b (ic. sem.).

E. radice fasciculata v. rhiz. obliquo, crasso, subtortuoso, parum elongato, abscisso, fibris grossis elongatis dense obsito, ad collem turiones hypogaeos sessiles erectos breves vel vix unciales, apicem versus attenuatos edente, foliis innov. kataphylloideis imbricatis, pallidis, carnosis, enerviis, ca. 5 mm longis, e basi 3 mm lato in apicem acutiusculum angustatis. Caule robusto, crassitie pennae columbinae v. anserinae et ultra, simplici, rarius superne subramoso, erecto, pallido, folioso, ante anthesin apice nutante, basi foliis innovatoriis emarecidis nigricantibus obsito, tereti, inferne glabrescente, lineis 2—4 patenter pilosis e foliorum marginibus decurrentibus notato, superne praeter lineas pilosas sparse piloso, in inflorescentia undique glanduloso-pubescente. Foliis laete viridibus, supra lucidis, subtus subpallidioribus, summis exceptis ternato-verticillatis, rarius quaternis, basi vaginato-comatis, summis floralibus alternis; inferioribus minoris glabrescentibus, ovato-oblongis, obtusis, breviter denticulatis, in petiolum sensim angustatis; intermediis basi rotundatis, sessilibus subamplexicaulibus, ovato v. oblongo-lanceolatis, in apicem acutum brevius v. longius angustatis; denticulis calliferis, vix v. parum repandis, m. m. remotis, argutis, antice curvatis; marginibus nervisque puberulis caeterum glabris, 1—7 cm longis, 1—2 cm latis. Alabastris utrinque aequaliter attenuatis, ellipsoideis, acutis, pilis patentibus sparse obsitis. Floribus in

racemum parum elongatum dispositis, majusculis 8—15 mm longis, virginicis submutantibus; petalis roseo-lilacinis, obo cordatis ca. 7 mm latis, anguste profundeque (4 mm) incis. calyce subrupto longioribus. Calyc. lacin. ovato-lanceolatis acutis $5\frac{1}{2}$ —6 mm longis, $1\frac{1}{2}$ —2 mm latis, sparse pilosiusculis; tubo piloso 2— $2\frac{1}{2}$ mm longo, $2\frac{1}{2}$ mm lato. Stigm. cylindrico, utrinque parum attenuato, 2 : 4 mm longo latoque. Capsulis strictis robustis, pilis patentibus glandulosis immixtis leviter pubescentibus, 6—8 cm longis, rostro 6 mm longo; pedicellis strictis brevibus, ca. 1 cm longis, fol. fulcr. multo brevioribus. Semin. majusculis, fuscis, fusiformibus, basi breviter attenuatis, apice testa in appendiculum pellucidum producta 2 : $2\frac{3}{4}$ mm long. lat. testa tenuiter papillosa, coma sordide albida.

Flor. Jul.—Sept.

Formae:

a) oppositifolia. b) tetraphylla. c) alternifolia. d) angustifolia. e) latifolia. f) parviflora.

Hab. In regione montana et alpina ad rivulos, in pascuis humidis. Vogesen: Hoheneck, am rothen Bach, Ballon de Servance, am Schitelet. Oberbaden: bei Immendingen, im Schwarzwald am Feldberg. Bayr. Alpen: Allgäu, Königssee, Spitzingsee, Reichenhall etc. Erzgebirge: Am Fichtelberg im Zech- und Hüttengrund bei Oberwiesenthal. Im Isargebirge spärlich. Riesengebirge: Riesengrund, Teufelsgärtchen, auf Basalt der Schnee gruben, Kesselgrube etc. Gesenke am Leiterberg, Altvater 2800'. Glatzer Schneeberg im Mohren thale etc. Babia Gora 3500—4400'. Tatra an vielen Stellen. Im Banat, in Transsylvanien, Bosnien, Croatia, im litoralen Illyrien, in Steyermark, Tirol, in den Salzburger Alpen, in den Ober- und Niederöstr. Alpen an sehr vielen Orten.

Formae hybridae:

E. alsinefolium × *trigonum* v. *E. alsinefolium* Vill.

E. montanum × *trigonum* v. *E. montanum* L.

E. obscurum × *trigonum* v. *E. obscurum* Schreb.

E. palustre × *trigonum* v. *E. palustre* L.

Leon. t. 16. **Planta florens.** 1, 2. Semen antice et a latere visum. 3. Flos calyx et corolla ex parte absc.

Epilobium palustre L. Syn. Chamaenerion angustifolium glabrum Tournef. Inst. (1700), ed. 3. 303 (1719). Chamaener. medium salicariae foliis Vaill. Hb. No. 1. *E. tomentosum* Gilib. Fl. Lithuan. V. 189 (1781). Chamaenerion palustre Mönch. Meth. 678 (1794). *E. oliganthum* Michaux Fl. bot. Am. I. 223 (1803). DC. Prod. III. 43 (1828). Don. Hist. diehl. pl. II. 681 (1832). Hook. Fl. bor. Am. I. 218 (1833). Dietr. Syn. 1292 (1840) etc.

Leon. Cic. 856 (1590); ej. Kreuterb. II. 522 (1591). II. 527 (1625). Oeder Fl. Dan. II. 347 (1767). IX. t. 1571 (1818). Sturm Fl. 18. 81. No. 7 (1840). Hausskn. Mon. tab. II. fig. 30 a b (ic. sem.).

E. radice simplici tenera, ad collem tortuosa, v. rhizom. repente radicante m. m. elongato, ad collem soboles subepigaeos filiformes m. m. elongatos, non radican tes, flerendi tempore plerumque jam conspicuos edente, intermediis valde remotis, foliis innov. kataphylloideis pallidis minutis, ovatis v. obovatis, obtusis, recurvis; sobolibus sero auctumno gemma ovoidea strobuliformi terminatis, kataphyllis dense quadrofario-imbricatis, pallidis v. obscure olivaceis, squamiformibus, subcarnosis, ovatis, apice mucronatis, facie interna concavis, epidermite membram tympani instar supra cavitatem expansa; gemma in tempore hiemali a planta demum resolvitur et anno proximo novam plantam efficit. Caule erecto v. adscendente, simplici v. ramoso, pusillo v. pluripedali, ante anthesin apice nutante, serius erecto, rarius ante anthesin erecto, tereti, lineis decurrentibus destituto v. hinc inde lineis obiter decurr. notato, inferne glabrescente, superne m. m. pilis arcuato-adpressis, rarius pilis glandulosis patentibus immixtis, obsito.

Foliis oblongo-lanceolatis v. lanceolato-linearibus v. anguste linearibus, integerrimis, basi cuneato-angustatis sessilibus, infra medium sublatis, apicem versus sensim angustatis, apice callo obtusiusculo terminatis v. rarius acutis, glabrescentibus v. ad nervum et ad margines revolutos crispule puberulis, venosis v. v. aveniis, remote v. dense dispositis, spaciis, subtus pallidioribus, varia latitudine longitudineque. Alabastris ovoideis, obtusiusculis v. vix apiculatis, parce pilosiusculis. Floribus parvis, 4—8 mm longis, virgineis mutantibus, rarius erectis; petalis late emarginatis, pallide lilacinis v. violaceis, v. albidis. Calyc. lacin. lanceol. acutis, parce pilosiusculis; tubo infundibuliformi, magis piloso. Stigm. obovato-olovato, $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ mm long. lat. Caps. 3—9 cm long., junioribus pilis subadpressis brevibus cinereo-pubescentibus, adultis praecipue ad angulos pubescentibus, pedicellis 1—5 cm long., crispule pubescentibus, fol. fulcr. brevioribus v. subaequilongis v. sublongioribus. Sem. $1\frac{1}{2}$ —2 mm long., $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ mm lat., fusciformibus, basin versus sensim attenuatis acutis, apice breviter in appendiculum papillosum attenuatis, testa papillis brevibus rotundatis dense obsita.

Flor. Jul.—Sept.

Formae:

- a) *major ramosa* (aprica, umbrosa): major simplex (aprica, umbrosa).
- b) *minor ramosa*: minor simplex.
- c) *remotifolia*: confertifolia, verticillata.
- d) *brevisfolia*: longifolia, latifolia, angustifolia.
- e) *pilosa*: glandulosa, glabrescens.
- f) *parriflora*: grandiflora, incarnata, violacea, albiflora.
- g) *brevipedicellata*: longipedicellata, forma putata.

Hab. Passim in paludibus spongiosis, praecipue in solo siliceo v. turfoso, in pratis uliginosis, ad rivulos, in fossis silvisque humidis, planitierum usque ad region. alpinam et in tota regione arctica. Tota Europa.

Formae hybridae:

- E. adnatum \times palustre v. E. adnatum Griseb.
- E. alsinefolium \times palustre v. E. alsinefolium Vill.
- E. anagallidifolium \times palustre v. E. anagallidifolium Lam.
- E. collinum \times palustre v. E. collinum Gmel.
- E. Duriaei \times palustre v. E. Duriaei Gay.
- E. hirsutum \times palustre v. E. hirsutum L.
- E. Hornemanni \times palustre v. E. Hornemanni Rehb.
- E. lactiflorum \times palustre v. E. lactiflorum.
- E. lanceolatum \times palustre v. E. lanceolatum Seb. et Mauri.
- E. montanum \times palustre v. E. montanum L.
- E. nutans \times palustre v. E. nutans Tsch.
- E. obscurum \times palustre v. E. obscurum Schreb.
- E. palustre \times parviflorum.
- E. palustre \times roseum.
- E. palustre \times trigonum.

Icon. t. 17. Plantae pars. 1. Fructus. 2. Apex plantae florentis. 3 a b. Semen antice et a latere visum.

Epilobium alsinefolium Vill. Syn. E. organifolium Lam. Diet. encycl. II. 376. No. 10 (1786). Dietr. Lexic. Nachtr. III. 106 (1803). DC. Pr. III. 11 (1828). Don Hist. Diehl. pl. II. 680 (1832). Dietr.

Fl. univ. II. sect. 69. t. 578 (1839). Rehb. Ic. crit. II. p. 74. Sturm Fl. 18. 81 (1810). Rehb. Sax. 351 (1842). Koch Syn. ed. 2. 267. Doll Rh. Fl. 714 etc. *E. alpestre* Schmidt Fl. böhm. IV. 81. No. 377 (1794). Schult. Oestr. Fl. ed. 2. I. 595. No. 1405 (1814). Baumgart. Enum. 675 (1816). Tausch in Fl. (1828). *E. Schmidtii* Flörke in hb. Berol. *E. roseum* Kitaib. Additam. 274 p. p. *E. alatum* Hegetschw. Fl. Schw. 357 (1810). Dietr. Syn. II. 1293 (1810). *E. nitidum* Santer Salz. 244 (1866) etc.

Icon. Rehb. Ic. crit. II. t. 180. f. 314 (1821). Dietr. Fl. univ. II. sect. 69. t. 578 (1839). Sturm Fl. 18. 81 (1810). Fl. Dan. fasc. 44 t. 2587 (1858). Hausskn. Mon. t. I. fig. 14 a b (ic. sem.).

E. rhizom. repente m. m. elongato tenero, fibrillis albescens elongatis numerosis obsito, soboles hypogaeas pallidos m. m. elongatos, grossiuscule filiformes, florendi tempore jam conspicuos radicanter edente, kataphyllis oppositis squamiformibus pallidis, enerviis, carnosiss, remote dispositis, obovato-oblongis, obtusis, sessilibus, 4—5 mm longis, latisque munitis, in aetumno ad sobol. apicem in gemmam subglobosam bulbiformem laxè dispositis, kataphyllis imbricatis dimidia fere latoribus, apice late rotundatis. Caules plures ex eodem rhizomate, ad basim foliis innovat. emarcidiss obsiti; caule e basi decumbente arcuato-adscendente, flexuoso v. erecto, tenero v. crassitie pennae columbinae, pumilo v. dodrantali, rarius pedali, simplicis v. parce ramoso, florifero apice nutante, m. m. paucifloro, folioso, lineis 2—4 elevatis m. m. pilosis v. inferne denique glabrescentibus e foliorum marginibus decurrentibus notato, caeterum glabro obtusangulo. Foliis inferioribus oppositis, reliquis alternis, subcarnosis, obscure viridibus, oleosolucidis, subpetiolatis, inferioribus minoribus glabris integerrimis obovato-oblongis obtusis, sensim in petiolum angustatis; intermediis ovatis v. ovato-ellipticis, apicem versus breviter angustatis, obtusiusculis, basi rotundatis, abrupte in petiolum contractis v. sensim in petiolum cuneato-angustatis, subtus nervis secundariis glabris prominentibus praeditis, venosis, —4 cm longis, 1,5 cm latis, denticulatis parvis leviter repandis irregulariter munitis; floralibus minoribus, acutiusculis, ad margines sparse pilosiusculis. Racemo m. m. paucifloro, ante anthesin nutante. Alabastris ovoideis obtusis v. brevissime apiculatis. Floribus majusculis, 8—12 mm longis, virgineis nutantibus; petalis oblongo-cuneatis, lilacino-violaceis, profunde obtuseque emarginatis, venosis, calyce $\frac{1}{3}$ longioribus. Calyce lacin. lanceolatis, acutis v. interdum obtusiusculis, glabrescentibus, plerumque purpurascens, 1,5—5 mm longis, $1\frac{1}{4}$ —1,5 mm latis; tubo 1,5—2 mm longo latoque, pilis glanduliferis sparse obsito. Stigmate anguste clavato, apice leviter emarginato, 2 mm longo, $\frac{3}{4}$ mm lato; filamentis plerumque pallide lilacinis. Capsulis crassiusculis purpurascens subluccis, 5—6 cm longis, junioribus pilis glanduliferis patentibus brevibus sparse obsitis, adultis glabrescentibus; pedicellis glanduloso-pilosiusculis, fol. fulcr. brevioribus, 1—2 cm longis. Seminibus pallide-fusco-cinereis, fusiformibus, basin versus longe attenuatis acutis, apice in appendiculum pellucidum elongatum productis, 1,5—0,5 mm long. latis, testa glabra leviter impressa.

Flor. Jul.—Sept., in planitie jam medio Junio incipiens.

Formae:

a) *simplex*. b) *ramosa*. c) *nivalis*. d) *umbrosa*. e) *latifolia*. f) *alternifolia*. g) *angustifolia*. h) *brevifolia*.

Hab. Schwarzwald am Belchen, Feldberg. Kaiserstuhl. In den Vogesen. In alp. Bavariae: vom Ufer der Alpenseen herab bis zum Hintersee bei Ramsau 6000—2450' gemein; im Allgäu z. B. Daumen auf Feldalpe 5300', Alpe Schlappolt am See, Hieren Alpe, Hirschegger Alpe, Geisseralpersee etc. Hintersee bei Berchtesgaden, Rossfeld, Latfeld, Höllenthal an der Zugspitze, Benediktenwand, Königsee, Oberlalm Alpe etc. Im Riesengebirge an Bächen der Thäler und Kämme bis zu den Grenzbauden herab. Glatzer Schneeberg. Austria: Riesengebirge auf böhm. Seite bis zur Spindelmühle, Dunkelthal herab von 1000—2500' allgemein verbreitet. Im Gesenke auf dem Leiterberg, Knoblauchswiesen, Peterstein, Kessel, Oppafall, Altvater, Bialaquelle. In den Beskiden auf der Babia Gora, Pilsko. In der Tatra

häufig von den Thälern bis zur oberen Kiecholzregion. In Transsylv., Croatiae subalpin., Serbia. Im litoralen Illyrien. Helvetia: in den Alpen von Graubünden, Wallis, Bern; Uri, Glarus, Appenzell etc. häufig; bei Genf. Im Jura.

Formae hybridae:

- E. alsinefolium × anagallidifolium.
- E. alsinefolium × collinum.
- E. alsinefolium × Duriaei.
- E. alsinefolium × Hornemannii.
- E. alsinefolium × montanum.
- E. alsinefolium × nutans.
- E. alsinefolium × obscurum.
- E. alsinefolium × palustre.
- E. alsinefolium × roseum.
- E. alsinefolium × trigonum.

Icon. t. 18. **Planta fructifera.** 1. 2. Semen antice et a latere visum. 3. Flos, perianthium p. p. absc. 4. Caulis floriferi apex.

Epilobium anagallidifolium Lam. Syn. Chamaenerion Alpinum minus Brunellae foliis Tournef. Inst. (1700). E. alpinum L. Sp. pl. 348. No. 7 (1753). Willd. Spec. pl. II. 318 (1799). Dietr. Lexic. III. 770 (1803). Spreng. Syst. veg. II. 233 (1825). DC. Prodr. III. 41 (1828) etc. Hoffm. germ. ed. 2. 179 (1800). Rehb. Exc. 634. No. 4078. Kirschl. Pr. Als. 38 (1836). Döll Rh. Fl. 744. Fl. Bad. II. 1075 (1859) etc. E. empetrifolium Kunze in hb. Fischer Petrop. etc.

Icon. Fl. Dan. 322 (1787). Lam. III. gen. 278 f. 3 (1793). Sturm Fl. 18. St. No. 12 et 13 (1840). Hook. London Journ. 170 (1842). Hausskn. Mon. t. I. fig. 12 (ic. sem.).

E. naum rhizom. brevi ramoso filiformi repente pluricipiti, stolones epigeaeos florendi tempore conspicuos tenellos radicanes edente, foliis innov. frondosis remote dispositis, obovatis, petiolatis, stolonis, apicem versus majoribus oblongo-ovatis, integerrimis, apice rotundatis. Caulibus teneris e basi decumbente breviter radicante adscendentibus, solitariis v. numerosis caespitosis, simplicibus, florendi tempore apice nutantibus, sigmoideis, leviter obtusangulis, lineis pilosis parum elevatis e petiolarum marginibus decurr. notatis, caeterum glabris, saepe purpurascentibus, —2 dm longis, paucifloris, basi foliis innovat. emarcidis, confertis plerumque obsitis. Foliis parvis, 1—2,5 cm longis, 5—7 mm latis, ad inflorescentiam usque plerumque oppositis, glabris, pallide viridibus, nervis secundariis parum conspicuis; inferioribus minoribus obovatis late obtusatis; intermediis superioribusque ovato-oblongis v. elliptico-ovatis obtusis, in petiolum cuneato-decurrentibus, integerrimis v. superioribus obiter remoteque subdenticulatis. Racemo brevi m. m. paucifloro, ante anthesin cernuo, saepe flore solitario. Alabastris globoso-ovoideis, obtusis glabris, saepe erubescens. Floribus exiguis, 4—5 mm longis, virgineis nutantibus, petalis calyce vix $\frac{1}{3}$ longioribus, roseis, obtuso emarginatis. Calyc. lacin. ovato-oblongis obtusis glabris, saepe purpurascentibus, 2—2,5 mm longis, 1 mm latis, tubo glabro, 1 mm longo, 1,5 mm lato. Stigmate anguste clavato, 1,5 mm longo, in stylum aequilongum attenuato. Capsulis junioribus nutantibus, pilis glandulosis patentibus sparse obsitis, adultis crassiusculis erectis glabrescentibus, viridibus v. purpurascentibus, sublucidis, 2—4 cm longis; pedicellis glabrescentibus, fol. fulcr. longioribus. Semin. pallide fuscis, fusiformibus, basin versus longe attenuatis, apice in appendiculum pellucidum breviter attenuatis, 1,5 mm longis, 0,5 mm latis, testa glabra leviter impressa.

Flor. Jul.—Sept.

Formae:

a) major. b) minor. c) pusilla. d) scapoides. e) lara.

Hab. In Germania: Riesengebirge in der Gr. und Kl. Schneegrube, Gr. Sturmhaube, Kl. Teich, Wiesenbaude, Kesselgrube, Riesengrund, Elbwiese, Langer Grund; auf der Gr. Iserwiese 2400'. Karlsruher Hochebene des Spiegelgebirges gen Machau. Baden im Schwarzwald am Feldberg. Torfmoore bei Villingen. Im Elsass in den Vogesen auf Granit am Hoheneck, Wormspel und Rothen Bach. In Bayern an vielen Orten, ebenso in Oesterreich und Niederösterreich. In der Schweiz.

Formae hybridae:

E. alsinefolium × *anagallidifolium* v. *E. alsinefolium* Vill.

E. anagallidifolium × *Hornemanni*.

E. anagallidifolium × *nutans*.

Icon t. 19. **Planta fructifera.** 1. Plantae floriferae apex. 2. Folium. 3. Semen antice et a latere visum.

B. *Oenothera* L.

Tubus calycis elongatus; capsula oblonga, basi paullo crassior, semen sine coma.

***Oenothera biennis* L.** Syn. *Onagra biennis* Scopoli.

Caulē holosericeo, longioribus, in tuberculis sessilibus crinibus consperso; foliis denticulatis, paullo ligulatis, infimis primi anni ellipticis v. oblongo-inverso-oviformibus, obtusis, acutis; petalis staminibus longioribus; corolla flava, magna. Magnitudine 0,60—1,00 m.

Flor. Jun.—Aug.

Formae:

a) parviflora A. Gray petalis fere longis staminibus

Hab. In tota Europa ex anno 1614 ad ripas, in arenis quasi sponte; saepe nomine Raponica culta.

Icon t. 20. **Planta florens, radix.** 1. Petalum. 2. Flos periantho privatus. 3. Germen dissect.

***Oenothera muricata* L.** Caulē piloso purpureo muricato-aspero. Foliis primi anni infimis elongato-lanceolatis, acuminatis; petalis aequalibus vel paullo staminibus longioribus. Habitus *Oen. biennis* flores flavi multo minores, folia angustiora; altitudine 0,60—1,00 m.

Flor. Jun.—Sept.

Hab. Ad ripas, in glareosis. In Germania: ad Albim ab Tetschen usque ad Blankenese partim saepe, in silvis arenosis, ad Francofurtum secundum viam ferratam Moeni et Nieri, solitarie ad Bonn, Berlin, Breslau. Lotharingia: Metz. Alsatia: Ripa Illis ad Horburg. Baden: Freiburg, Kaiserstuhl, Karlsruhe, Mannheim. Wurtemberg: Ripa Danubii et Iller. Bavaria: Heimerdingen ad Memmingen. Dillingen, Dinkelscherben, Neuburg a. D. Molae fratris ad Monacum.

Forma hybrida:

O. biennis × *muricata*.

Icon t. 21. **Planta florens.** 1. Flos dissect. 2. Petalum. 3. Capsula. 4. Semen.

C. *Isnardia* L.

Limbus calycis quadripartitus, persistens; corollae folia nulla, ceterum quattuor; capsula quadri-valvata, quadrilocularis, polyspermus. Planta aquatilis cum foliis oppositis, indivisis.

***Isnardia palustris* L.** Syn. *Dantia palustris* Karsch, *Ludwigia palustris* Elliot.

Caule basi radicante; foliis oppositis, oviformibus, acutis; floribus axillaribus, solitariis, sessilibus, basi cum duobus parvis prophyllis; perennis, corolla viridi; caule 0,15—0,30 m longo.

Flor. Jul.—August.

Formae:

a) paludosa. *Rabenhorst.* Floribus monoecis (ad exempl. ad Neuendorf prope Lübben).

Hab. In fossis, aquis lente fluentibus, paludibus turfosis, sparsissime et saepe inconstanter, saepissime in finibus inter septentriones et occasum solis. In Germania: ad Rheni inferiorem partem (Crefeld), septentrione Guesfaliae (Rahden, Lotte, Lengerich, Dülmen, Dorsten). Hannover. Oldenburg. Hamburg (molarum lacus Eppendorfensis, vaccae molae). Hengster ad Francofurtum a. M., ad Annaburg inter Wittenberg et Torgau, in der Niederlausitz pluribus locis. Alsatia: Rheni planities. Baden: Bodensee, Breisgau sparse, Karlsruhe. Vurtenbergae: antea ad Friedrichshafen. Bavaria: Pfalz: Schifferstadt, Speyer, Hassloch.

Icon. t. 22. **Planta florens et fructifera.** 1. Fructus. 2. Flos.

D. *Circaea* Tourn.

Limbus calycis bilobus; corolla dipetala; fructus uni-vel bilocularis.

A. *Stigma emarginata-biloba; fructus bilocularis, loculi uno semine.*

***Circaea lutetiana* L.**

Caule erecto; foliis oviformibus, basi interdum subcordatis, denticulatis; bracteis nullis; petalis aequae longis quam calyx; fructu inverso-oviformi, cum setis glochidiatis, rigidis, laxis obsesso, fructuum loculis plerumque aequae magnis, perennis. Corolla initio rubescens, postea alba; altitudine 0,25—0,50 m.

Flor. Jul.—Aug.

Formae:

a) cordifolia *Lasch* (decepiens *Ascherson*), hirta, foliis cordatis, ligulato-denticulatis, superioribus saepe oviformibus.

b) glaberrima *Lasch*, glaberrima, foliis basi rotundatis vel subcordatis.

Hab. In nemoribus umbrosis, humidis, compluribus locis.

Icon t. 23. **Planta florens.** 1. Alabastrum. 2. Flos. 3. Fructus. 4. Flos dissect.

***Circaea intermedia* Ehrhart.** Syn. *Circaea alpina* \times *lutetiana* [grandiflora]; *Circaea lutetiana* \times *alpina* [parviflora] G. Meyer.

Caule erecto, glabro; foliis cordi-oviformibus, ligulato-denticulatis; basi pedunculorum parvis bracteis setiformibus; petalis longitudine adaequantibus calycem; fructu fere globoso-inverso-oviformi, cum glochidiatis, mollibus, conferti setis obsesso, plerumque abortiente, fructuum loculis plerumque inaequalibus; perennis, corolla rubescens vel alba; altitudine 0,15—0,30 m.

Flor. Juli—Aug.

Hab. In nemoribus umbrosis, humidis, sparsissime, gregarie autem.

Icon. t. 24. **Planta florens.** 1. Flos. 2. Fructus. 3. Fructus transsectus. 4. Embryo.

Icon. Fl. Germ. XXIII.

B. Stigma subemarginata; fructus pyriformis, a latere compressus, unilocularis, monosperma.

***Circaea alpina* L.**

Caule adscendente, glabro; foliis subrotundo-oviformibus, basi evidenter cordiformibus, ligulato-denticulatis; pedunculorum basi parvis bracteis setiformibus; corollae foliis brevioribus calyce; perennis; corolla primo rubescente, postea alba; altitudine 0,08—0,25 m.

Flor. Jun—Aug.

Hab. In silvis frondosis et acerosis umbrosis, humidis, multo saepius in montibus quam planitie; saepissime (in Borussia ad occidentem versa, Westpreussen).

Icon. t. 25. **Planta florens.** 1. Flos. 2. Fructus.

E. *Trapa* L.

Calyx quadrifidus; corolla quadripetala; nux dura, calycis laciniis auctis et duratis quadri-spinosa, unilocularis, monosperma. Planta aquatilis.

***Trapa natans* L.**

Sub aqua foliis oppositis, linearibus, caducis, quorum in partibus sunt radices capillaceo-pinnatae, foliorum similes; foliis natantibus, rhomboideis, denticulatis, petiolatis; petiolis in mediotullio plerumque inflatis; floribus solitariis, axillaribus; fructibus quadrispinosis; planta aestivalis annua; corolla alba; fructibus nigro-griseis, esculentis.

Flor. Jun.—Jul.

Hab. In aquis stagnantibus, sparsissime et evanitura; in Westpreussen ad exempl. extincta.

Icon. t. 26. **Planta florens.** 1. 2. Fructus (germinatio). 3. Flos dissect. 4. Flos.

***Myriophyllum* Vaillant.**

Flos masculus calyce quadrilobo et quattuor petalis caducissimis; stamina octo; flores feminei calyce supero, quadridentato; corollae folia minima; stigmata quattuor, villosa; drupa exsucca maturitate secedens in quattuor ossicula.

1. Omnes bracteae pectinato-pinnatifidae, longae vel longiores floribus.

***Myriophyllum verticillatum* L.** Engl. Bot. 218. Dict. sc. nat. col.

Foliis quinis usque senis verticillatis, profunde pinnatifidis, laciniis setiformibus; spicis semper erectis; floribus in verticillis axillaribus et spiciformibus; perennis; bracteis magnitudine variabilissimis; altitudine 0,15—0,25 m.

Flor. Jun.—Aug.

Hab. In fossis et aquis stagnantibus sparse.

Icon. t. 27. **Planta florens, flos, masculinus et femineus, fructus transsectus. ovarium transseisum.**

2. Superae bracteae indivisu breviores floribus.

***Myriophyllum spicatum* L.** Flor. dan. 681. Engl. Bot. 83. Schk. t. 296.

Foliis quaternis verticillatis; floribus in verticillis spiciformibus, spicis virgineis erectis, bracteis inferioribus incis, ceterum ut *Myr. verticillatum*; perennis; caule saepe 1,00—2,00 m. longo.

Flor. Jun.—Aug.

Hab. In aquis stagnantibus, fossis, saepe.

Icon. t. 28. **Planta florida. flos masculinus et femineus, ovarium transseisum, fructus transsectus.**

Myriophyllum alterniflorum DC., Rehb. pl. erit. X. ic.

Laciniis foliorum verticillatorum capillaribus; floribus masculis interdum alternis, spicatis; spicis ante anthesin nutantibus, floribus femineis paucis, axillaribus, basi spicae masculae verticillatis; perennis; multo tenuior quam *Myriophyllum spicatum* L.

Flor. Jun.—Aug.

Hab. In aquis stagnantibus. In Germania: Vallis Saar ad Saarbrücken et Randerath, ad Elberfeld, Sieg ad Siegburg, prope Bonn, in Guestphalia [saepe ad Monasterium]. Hannover, in regno Saxonia, provincia Brandenburg, Mecklenburg, Oldenburg, Holstein, Schleswig, Pommern ad Bütow et Polzin, Westpreussen ad Berent multis in lacubus. Lotharingia: Bitsch. Alsatia: Lacus Vogenses, Jägerthal, inter Dambach et Stürzelbronn, Lauterthal sub Weissenburg. Baden: Schluch-, Titi- et Feldsee. Bavaria: Pfalz et planities alta: Natternberg ad Deggendorf. In Helvetia apud Noville etc.

Icon. t. 29. Caulis floridus, alabastrum, flos a latere visus, flos sine corolla, fructus.

Hippuridaceae Link.

Flores imperfecti, solitarii. Perianthium simplex v. deficiens, superum, obsolete bilobum. Folia verticillis polymeris. Stamen 1, perianthii margine basi insertum anterioris lobi. Stylus filiformis. Germen uniloculare, uniovulatum. Semen albuminosum.

Hippuris L. Corolla nulla; Calyx obsolete, germen coronante margine; drupa monosperma. Folia verticillata.

Hippuris vulgaris L. Caule erecto, parte florifera extra aquam; foliis linearibus, octonis usque duodenis verticillatis; floribus axillaribus, sessilibus, minimis, viridibus; perennis; caule 0.15—0.30 m. alto, interdum fluitante et tum 1.00—2.00 m. longo.

Flor. Jun.—Aug.

Hab. In fossis, aquis stagnantibus, sparse.

Icon. t. 30. Planta florens. 1. Duo flores. 2. Flos antice visus.

Ceratophyllaceae Gray.

Herbae aquaticae. Folia bi-vel trifurcata. Flores monoeci, perianthium polyphyllum. Stamina 12—16 perianthii medio congregata. Germina solitaria, libera. Stylus simplex. Nux exalbuminosus. Embryo orthotropus.

Ceratophyllum L. Perigonium florum masculorum polyphyllum, foliis linearibus, ad extremum truncatis et bispinosis; antherae copiosae, sessiles, in utroque latere excurrentes in spinulam; calyx florum femineorum ut masculorum; nux spina terminata.

A. Folia trifurcata, 6—8 partita.

Ceratophyllum submersum L. Syn. *Ceratophyllum muticum* Cham. et Schldl. *C. verruculosum* Rich. Vaill. hist. de l'acad. 1719. t. 2. f. 2 sinistra. Lam. Enc. pl. 775. f. 1. Engl. Bot. 679. Fl. dan. 510.

Fructibus oviformibus apteris, basi sine spinis, apice cum spina compluries breviora quam fructus; perennis; foliis lacte viridibus, ramorum apicibus rubiginosis, ut sequentes raro fructifer.

Flor. Jul.—Aug.

Hab. In aquis stagnantibus, sparsissime vel fortasse non visa.; Saarbrücken, Aquae, Coburg. Arnstadt. Vimaria (Vollersroda). Jena. Lipsia, Halle a. S., Dessau in lacu Kühnauensi, in lacu Peebauensi ad Magdeburg saepe, Berlin, Nauen, Bollersdorf ad Wrietzen, Angermünde, Francofurtum a. O., Vratislavia, Kottwitz apud Ohlau, Brieg, Oldenburg, Holstein, Neustrelitz, Koperow in insula Wollin, Usedom, ad Gingst et Greifswald, Czarnikau, Inowrazlaw. Westpreussen: ad Dt. Krone, Konitz, Graudenz et Briesen. Ostpreussen: in stagno silvestri Pluttvinnenensi ad Regiomontium. In Bohemia septentrionali praecipue in finibus Albis, Alsatia, Baden, Bavaria.

Icon. t. 31. **Planta fructifera, folium, fructus.**

Ceratophyllum demersum L. Syn. *Ceratophyllum oxyacanthum* Cham. et Schldl. *Ceratophyllum apiculatum* Cham. et Schldl.

Engl. Bot. 947. Gärtn. 1. t. 44. f. ult. Lam. Enc. pl. 775. f. 2. Linn 1829. t. V. f. 6b.

Fructibus oviformibus, apteris, trispinosis, duabus recurvatis spinis basi, terminalis fructu aequelonga aut longior perennis; foliis perviridibus; interdum duabus basilaribus spinis fructus abbreviatis ad brevia tubercula: **Ceratophyllum apiculatum** Cham. et Schldl. (species), vel fructibus utraque inter spinas alatis: **Ceratophyllum platyacanthum** Cham. et Schldl. (species).

Flor. Jul.—August.

Hab. In stagnis, fossis, non raro.

Icon. t. 32. *Ceratophyllum demersum*. **Planta sterilis.** 1. Flos masculinus a latere visus. 2. Flos masc. transsectus. 3. Stamen. 4. 5. Flos femineus, visus et transscissus. 6. 7. Fructus transsectus. 8. Fructus (germinatio). 9. Diagramma. 10. Folium.

Icon. t. 33. *Ceratophyllum platyacanthum*. **Planta florens et fructifera.** Flos masculinus, Stamen antice et postice visum, flos femineus a latere visus et transsectus, fructus et folium.

Lythrum L.

Calyx tubulosus, octousque duodecim denticulatus, alternis, erectis, patentibus dentibus; corollae folia 4—6, apici calycis tubi inserta; stamina 2, 3, 4, 6 vel 12; capsula bilocularis.

Lythrum Salicaria L. Syn. *Lythrum hexagonum* Burchtold. Fl. dan. 671. Schk. t. 128. Hayne Arzng. III. 39. Sv. Bot. 256. L. Salic. β gracile Dec.

Foliis cordato-lanceolatis, inferioribus oppositis vel verticillatis; calyce basi sine bracteis; calycis dentibus alterne longioribus; perennis; corolla purpurea; altitudine 0,50—1,25 m.

Flor. Jul.—Septbr.

Hab. In fossis, ripis, virgultis humidis, vulgare.

Icon. t. 34. **Planta florida, flos evolutus et transsectus, folium, capsula a latere visa et transsecta.**

Lythrum virgatum L. Syn. L. austriacum Jacq. a. t. 7. L. acuminatum Willd. Gärtn. 1. t. 62. fig. 5. Bot. Mag. 1003. Dict. sc. nat. cat. 32.

Foliis lanceolatis, basi rotundatis; superioribus floribus alternis; calycis dentibus aequilongis; perennis; corolla purpurea; altitudine 0,50—1,25 m.

Flor. Jun.—Jul.

Hab. In locis humidis, fossis, rarissime. In Bohemo valde dubie, in Silesia autem ad Gilschwitz ad Mora et ad Troppau, Jablunca ad Teschen, interdum in hortis et ex iis quasi sponte.

Icon. t. 35. **Caulis floridus, fragmentum calycis marginis, flos et petalum.**

Lythrum Hyssopifolia L. Jacq. austr. t. 133. Schk. t. 128. L. hyssopifolium Sm. Engl. Bot. 292. Salic. Hyssopi folio latiore Rupp. Jen. ed. Hall. t. VI. L. parviflorum Bad.

Foliis linearibus-lanceolatis; calyce basi cum duabus parvis subulatis bracteis; planta aestivalis annua; corolla parva, violacea-rubra; altitudine 0,10—0,30 m.

Flor. Jul.—Septbr.

Hab. In pascuis humidis, arenosis, agris, fossis, sparse, maxima in parte finum inter septentriones et occasum solis ac omnino in finibus maxime septentrionalibus deficiens; in Westpreussen tantum ad Thorn.

Icon. t. 36. **Planta florens.** 1. Flos. 2. Petalum. 3. Fragmentum marginis calycis.

Peplis L.

Calyx campanulatus, duodecimdentatus; capsula bilocularis, polysperma.

Peplis Portula L. Syn. Peplis nr. 856 Hall. helv. Port. diffusa Moench.

Caule decumbente, multiramoso, cum ramis radicanibus; foliis oppositis, inverso-oviformibus, breviter petiolatis; floribus solitariis maxillis; planta aestivalis annua; corolla minima, rubescente alba; caule rubre impleto; altitudine 0,08—0,20 m.

Flor. Jun.—Septbr.

Hab. In pascuis humidis, fossis, stagnorum marginibus, non raro.

Icon. t. 37. **Planta florens et fructigera.** 1. Fragmentum plantae florentis. 2. Folium. 3. Flos. 4. Flos dissectus. 5. Fructus. 6. Semen.

Crassulaceae DC.

Flores imperfecti. Corolla dialypetala, infera. Germen squamula infera unitum monophyllum, unum-multa, discreta v. basi connata. Stamina perigyna. Folia carnosa, sine stipulis. Calycis lacinae basi plus minus connatae, corolla regularis, 3—20 foliosa, cum staminibus margini calycis inserta, interdum gamopetala. Stamina petalis numero aequalia vel bis superantia. Folliculi introrse dehiscentes. Embryo inversus, axilis, albuminosus.

Tillaea Micheli.

Planta minimum, annua. Calyx tri-tetrapartitus; corolla tri-tetrafoliata; fructus ex 3—4 carpellis discretis introrse dehiscentibus compositus.

Tillaea muscosa L. Michel gen. t. 20. Engl. Bot. t. 116. Dec. et Red. pl. grass. t. 73. Rehb. pl. crit. II. ic. 330—332.

Caule basi decumbente, cum ramis assurgentibus; floribus axillaribus, sessilibus, trifidis; planta aestivalis annua; corolla rubescente vel albida; altitudine 0,03—0,05 m.

Flor. Mai—Juni.

Hab. In arenosis, humidis, rarissime, tantum in Rheni provincia ad Cleve et Xanthen, in Guestfalia septentrionali variis locis et in craterae fundo ad Niedergörsdorf prope Jüterbog. Ad Potsdam (?).

Icon. t. 38. **Tres plantae heteromorphae.** 1. Fragmentum caulis. 2. Petalum. 3. Flos. 4. Calycis lacinia. 5. 6. Semen. 7. Folium.

Bulliarda DC.

Planta minima, annua. Calyx tri-tetrapartitus; corolla quadrifoliata; fructus ex 4 carpellis discretis, introrse dehiscenibus, polyspermis compositus.

Bulliarda aquatica DC. Syn. Tillaea aquatica L., T. prostrata Schkuhr. Ust. Ann. II. t. 3.

Caule decumbente; foliis linearibus; floribus fere sessilibus; planta annua; num perennis? corolla alba; altitudine 0,03—0,05 m.

Flor. Aug.—Septbr.

Hab. Locis inundatis, ad ripas, in arenosis humidis, raro; ad ripas Alvis arenosas ad Torgau et Wittenberg, ad Weissensee prope Berolinum longo ex tempore non reperta, ad Osnabrugam inter Ahe in provincia Vörden et Rottinghausen, in monte Vitenbergensi ad Neuenkirchen, in Guestfalia; in polo nudo in Westerfelde prope Lotte, antea copiosa; Schleswig, Colberg, in Ostpreussen ad Regiomontum in limo marginis posterioris stagni in Rauschen, in Silesia ad Rybnik [Ruda stagnum et Hammer-stagnum], ad Pless [Paproczan-stagnum] et Neu-Beran, in finibus meridianis deficiens.

Icon. t. 39. *a. b.* **Plantae florentes.** 1. Fragmentum caulis. 2. Flos. 3. Stamen. 4. 5. Fructus.

Bulliarda Vaillantii. Syn. B. aquatica Deleuze, Tillaea Vaillantii W., T. aquatica Lam. Vaill. par. t. X. fig. 2. Lam. t. 90. fig. 1.

Caule erecto, luncato. Foliis oblongis petiolis brevioribus.

Flor. Mai—Juni.

Hab. In stagnis. In Austria: in insulis Danubii apud Nussdorf. Meyerkopf ad Bürglen circa Basileam, Oberbaden: Schwimmende Insel des Nonnenwellweger. Fontainebleau. In Sardinia.

Icon. t. 40. **Planta florens.** 1. Flos. 2. Idem dissectus. 3. Fructus clausus. 4. Fructus apertus.

Rhodiola L.

Planta dioica. Flores masculinum 8 staminibus. Calyx tetrapartitus, corolla floris masculi tetrafoliata, feminei nulla; germina quattuor.

Rhodiola rosea L. Syn. Sedum Rhodiola DC. S. roseum Scop., Rhodiola odorata Lam. E. Bot. 508. Fl. D. 183. Schk. t. 331. So. Bot. 446. Lam. t. 819.

Radice tuberosa, caule erecto spithameo. Foliis oblongis-cuneatis; apice serratis; perennis; corolla flava-rubescens, altitudine 0,10—0,15 m.

Flor. Jun.—Jul.

Hab. In rupium rimis, inter saxa in altioribus montibus, raro. In Aseiburgii montibus tantum in fovea nivali, in diabolis hortulo et ad crateram extremam, Mährisches Gesenke ad Peterstein, Brünneleide et in cratera. Alsatia: Hohneck.

Leon. t. 41. **Planta florens.** 1. Flos masculus. 2. Flos femineus. 3. Germen cum squama. 4. Folium.

Crassula L.

Germina 5, styli 5. Calyx quinquefidus; stamina quinque vel decem; germen basi connatum.

Crassula rubens L. Syn. Sedum rubens L. Sturm. VI. 22. Red. pl. gr. 55. Roch. Barn. t. 33.

Caule erecto; foliis dissitis, patulis, semicylindricis; floribus solitariis, secundis, sessilibus; ramis cum calyce glandulosopilosis; planta annua; corolla alba, carina rubra; altitudine 0,08—0,15 m.

Flor. Mai—Juni.

Hab. Tantum ad Augustam Trevirorum in agris inter Euren et Zewen et in vineis inter Balduinicasam et Euren. Alsatia: segetale ad Hüningen. Baden: Breisgau ad Weil. Oberbaden: Riechen. Ad ripam dextram Rheni.

Leon. t. 12. **Planta florens.** 1. Flos. 2. Germen. 3. Caulis fragmentum cum folio.

Crassula Magnolii Dec. Syn. Tillaea rubra Gou., T. erecta Saus., Cr. caespitosa Can. ic. t. 69. f. 2., Sedum caespitosum Dec. prodr.

Foliis ovatis crassis imbricatis, cyma pauciflora, glabra.

Flor. April.

Hab. In Istria (Müller).

Leon. t. 43. **Planta florens.** 1. Flos. 2. Folium.

Sedum L.

Germina 5. Calyx quinquepartitus, cum quinque corollae foliis carnosus; stamina cum quinque glandulis squamiformibus; germina quinque, basi tantum connata.

Sedum purpureum Link (et Tausch). Syn. Sedum Telephium var. b. purpureum L., Sedum purpurascens Roch. Sedum lividum Bernardi. — S. Telephium Sm. Engl. Bot. 1319. Bull. 249. Rehb. pl. crit. VIII. ic. 968.

Rhizom. multicipiti sine caudiculis reptantibus. Foliis viridibus, inverso-oviformibus, oblongis vel lanceolatis, inaequaliter serratis vel fere integerrimis, inferioribus breviter petiolatis, superioribus cum basi rotundata sessilibus; staminibus interioribus $\frac{1}{6}$ supra basim corollae foliorum insertis; perennis; corolla purpurea, altitudine 0,25—0,50 m.

Flor. extremo Jul.

Hab. In silvis, versuris, locis ineultis, sparse, interdum quasi sponte; in Germania ad occasum solis spectans ab inferiore Rheni parte per Hassiam, Guestfaliam, (et regnum et provinciam) Saxoniam, Bohemum [ad montes aeneos], Dessau, Thuringiam usque Holstein et Schleswig, saepius in finibus meridianis et inter occasum brumalem et meridiem spectantibus.

Icon. t. 44. Caulis floridus, radix, flos, corolla evoluta, gynaeceum et stamen.

Sedum maximum Suter. Syn. Sedum Telephium var. d. et e. L. S. latifolium Bertol., Telephium hispanicum L. Clas. p. LXVI. Rehb. pl. crit. VIII. ic. 969.

Rhizomate robusto et multicipiti, sine stolonibus repentibus. Foliis oblongis vel oviformibus, obtusis, inaequaliter serratis, oppositis vel ternis verticillatis, inferioribus cum basi lata sessilibus, superioribus basi brevicordatis; staminibus interioribus petalorum basi insertis; perennis; corolla flavo-virente; altitudine 0,25—0,50 m.

Flor. medio Aug.

Hab. In silvis, rupibus, collibus apricis, saepe.

Icon. t. 45. Caulis floridus, radix, flos, gynaeceum, germen cum squamula, ovarium transsectum.

Sedum spurium M. Bieb. Caule subaeutato, foliis mediis oppositis, omnibus ovato-cuneatis, margine cartilagineis, argute serratis. Floribus sessilibus, roseis v. albis. Fructus erectus; altitudine 0,15 m.

Flor. Julio.

Hab. Probabiliter in territorium importatum et interdum quasi sponte.

Icon. t. 46. Planta florens. 1. Flos. 2. Folium.

Sedum Fabaria Koch. Syn. Sedum purpureum quorundem auctorum, non Tausch. Sed. hybridum L.

Rhizom. multicipite, sine caudiculis reptantibus. Caule erecto. Foliis planis, latis, apice serratis vel dentatis basi cuneatis in brevem petiolum angustatis, caesio-griseis, lanceolatis, dissitis vel alternis. Staminibus internis $\frac{1}{3}$ supra basin petalorum insertis. Corolla purpurea; perennis. altitudine 0,30—0,50 m.

Flor. Extremo Junio.

Hab. In rupibus, montibus declivibus; circa Bielitz in Teschen, ad Gerolstein et in alta „Aecht“ in montibus Eifel. in vallibus fluminis Nahe, Mosellae, Longanae, Urft infra Gemünd, in Hassia inferiore in rupibus (Basalt) montis Burghasungensis prope Wolfhagen et Cassel in fossis aquaticis ad moles Fuldaenses apud pratum et sub ponte inter Elgershausen et Hoof. Bavaria: (rupes Granit) arcis Falkenstein ad Wörth, saxum Reginae Castrorum ad Viechtach, mons crucis (Rhön). Silesia: Babia Gora.

Icon. t. 47. Planta florens. 1. Flos a latere visus. 2. Idem superne visus. 3. Alabastrum.

Sedum Anacampseros L. Bot. Mag. 118. Plant. grass. t. 33.

Rhizom. multicipiti, sine caudiculis reptantibus. Caule decumbente; foliis intergerrimis, inverso-oviformibus, obtusissimis; corymbis terminalibus, condensatis; perennis; corolla purpurea; altitudine 0,15—0,30 m.

Flor. Jul. Aug.

Hab. In Helvetiae alpihus indigenum, in finibus raro tantum in muris cultum. Piemont: In rupestribus.

Icon. t. 48. Planta florida.

Sedum stellatum L.

Caule simplici vel e basi in ramos partito, sine caudiculis reptantibus. Foliis planis, subrotundis, angulato-crenatis, in petiolum angustatis, glabris, oppositis vel alternis. Cyma plerumque bifida, pauciflora. Floribus axillaribus, sessilibus. Petalis lanceolato-acutis, albis vel dilute roseis.

Flor. Junio, Julio.

Hab. In locis montosis rupestris, in muris. Helvetia meridiana, ad Gex, Gossau in St. Gallen. Piemont: Monte Caballo ad Belluno, Valle Fenestrella etc. Novarese: Valle Sesia et Pié di Mulera.

Icon. t. 49. **Planta florida, petalum, flos.**

Sedum Cepaea L. Syn. Fl. graec. t. 447. Cepaea Matthioli Clus. p. LXVIII. S. galioides All. ped. t. 65. f. 3. S. spatulatum W. Kit. t. 104.

Caule adscendente, piloso. Foliis planis, integerrimis, obtusis, inferioribus petiolatis, inverso-oviformibus, oppositis, vel ternis et quaternis, superioribus linearibus-cuneatis; paniculis oblongis; planta aestivalis annua; petalis lanceolatis, in cuspidem excurrentibus, corolla rosea; altitudine 0,15—0,25 m.

Flor. Junio, Julio.

Hab. In locis saxosis, umbrosis; in viis cavis saxosis, rarissime. In Alsatia tantum ad Nothalten et Andlau prope Barr et iam extra fines apud Mastricht (Petersberg); ad lacum salsum apud Rollsdorf prope Halle a. S. ex decenniis nondum visum. In Helvetia inter occasum brumalem et meridiem speetante. Südliehes Tyrol. Bannat, Friaul, Piemont, Novarese.

Icon. t. 50. **Planta florida.** 1. Petalum. 2. Flos.

Sedum acre L. Hayne Arzng. 1. 15. Engl. Bot. 839. Schk. t. 123. Red. pl. gr. 117. Bull. 51. Sv. Bot. 149.

Rhizomate tenue, cum caudiculis repentibus. Foliis cylindricis, parvulis, ovatis, basi obtusa sedentibus gibbis, cymis glabris tripartitis; petalis flavis, partitionibus calycinis basi gibbosis. Plerumque planta sapore acro est. Altitudine 0,05—0,15 m.

Flor. Junio, Julio.

Hab. In collibus apricis, in rupestris, arenosis, plerumque frequens.

Icon. t. 51. 1. **Planta florida.** 1. Pollinarium. 2. Squamula. 3. Flos. 4. Calyx. 5. Fructus. 6. Germen maturum. 7. Caulis fragmentum foliosi.

Sedum hispanicum L. Syn. Sedum glaucum W. Kit., S. Guettardi Gmel., S. sexfidum M. B. Jacq. aust. app. t. 47. Rein. et Hohenw. ib. t. 4. Dill. Elth. t. 256. f. 332. Sturm VI. 22.

Caule simplici vel ramoso, sine caudiculis reptantibus. Foliis fere cylindricis, linearibus, obtusis et satis acutis, patentibus, basi aequali insidentibus. Cyma fere glabra, floribus duodecim staminibus, sex petalis lanceolatis, apice piliferis ter-quater calycis laciniis longis, albis cum rubescente dorso.

Flor. Junio, Julio.

Hab. In virgultis et locis rupestris vallorum Alpium. Ungaria. Kärnthen, Krain, Tyrol. Italia superiora.

Icon. t. 51. 11. **Planta florens.** 8. Flos. 9. Alabastrum.

Icon. Fl. Germ. XXIII.

Sedum villosum L. Engl. Bot. 394. Flor. D. 24. Red. pl. grass. ic. 70. Sturm l. 6.

Caule sine caudiculis reptantibus. Foliis linearibus, obtusis, fere teribus, supra subplanis, erectis, aequale basi insidentibus et cum paniculatis cymis glanduloso-pubescentibus. Petalis ovatis acutis calyce bis longioribus, roseis cum dorso purpureo (siccis lilacinis). Altitudine 0,10—0,20 m. Planta biennis.

Flor. Junio, Julio, Augusto.

Hab. In pratis turfosis et montanis sparse, in regionibus inter septentriones et occasum solis deficiens, in finibus maxime septentrionalibus ad Stettin tantum et in Westpreussen ad Wilhelmsthal.

Icon. t. 52. **Planta florens.** 1. Flos denudatus. 2. Folium. 3. Petalum et sepalum.

Sedum atratum L. Syn. Sedum haematodes Scop. All. ped. t. 65. f. 4. Jacq. a. t. 8. Red. pl. grass. ic. 120.

Caule erecto, sine caudiculis reptantibus. Foliis clavaeformibus, cylindricis, basi aequale insidentibus. Cymis simplicibus, terminatis, condensatis, glabris, defloratis planis. Floribus petiolatis, petalis ovato-lanceolatis, subobtusis cum apice breve, bis calyce longioribus, albis vel subviridibus v. virenti-flavis, cum nervo intermedio viridi; planta tota plerumque rubre incurrens.

Flor. Julio, Augusto.

Hab. In Bavaria tantum in pratis alpinis saxosis, tum autem vulgare.

Icon. t. 53. **Planta florens.** 1. Flos. 2. Germen. 3. Caulis foliosi fragmentum.

Sedum annuum L. Syn. S. saxatile Wigg. Red. pl. gr. t. 119. 5. rupestre Oed. Fl. dan. t. 59. S. aestivum All. S. Oederi Rtz. S. divaricatum Lap.

Caule ramoso, ramis plerumque bifidis, extremis elongatis serpentinis; cymis glabris; planta biennis, corolla flava, altitudine 0,08—0,15 m.

Flor. Jun.—Aug.

Hab. Valde pervulgatum in rupibus, muris der Vogesen, in silva Abnobae (ad exemplum Belchen et Feldberg montibus, Höllen- et Eltzthal); in Bavaria in alpinis Allgäuensibus ad Grönten et Rossberg apud Fuessen, in Fichtelgebirge (Berneck); sed non domesticum in Germania septentrionali et media.

Icon. t. 54. **Planta florida.** 1. Folium. 2. Flos supra visus. 3. Idem a latere visus. 4. Fructus.

Sedum album L. Syn. Sedum albellum Bess. (S. album M. B.). Fl. D. 66. Red. pl. grass. 22. Bull. 179. Sv. Bot. 430.

Rhizomate tenue cum caudiculis reptantibus. Foliis cylindricis, obtusis, glabris; panicula fere fastigiata, glabra vel sparsissime glanduloso-pilosa; petalis lanceolatis, obtusiusculis, ter calyce longioribus albis v. subroseis; perennis, altitudine 0,15 m.

Flor. Junio, Julio.

Hab. In rupibus, muris, tectis; in finibus inter septentriones et orientem solem spectantibus deficiens, ceterum plerumque non raro quamquam multis locis inquilinum tantum, ad exemplum in Silesia.

Icon. t. 55. **Planta florida.** 1. Flos a latere. 2. Idem infra visus. 3. Alabastrum. 4. Stamen cum squamula. 5. Basis staminis et squamula.

Sedum dasyphyllum L. Syn. *S. glanduliferum* Guss. Engl. Bot. 656. Jacq. h. vind. II. t. 153. Red. pl. grass. t. 93. Bull. t. 11.

Rhizomate tenue cum caudiculis repentibus. Foliis oppositis ovatis breviter ellipticis carnosis; panicula glanduloso-pubescente; petalis oviformibus, obtusiusculis, bis calyce longioribus albis; perennis; altitudine 0,15 m. interdum tota planta glanduloso-pubescent, ad exempl. apud Lüttich.

Flor. Junio, Julio.

Hab. In Germania septentrionali et media tantum in muris ad exemplum ad Hamburgum, Hanau, Zittau, ad Koenigstein in Tauno, Reichenbach in Silesia, domesticum autem in rupibus der Vogesen, Abnobae silvae, in monte „Hohentwiel“, ad Reussenstein, in Bavariae regione montana et in alpihus. In Belgia.

Icon. t. 56. **Planta florens, flos, caulis fragmentum, germen.**

Sedum boloniense Loiseleur. Syn. *Sedum sexangulare* auctorum (non L.), *S. schistosum* Lej.

Rhizomate tenue, cum caudiculis repentibus. Foliis linearibus-cylindricis, basi liberis, cum appendice obtusa sub hilum deflexa cyma trifida, ramulis 6—10, floris; ceterum ut *Sedum acre*; perennis; petalis aliquanto minoribus et pallidius flavis quam apud *Sedum acre*; altitudine 0,08—0,15 m.

Flor. Julio.

Hab. In arenosis, declivibus siccis, rarius quam *Sedum acre*.

Icon. t. 57. 1. *Sedum boloniense*. 2. *Sedum sexangulare*. 3. Flos dissectus. 4. Fructus.

Sedum repens Schleich. Syn. *S. rubens* Mattuschka, *S. rubens* Haenke. *S. alpestre* Vill. *S. saxatile* All. ped. t. 65. f. 6. Rehb. pl. crit. X. ic. Bot. Ztg. 1830. 483.

Foliis tereti-subdeplanis, sessilibus, corymbo pauciflora, petalis ovato-oblongis obtusis calycem sesquilongis, ramis sterilibus dense foliosis.

Flor. Jul.—Sept.

Hab. In rupibus nudis et locis nivosis: Sudeten, Riesengebirge; Ungarn, Mähren, Oesterreich. Kärnthen, Salzburg, Tyrol, Piemont, Schweiz. Elsass: An den nördlichen Abhängen des Hohneck. Bavaria: Rauheck in den Allgäuer Alpen. Babia Gora.

Icon. t. 58. **Planta florida.** 1. Flos a latere. 2. Idem supra visus. 3. Fructus. 4. Caulis foliosi fragmentum. 5. Folium.

Sedum anopetalum DC. Syn. *S. ochroleucum* Vill., *S. rupestre* Vill. Rehb. pl. crit. III. ic. 428.

Rhizomate tenue cum caudiculis repentibus, subterraneis, radicanibus et caulibus florentibus adscendentibusque. Foliis semiteribus, supra subplanis, caulibus sterilibus imbricatis, glaucis. Floribus flavis. Planta glabra, petalis erectis, lanceolato-acutis, calycis laciniis acuminatis. Cymis glabris.

Flor. Julio, Augusto.

Hab. In rupibus calcareis, muris, in saxosis. Veyrier (Genf). Istrien.

Icon. t. 59. **Planta florida.** 1. Flos. 2. Caulis foliosi fragmentum.

Sedum reflexum L. *S. virens* Ait. *S. rupestre* L. Rehb. pl. crit. III. ic. 459.

Rhizomate tenue, cum caudiculis repentibus. Foliis cylindricis, linearibus-subulatis, breviter mucronatis, basi cum brevi appendice obtusiuscula; Cyma glabra; calycis laciniis oviformibus-lanceolatis,

acutis, margine et apice cartilagineis incrassatis, linea mediana concava. Petalis bis calyce longioribus, aureis, acutis, carinatis, uninervatis. Fructibus subglandulosis exasperatis, seminibus longitudinaliter costatis. Altitudine 0,15—0,30 m.

Flor. Julio, Augusto.

Hab. In locis apicis, rupestribus, in arenosis sparse, nuper demum protinus progrediens in regiones inter septentriones et occasum solis et septentrionales. Südtirol, Schweiz, Dalmatien, Kroatien etc.

Formae:

- a) viride Koch. Foliis lacte viridibus, ad exemplum in rupibus et arenosis et saepe in hortis murisque sub nomine „Tripmadam“ cultum.
- b) rupestre L. (species). Foliis caeruleo-viridibus vel caesiis, in rupibus, silvis accrosis, in arenosis non raro.

Icon. t. 60. **Planta florida.** 1. Flos. 2. Fructus.

Sedum elegans Lej. Syn. *S. trevericum* Rosbach.

Rhizomate tenue, caudiculis sterilibus globiformibus. Foliis glaucis, linearibus-lanceolatis, breviter mucronatis, utrinque paulum planis, basi protensis, subcalcaratis ramorum non florentium dense imbricatis; calycis laciniis rotundato-obtusis; petalis oblongis, bis calyce longioribus, aureis. Floribus exigue suaveolentibus. Altitudine 0,15—0,30 m.

Flor. Junio, Julio, Augusto.

Hab. Ad Coblenz in pratis Escherfeldensibus montium Longanae inter Ems et Niederlahnstein, in monte Faehbachensi via ab Ehrenbreitstein ad Ems, in silva Soon ad Bingen, in valle fluminis Nahe, per totos montes vulcanios der Eifel, Hunsrück et saepissime ad Trier.

Formae:

- b) aureum Wirtgen. Caudiculo pumilo, ascendente, inverso conico, foliis linearibus-lanceolatis, supra planis, subtus subconvexis, acute aristatis, cauli florifero dense accumbentibus, plerumque purpureis, ceterum obscure viridibus, basi calcarati acuminato; cymis ebracteatis, ramis post florescentiam glomeruliformibus contractis; calycis laciniis oviformibus, subobtusis; petalis oblongis-oviformibus, obtusis.

Icon. t. 61. **Caulis floridus.** 1. 2. Flos. 3. Folium. 4. a latere visum. 5. Caules steriles.

Sedum glaucum Don. Syn. *S. recurvatum* W., *S. rupestre* var. *recurvatum*. Rehb. pl. crit. III. ic. 139. Engl. Bot. 2477. *S. rupestre* L. var. *glaucum*. *S. reflexum* L. var. *glaucum*.

Glaucum, caesium, ceterum ut *S. reflexum* L.

Flor. Julio.

Hab. Marginibus silvarum in arenosis.

Icon. t. 62. **Planta florida.** 1. Flos. 2. Petalum cum stamine. 3. Alabastrum. 4. Folium secatum.

Sedum oppositifolium L.

Caulibus florentibus ascendentibus, praeterea reptantibus, radicanibus, dense foliosis, sterilibus. Foliis caulum florentium oppositis, planis, carnosis, in petiolum brevem cuneatim angustatis, margine antico et laterali crenatis. Planta viridis, saepe erubescens, glabra. Altitudine 10—25 cm. Petalis erectis, lanceolatis, apice gradatim angustatis, calycis laciniis acuminatis. Cyma multiflora, glabra.

Flor. Julio, Augusto.

Hab. In territorium tantum importatum, compluribus locis, raro.

Icon. t. 63. **Planta florida, flos, petalum cum stamine, gynaecium, anthera et squama hypogyna.**

Sedum hybridum L.

Caulibus longis, procumbentibus, scabriusculis sterilibus et ascendentibus florentibus. Foliis planis, latis, ovoideo-lanceolatis cuneatis, margine obtuse mucronatis sparsis. Cyma laxa, corolla flava. Altitudine 0,15 m.

Flor. Julio.

Hab. In territorio raro, ex Asia importatum, compluribus locis quasi sponte.

Icon. t. 64. **Planta florida, flos.**

Sedum monregalense Balb. Syn. *S. cruciatum* Desf. Balb. misc. t. 6. Lond. Bot. Cab. 464. Rehb. pl. crit. III. ic. 438.

Caule ascendente tenue. Foliis spathulatis, plerumque quaternis, erubescens. Floribus albis, inflorescentia umbellata corymbosa, pedunculis et capsulis sutura glanduloso-pilosis.

Flor. Junio, Julio.

Hab. In montibus Alpium. Piemont: in monte Sagro justa aquas cadentes.

Icon. t. 64a. **Planta florens.** 1. Flos. 2. Fructus. 3. Petalum. 4. Capsula. 5. Folium.

Sempervivum L.

Calyx 6—12 partitum. Petala 6 vel 12, staminibus in corollam monopetalam connatis. Capsula 6. v. 12. Stylis 12.

Sempervivum angustifolium Kern. Petalis 12 vel pluribus, raro explanatis stellaribus. Carpidiis basi connatis, divergentibus et adscendentibus, superne oblique abscissis. Foliis rosulae utrinque glabris, tantum margine ciliatis. Petalis roseis, lineari-lanceolatis vel lanceolatis. Foliis rosularum veterum marginibus parallelis, 3—6 cm long., 5—8 mm lat., lanceolatis acuminatis et mucrone arcuatis fasciculatis pilis obsito, margine fimbriatis pilis 1 mm longis eglandulosis et sparse intermixtis, brevioribus glandulosis. Caulis foliis inferioribus magnitudine formaque proximis foliis rosulae fere conformibus, superioribus brevioribus et ex basi lata sedente paulum angustatis, lineari-lanceolatis, valde gradatim acuminatis, utrinque glanduloso-pilosis, 2—2,5 cm long., 4—6 mm lat. Cyma ramosissima, ramis multifloris foras arcuatis, glanduloso-villosis, obsitis foliis linearibus. Floribus breves et crasse pedicellatis, 20—25 mm lat. Calycis laciniis 3—5 mm long., 1,5—2 mm lat., dense glanduloso-pilosis. Petalis linea mediana obscura, lineari-lanceolatis, acuminatis, ter laciniis longioribus, 9—11 mm long., 2—2,5 mm lat., margine et extra glanduloso-pilosis. Staminibus 5 mm long., rubris, subulatis, inferne gradatim dilatatis et complanatis pilis glanduliferis fimbriatis. Germinibus semiovatis in stylum ligulatis. Caulibus 15—16 cm altis, 2—4 mm crassis.

Flor. Julio, Augusto.

Hab. In rupibus apricis, praecipue „Hornblendeschiefer“. Vorderes Oetzthal in 700—1250 m Höhe.

Icon. t. 65. **Planta florens.** 1. Flos. 2. Petalum.

Sempervivum soboliferum Sims. Syn. *S. globiferum* Mill. Bot. Mag. 1457. S. pet. fimb. sobole. compacta Schmied. ic. t. 26.

Petalis et sepalis sex, campanulatis erectis, in acumine retorsis; carpellis rectis accumbentibus, paulatim in stylum angustatis. Foliis caulinis praeter cilia marginalia iisdem ac rosulatis utriusque glabris; floribus oehroleucis, foliis rosulatis 6—12 mm latis oblongis ovatis vel obovatis, acutis. Foliis caulinis oblongatis, acuminatis, supremis ovatis. Laciniis calycis glabris, ciliatis tantum, dimidio brevioribus quam petalis. Altitudine 8—25 cm.

Flor. Jul., Aug.

Hab. In rupibus, collibus arenosis, Schlesien, Lausitz. In Saxonia: an den Basaltfelsen von Stolpen. In rupibus et pinetis in Nordböhmen (Weisswasser, Hirschberg, Prag), in declivibus im Zinnwald im Erzgebirge, in rupibus in der Nähe des Falkenstein am Unterharze, im östlichen Theile der Provinz Brandenburg, Hinterpommern, West- und Ostpreussen, nonnumquam saepius, bisweilen auf Kirchhöfen und auf Lehmnuauern angepflanzt.

Icon. t. 66. **Planta florens.** 1. Flos. 2. petalum. 3. folium.

Sempervivum tectorum L. Sturm D. Fl. VI. 23. Engl. Bot. 1320. Fl. D. 601. *Sedum tectorum* Scop.

Petalis 12 aut pluribus, raro paucioribus, stellatis. Carpellis in basi connatis, divergentibus et assurgentibus, supra oblique truncatis, in margine extremo stilis singulis terminatis. Foliis rosulatis utriusque glabris, in margine solo ciliatis. Petalis roseis lineari-lanceolatis vel lanceolatis. Foliis rosulatis exterioribus obovatis, in tertia parte prima latissimis, in basim cuneatim angustatis, subito in longum rigidum mucronem acuminatis, multo latioribus quam *S. angustifolii* prasinis vel caeruleoprasinis, eglandulosi tantum pilis ciliatis. Foliis multo brevioribus quam *S. angustifolii*, pilis crassis, albis eglandulosi dense ciliatis, patulis. Petalis lanceolate acuminatis, duplo longioribus quam sepalis, purpureis striolis conspersis, prasina carina dorsali ornatis. Caule multo crassiore quam in speciei praedictae.

Flor. Jul., Aug.

Hab. In rupibus, Rhein-, Mosel-, Nahethal. Alpen. Häufig auf Mauern und Dächern angepflanzt. In Alpibus species ut videtur pervulgatissima. Ost-, Central- und Westalpen. In Bavaria, Dalmatia etc. bis zu 2200 m Höhe. Ad *S. tectorum* simul adnumeranda esse videntur:

- a) *S. acuminatum* Schott foliis paulatim in mucronem longiorem productis, e. c. in der Umgebung von Bozen.
- b) *S. Mettenianum* Lehmann et Schnittspahn floribus minoribus, petalis linearibus, rosulis minoribus et planioribus, rosulis novellis densis circumdatis, foliis caulinis accumbentibus, e. c. auf dem Klobenstein in Südtirol.

Icon. t. 67. **Planta florens.**

Sempervivum montanum L. Jacq. a. app. t. 41. Sturm D. Fl. VI. 23.

Petalis 12 vel pluribus, raro paucioribus, stellatis, carpellis in basi connatis divergentibus et assurgentibus, supra oblique truncatis, in margine extremo stilis singulis terminatis. Foliis rosulatis utriusque glabris vel certe infra glanduloso-pilosis et in margine ciliatis, non araneose connexis. Filamentis teretibus; squamis laminaribus erectis paene quadrangulis. Germine obliquo oblongo; petalis lanceolatis subuliformibus, acutissimis, quadruplo paene quam calyce longioribus, lilacinis striis violaceis ornatis. Foliis rosulatis oblongis cuneiformibus, breviter acuminatis, ciliis vix longioribus quam pilis faciei foliorum. Foliis caulinis oblongis, erectis ante latioribus. Altitudine 8—15 cm.

Flor. Jul., Aug.

Hab. In rupibus altis des Urgebirges im südlichen Gebiete. Gipfel der Babia Gora-Alpen. Gegend von Spaa. Inter saxa auf den bayerischen Alpen raro (Bachalpe bei Oberstorf).

Leon. t. 68. **Planta florens.** 1. Flos.

Sempervivum Wulfeni Hppe. S. globiferum Wulf. Jacq. austr. V. t. 40. Sturm VI, 23. Bot. Mag. 2115.

Petalis et sepalis 12 vel pluribus, raro paucioribus, stellatis. Carpellis in basi connatis, divergentibus et assurgentibus supra oblique truncate, in margine stilibus singulis terminatis. Foliis rosulatis utriusque glabris, in margine solo ciliatis. Petalis sulfureis vel flavovirescentibus, linearibus, in acumine subulatis, triplo quam calyce longioribus. Squamis hypogynis erectis, laminaeformibus, paene quadrangulis. Foliis rosulatis oblongis obovatis, subito in mucronem acuminatis, glaucis, vetustioribus in acumine non ciliatis. Rosulis novellis non globosis, sed patentibus. Altitudine 10—20 cm.

Flor. Jul., Aug.

Hab. Hochalpen: Engadin. Puschlav, Tyrol, Kärnthen, Steiermark, Salzburg.

Leon. t. 69. **Planta florescens cum rosula novella.** 1. Flores complures.

Sempervivum Funkii A. Br.

Petalis iisdem ac praedictae speciei iisdemque in universum carpellis. Foliis rosulatis infra glanduloso-pilosis non araneose connexis. Petalis roseis, striis purpureis ornatis, filamentis teretibus. Squamis laminaeformibus, erectis, paene quadrangulis. Germine late ovato, paene rhomboideo, dense glanduloso-piloso, subito in stylo contracto. Petalis lanceolatis, acuminatis, paene triplo quam calyce longioribus. Foliis rosulatis oblongis, breviter acuminatis, ciliis eglandulosis, aut multo longioribus et validioribus quam pilis super faciei foliorum aut brevissimis. Foliis caulinis, bracteis, calycis laciniis saepe punctis rubris ornatis et in acumine rubris, cymate saepius ex tribus ramis composito, filamentis rubris, anthera lutea. Altitudine 8—15 m.

Flor. Jul., Aug.

Hab. In Alpibus: Tyrol, Kärnthen, Salzburg, Schweiz.

Leon. t. 70. **Planta florens cum rosulis novellis.** 1. Flos dissect. 2. Carpellum eadem qua est in natura magnitudine et aucta.

Sempervivum Braunii Funk.

Petalis et calycis laciniis 12 vel pluribus, raro paucioribus, stellatis. Carpellis in basi connatis, divergentibus et assurgentibus, supra oblique truncate, in margine extremo ciliatis, non araneose connatis, quam S. rupicola Kern. tenuioribus, ecarinatis obtuse marginatis, utriusque eodem modo convexis, per totam superficiem dense glanduloso-pilosis, acutiusculis, neque vero in acumen ligulatis. Calycis laciniis tenuibus et longis, filamentis albis. Petalis ad duplum, calycis laciniis longioribus. Germine obliquo oblongo dense glanduloso-piloso. Foliis caulinis superioribus e latiore basi ovata lanceolatis, patulis. Rosulis parvis. Altitudine 5—15 cm. Petalis luteolis vel ochroleucis prasina stria dorsali ornatis. Squamis hypogynis paene quadratis. Filamentis infra compressis.

Sempervivo Braunii simul anumeranda esse videntur:

- a) *S. Pittonii* Schott. petalis luteolis utriusque concoloribus, foliis caulinis superioribus lineari-lanceolatis latis et squamis oblongis crassiusculis. (Steiermark).
- b) *S. Gaudini* Christ rosulis et petalis magnis, prope triplo calycis laciniis longioribus. (Wallis).

Flor. Jul., Aug.

Hab. In Alpihus altissimis: Schweiz (im Camogask, Pasterze am Grossglockner in Kärnthen).

Icon. t. 71. **Planta florens.** 1. Flos. 2. Petalum.

Sempervivum arachnoidum L. Sturm VI. 23. Jacq. a. app. t. 42 Schk. t. 130.

Petalis et sepalis 9 vel pluribus, rarius paucioribus, patentibus. Carpellis in basi connatis, divergentibus, assurgentibus, supra oblique truncatis, in margine extremo singulis stylis terminatis. Foliis rosulatis in margine solo ciliatis in acumine pilis elongatis araneose coniunctis, obovatis vel oblongis breviacutis setoso-ciliatis. Petalis oblongis, lanceolatis, acuminatis, triplo quam calyce longioribus, roseis, stria purpurea ornatis. Altitudine 10—15 cm.

Flor. Jul., Aug.

Hab. In Alpihus interdum in valles decurrens, Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Steiermark.

Icon. t. 72. **Planta florens.** 1. Flos a latere dissectus. 2. Flos desuper.

Sempervivum hirtum L. All. t. 65. f. 1. Jacq. austr. t. 12. Sturm 30. Red. pl. gr. t. 107. S. petalis fimbri. Schmied ic. t. 17.

Petalis et calycis laciniis campanulate erectis, in acumine retorsis; carpellis erectis accumbentibus; paulatim in stilum angustatis. Foliis caulinis pilosis et ciliatis. Floribus ochroleucis. Foliis rosulatis 6—12 mm latis, oblongis lanceolatis, acutis, a medio ad acumen angustatis, glabris, in margine ciliatis. Foliis caulinis cordiformibus ovatis, acuminatis, infra pileosis laciniis calycis utriusque pilosis; in margine ciliatis. Altitudine 8—25 cm.

Flor. Jul., Aug.

Hab. In rupibus. In Alpihus: in Steiermark, Oesterreich.

Icon. t. 73. **Planta florens.** 1. Flos. 2. Rhizoma.

Sempervivum arenarium Schott.

Petalis et calycis laciniis iisdem in universum ac speciei praedictae. Foliis caulinis pilosis et in margine ciliatis. Floribus ochroleucis. Foliis rosulatis 2—3 mm latis, in acumen angustatis, lanceolatis. Altitudine 8—20 cm.

Flor. Jul., Aug.

Hab. In fundo arenoso. Oesterreich, Tyrol, Kärnthen, Salzburg etc. bis zu 1500 m Höhe.

Icon. t. 74. **Planta florens.** 1. Flos. 2. Folium caulinum.

Sempervivum rupicolum Kern.

Petalis 12 vel pluribus, raro paucioribus, stellatis. Carpellis basi connatis, divergentibus et assurgentibus, supra oblique truncatis, in margine singulis stilibus terminatis. Foliis rosulatis non araneose coniunctis, prasinis, longitudine duplo ad quadruplum maiore quam latitudine, 12—30 mm longis, 5—8 mm latis, ante in acumen brevissimum ligulatis, supra planis, glabris vel in superna tertia parte pilis glanduliferis brevissimis conspersis, infra leviter convexis, ante carine tenui, obtusa, in tota superficie pilis glanduliferis, in margine acutangulatis, glanduloso-pilosis, ciliatis; foliis caulinis erectis ovatis lanceolatis, 1—2 cm longis, 4—8 mm latis, infra median partem latioribus, glanduloso-pilosis. Inflorescentia trifurcata, ramis simplicibus vel bipartitis 3—5 floribus obsita. Floribus stipite brevi et crasso praeditis, 20—28 mm

latis. Calycis laciniis 3—4 mm longis, 1—1,5 mm latis, oblongis acutis. Petalis flavovirentibus pallidis et multis lineis et striis longitudinalibus rubris parallelis, tenuibus lineari-lanceolatis, acuminatis, triplo calycis laciniis longioribus, 10—12 mm longis, 1,5—2 mm latis; filamentis 5,5—6 mm longis, rubris, nitentibus, infra paulo dilatatis, paene planis, ibidem glanduloso-pilosis. Germine semiovato, paucis pilis glanduliferis ornato. Rosula foliorum vetustiore 4—5 cm lata. Altitudine 8—15 cm.

Flor. Jul., Aug.

Hab. Schieferfelsen der Berge zwischen dem Oetzthale und Selrainerthale in Tyrol.

Icon. t. 74a. **Planta florens.** 1. Flos. 2. Germen.

Sempervivum Neilreichii Schott.

Foliis rosulatis 2—3 mm latis, angustolanceolatis, in acumen angustatis, Foliis caulinis praeter cilia marginalia similibus ac foliis rosulatis utriusque glabris. Petalis sex, campanulate elatis in acumine recurvatis, floribus ochroleucis. Carpellis rectis, erectis, accumbentibus, sensim in stylum angustatis.

Flor. Jul., Aug.

Hab. Niederösterreich bei Aspang am Wechsel.

Umbilicus. DC.

Calyce quinquepartito, corona campanulata, quinquefida, laciniis erectis. Filamentis 10 coronae insertis, germinibus 5 calycis laciniis superpositis, singulis squamis hypogynis ornatis. Foliis inferioribus orbiculatis, peltiformibus.

Umbilicus pendulinus DC.

Radice tuberosa. Caule ramoso. Foliis inferioribus concavis ligulate crenatis. Floribus fistuloso-campanulatis, racemose dispositis, pendulis, albivirescentibus lineamentis rubicundis ornatis. Pedicellis stipulas integerrimas longitudine aequantibus.

Flor. Jun., Jul.

Hab. In rupibus et muris. Belgirate am Langensee (Tessin), Mauern des Klosters der Stadt Veglia.

Icon. t. 75. **Planta florens.** 1. Flos a fronte delineatus. 2. Idem longitudinaliter dissectus. 3. Petalum. 4. Petalis basis et stamen. 5. Torus squamis ornatus.

Saxifraga L.

Juss. gen. 309. Gaertn. l. 177. Lam. ill. t. 372. Lap. fl. Pyr. (1795—1801). Sternb. rev. Sax. (1810) et suppl. (1832). Haw. enum. Sax. 1821. — Don in transact. of the Linn. soc. XIII. 341. (1821). Tausch hort. Canal. fasc. 1. (1823). DC. Prod. IV. 17. Meisner gen. 136 (100). Endl. gen. 814. Hook. fil. et Thoms. i. journ. Linn. soc. II. 60. Benth. and Hook. gen. pl. I. 2. 635 (1865).

Calyceis tubus brevi vel elongato, libero laciniis 5 reflexis vel patentibus aut, quod saepius, ovario plus minusve adnato, laciniis erectis imbricatis. Petalis 5, aequalibus, raro inaequalibus, rotundis, obovatis vel obovato-oblongis, cuneatis, interdum cuneatis, haud raro unguiculatis, interdum basi 2—4 callosa, hypogyna aut perigyna, in praefloratione imbricata vel valvata, rarissime deficientibus Staminiibus 10, rarius 5; filamentis liberis, subulatis, vel filiformibus, rarius clavatis; antherae didymae

loculis lateraliter dehiscentibus. Carpidiis 2, rarius 3—5, plus minusve in ovarium liberum vel calyceis tubo adnatum connatis. Ovario biloculari, rarissime 3—5 loculari, placentae marginibus carpidorum introflexis connatis affixae; stylis liberis, primum conniventibus, deinde patentibus vel reflexis; stigmatibus capitatis vel lobatis. Oculis placentis undique affixis, anatropis. Capsula supera vel semisupera, laciniis calyceis persistentibus instructa, 2 rostris, rarius 3—5 rostris, inter rostra 2 valvis, rarius vesiculosa, ultra medium dehiscente. Seminibus parvis, oblongis, rarius rotundo-obovatis, testa plus minusve distincte seriatim tuberculata. Albumine carnosio, copioso. Embryone minuto, terete; cotyledonibus plano-convexis, interdum apice foveola minuta instructis. Herbis, rarius annuis vel biennibus plerisque perennibus caespitosis atque suffruticibus. Caudiculo epigaeo aut hypogaeo; ramulis novellis aut bulbosis, internodiis omnino abbreviatis, denique a caudiculis sejunctis, aut stoloniformibus vel sarmentosis, apicibus foliis instructis, serius sejunctis, aut, quod saepissime, turionibus in caudiculis permanentibus. Foliis herbaceis, interdum tenerrimis, saepe valde carnosius vel coriaceis, raro decussatim oppositis, plerumque alternantibus apice caudiculorum atque turionum rosulatum congestis, in scapis plus minusve remotis, forma valde variante, aut integra, rotunda, raro peltata, oblonga, obovata, cuneata, lingulata, lanceolata, linearilanceolata aut tripartita, partitionibus iterum 2—3 partitis; lamina a petiolo plerumque, a parte vaginali interdum distincta, sed etiam in petiolum atque vaginam paulatim transiente, nervis ulterioribus saepe in foveola marginalia atque apicalia exeuntibus haud raro calcem in superficie secernentibus. Pilis plerumque multis cellularibus in aliis articulatis, haud raro glanduliferis, in aliis setaceis. Bracteis atque prophyllis plerumque simplicibus sessilibus saepe setaceis. Floribus pedicellatis, aut nonnullis in cincinnum digestis aut racemum simplicem plus minusve corymbosum efformantibus aut complures in racemos paniculasve vel dichasia paniculam compositam efformantia digestis.

Saxifraga Cotyledon L.

Syn. *S. multiflora* Ehrh. pl. select. 74. *S. pyramidalis* Lap. fl. pyr. 32. hist. abr. 225. *S. pyramidata* Mill. Chondrosea pyramidalis Haw. en. Sax. 10. — Sp. I. 398. II. 570. cod. 3139. Don. I. c. 390. Morett. I. c. 4. Ser. I. c. 18. Sternb. suppl. II. 50. Icon. Boec. mus. t. 86. Dod. mem. fig. 30 ed. germ. III. t. 30. Oeder flor. dan. t. 241. Gaertn. fruct. I. t. 36. Müll. t. 243. Sternb. rev. t. 2. Sturm I. c. 33 n. 2. D.C. Fl. des serres. XIV. 1443. Revue hortie. 1859. 641.

Caule erecto e basi paniculato paniculis compositis pyramidalibus ubique pilis glanduliferis obsitis, ramis e medio paniculatis, 5—15 floris. Foliis basalibus lingulatis, vel obovato-lingulatis, breviter apiculatis, basi tenuiter fimbriata, secundum marginem serratum multiporosis, serraturis apice cartilagineis, antrorsum acuminatis; foliis caulinis lingulato-lanceolatis, postice glanduloso-ciliatis, antice serrulatis; bracteis atque prophyllis linearibus, acutis, glandulosis. Calyceis laciniis tubo glanduloso-longioribus oblongis, acutis. Petalis obovato-cuneatis, laciniis duplo triplove longioribus, 3—5 nervibus, nervo medio plerumque bifido. Capsula globosa. Seminibus oblongis triquetris.

Flor. Junio, Julio.

Hab. In foraminibus rupium. Alpinarum 1000—2000 m altarum.

Savoier Alpen: Mt. Cenis, Mt. della Leda, Chamounix. Mt. Buet, Wallis vom Simplon bis Domo d'Ossola. Berner Alpen: Susten, Gemmi. Lepontinische Alpen: St. Gotthardt, an der Teufelsbrücke. Val Sasina. Adular-Alpen: von Andrä zum Splügen. Rhaetische Alpen: Via mala, Val Bergaglia. Veltliner Alpen: Mt. di Morbegno, Monte Legnone, Vicentia. Kärnthen: Paulazo. Im östl. Dalmatien.

Forma purpurata Gaud. Caulibus atque paniculis ramis multifloribus purpureis. Petalis rubrovenosis. Hab. Schweiz: Teufelsbrücke, Splügen.

Forma pauciflora Ser. Caule paucifloro pedunculis subunifloris. Hab. Schweiz.

Icon. t. 76. **Planta florens.** 1. Capsula. 2. Petalum. 3. Folium basilare. 4. Folium caulinum.

Saxifraga Aizoon Jacq. S. Cotyledon E. L. Sp. 524. S. autumnalis Jacq. observ. I. 31. S. Cotyledon Wulf. in Jacq. coll. IV. 291. S. rosulenta Ehrh. pl. select. S. rosularis Schleich. ess. S. submutica Hort.

Caespitosa. Caule erecto, folioso, superne corymboso-racemoso aut corymboso-paniculato aut paniculato, ramis 3—5 floris, pilis glanduliferis plus minusve obsito, rarius glabro. Foliis basalibus incurvis, crassulis, supra planiusculis, laevibus, basi ciliatis, secundum marginem serratum multiporosis, plus minusve calcareo-crustatis, serraturis apice cartilagineis, antrorsum acuminatis; foliis caulinis minoribus spathulatis aut cuneatis, sessilibus, acute serratis, basi glanduloso-ciliatis; prophyllis cuneatis, apice tantum serrulatis. Calycis laciniis ovatis. Petalis obovatis vel ellipticis, laciniis fere duplo longioribus, 3—5 nervibus. Capsula globosa, stylis brevioribus coronata.

Flor. Julio, Augusto.

Hab. In montibus altis et in collibus subjectis frequens a 300—2600 m, rarius in planitiem descendens; vorzugsweise auf Kalk, aber auch auf Glimmerschiefer, Gneiss, Granit, Porphyry, Phonolith, Trachyt. Auf der ganzen Apenninenkette nördlich von Neapel bis zum Ligurischen Apennin, Cantabrien, Arragonien und durch die ganze Pyrenäenketten. Seealpen: Col di Tenda, Piemont, Savoyen, Schweiz und von da durch die ganze Alpen- und Voralpenkette verbreitet. In den schlesischen Karpathen bei Friedeck und von der Vysoka im Pressburger Comitatz bis in die Marmaros und auf die Siebenbürgener Karpathen, andererseits von Krain und Istrien durch Croatien, Slavonien nach Bosnien, auf den Dinarischen Alpen in Montenegro. Auf dem Jura häufig, nicht selten auf den Vogesen; häufig bei Kreuznach a. d. Nahe; ferner im Schwarzwald: Feldberg, Belchen und Oberschwaben. Böhmen: Prag, St. Iven, Mähren: Polauer Berge, ziemlich häufig auf dem Altvatergebirge an der Grenze von Mähren und Schlesien.

Forma brevifolia. Caule plerumque humili 0,04—0,16 m alto, plerumque apice corymboso-racemoso vel corymboso-paniculato ramis 1—3 floris. Hab. Verbreitet in den Alpen, Karpathen.

Forma robusta Engl. Foliis linguaeformibus 0,02—0,03 m longa, 0,003—0,005 m latis. Caule elongato, saepe e medio paniculato, ramis 3—5 floris. Hab. Seltener in den Hochgebirgen, dagegen vorzugsweise an den niedriger gelegenen Standorten, so besonders in Ungarn, in der Tatra; auf den Pieninen in Galizien; ferner auf dem Jura, in den Vogesen. Bei Kreuznach a. d. Nahe. In Böhmen: St. Iven; in Mähren: Polauer Berge. Im Altvatergebirge, in Polen bei Czenstochau.

Forma gracilis Engl. Foliis 0,02 m longis, 0,0015 m latis, spathulato-linearibus apicem versus paulum dilatatis, argute atque profunde serratis; caule e medio vel supra laxo paniculato ramis 1—3 floris. Hab. Seltener in den Alpen, z. B. in Krain, in Tyrol bei Botzen und am Wormser Joch.

Forma elongata Engl. Foliis 0,02—0,025 m longis, 0,0015—0,002 m latis, lineari-spathulatis, apicem versus paulum dilatatis, argute serratis; caule elongato, 0,3—0,35 m alto, e medio paniculato, ramis patentibus, longis, in apice 1—3—5 floris. Hab. Schweiz: am Mortaratschglatscher unterhalb des Berninapasses in feuchten Gebüschchen.

Icon. t. 77. Planta florens. 1. Flores. 2. Folium caulinum. 3. Capsula.

Saxifraga altissima Kerner. Syn. S. elatior auct. germ. p p. S. longifolia media Schleicher exs. S. styriaca Kerner in litt.

Caespitosa. Caule erecto, crasso, glanduloso-hirsuto, superne racemoso-paniculato ramis elongatis subdecemfloris, pilis glanduliferis densissime obsitis. Foliis basalibus patentibus, late linguaeformibus, acutiusculis, in basi ciliatis, secundum marginem multiporosum serratis, serraturis acutis cartilagineis. Foliis caulinis oblongis, obtusiusculis, serratis; bracteis atque prophyllis oblongo-linearibus vel linearibus obtusis, pilis glanduliferis ciliatis. Pedicellis dense atque breviter glandulosi. Calycis laciniis ovatis, obtusis, cartilagineo-marginatis. Petalis ellipticis, laciniis duplo longioribus, trinerviis. Capsula ovata, stylis brevioribus atque laciniis calycinis erectis coronata.

Flor. Julio, Augusto.

Hab. Auf den Voralpen Obersteiermarks: im Thörlgraben zwischen Aflenz und Kapfenberg, am Lantsch und am Schöckel, im Hagenbachthal bis Kallwang nicht selten (Grauwackenkalk, Grauwackenschiefer).

Icon. t. 78. *Planta florens*. 1. Flos. 2. Petalum. 3. Margo folii.

Saxifraga crustata Vest. Syn. *S. longifolia* γ *minor* Sternb. et Ser. l. c. 19. *S. callosa* Smith in Rees cycl. v. 31.

Caudiculis adscendentibus ramosis, foliorum vestigiis appressis obtectis, cespitem efformantibus. Caule adscendente pilis glanduliferis dense obsito, e medio vel superne racemoso ramis 1 floris aut paniculato ramis 3—6 floris. Foliis basalibus sulcatis, linearibus, obtusis, minute crenulatis, crenis inter se contingentibus, calcareo-crustatis, basi dilatata ciliata; foliis caulinis sparsis lineari-lanceolatis, serratis, basi glandulosa; prophyllis linearibus acutiusculis. Calycis basi sparse glandulifera laciniis oblongo-triangularibus in margine membranaceis. Petalis obovatis, basi vix attenuata, laciniis fere triplo. staminibus duplo longioribus, trinerviis. Capsula globosa, laciniis calycinis erectis atque stylis brevibus divaricatis coronata.

Flor. Junio, Julio.

Hab. Auf Felsen der Kalkalpen von 950—2200 m. Tyrol: Vedretta Marmelata, Lienz, Pusterthal; häufig auf der Kirschbaumalp. Steyermark: Mariazell, Veitschalpe, Reichenstein, Weitenstein, Neuhaus, Cilli, Sulzbach, Kärnthen: Obir, auf den Karawanken, besonders häufig am Loibl, Villacher Kotschna, auf dem Petzen; Krain: häufig in den Wocheiner Alpen, Koschuta, Idria, im Isonzothal, Nanos, kommt auch an der Grenze von Serbien und Bosnien vor.

Icon. t. 79. *Planta florens*. 1. Folium basilare. 2. Folium caulinum. 3. Flos.

Saxifraga mutata L.

Syn. *Chondrosea mutata* Haw. l. c. 13. Sp. II. 570. cod. 3140. Don. l. c. 395. Moretti l. c. 7. Sternb. rev. 6, suppl. II. 47. Ser. l. c. 20.

Rhizomate crasso horizontali vel obliquo. Caulibus adscendentibus foliosis, e basi aut e medio racemoso-paniculatis atque pedunculis glanduloso-hirsutis. Foliis basalibus lingulatis, secundum marginem cartilagineum, postice dense fimbriatum antice integerrimum aut obsolete serrulatum indistincte multifoveolata; foliis caulinis lingulato-spathulatis, obtusissimis atque prophyllis angustioribus glanduloso-hirsutis. Calycis laciniis tubo glanduloso aequilongis, oblongo-triangularibus, pilis glanduliferis sparse obsitis aut glabris. Petalis laciniis angustioribus, longitudinis duplum aequantibus, lineari-lanceolatis, acutis, trinerviis, staminibus duplo longioribus. Capsula globosa. Seminibus oblongo-triquetris, utriusque acutis.

Flor. Julio, Augusto.

Hab. In locis humidis Alpium et saepius montium Alpihus subiectorum, saepe in planitiem descendens. Seealpen. Savoyer Alpen: Mt. Brizon. Berner Alpen: Schwarzwasser, unterhalb Thun und um den Thuner See, Faulhorn. Vierwaldstädter Alpen: Rigi, Pilatus, am Uetliberg bei Zürich. Glarner Alpen: nicht selten in den Thuralpen: Toggenburg, Alstätten, Kronberg. Lombardei: am Comer See, Bergamo; im italienischen Tyrol und nördlichen Tyrol, Bairische Alpen: Rothenbruch an der Ammer, hohe Brühl und von da in die Ebene hinabsteigend bis Augsburg. Im Isarthal nicht selten; selbst noch an der Menterschweig bei München. Salzburger Alpen: Pass Lueg, Bundschuchalpen im Lungau. Radstadter Tauern; Kärnthen: Saualpe. Steyermark: Reiting, Hoehwart, Reichenstein, Oetscher, Kalbling,

Mariazell, Stubalpe, St. Lambrecht. Ungarn: Kunstava im Solter Comit. Siebenbürgen: Königstein, Butsets, Pietra Krajulni. Im Jura bei Solenze an der Aar wahrscheinlich naturalisirt.

Forma var. *S. dimissa* Schott. et Kotschy in Oest. bot. Ztg. 1859. p. 8. Syn. *S. transsylvanica* Fuss. fl. Transs. 236. Caulibus minoribus, e basi ramosis. Foliis basalibus brevioribus, obovato-lingulatis, obtusissimis. Hab. Siebenbürgen: Butsets um 2000 m, Pietra Krajulni, Grohotes, Pietra vari.

Icon. t. 80. **Planta florens in tres partes divisa.**

Saxifraga Burseriana L. Syn. *Chondrosea Burseriana* Haw. l. c. 15. Sp. l. 400. H. 572. cod. 3144. excl. syn. Bauh. et excl. var. β . Morett. l. c. 9. Sternb. rev. 33. excl. syn. Bauh. suppl. H. 60. Don. l. c. 398. Ser. t. c. 23.

Caespitosa caudiculis dense imbricato-foliosis. Caulibus floriferis plerumque unifloris, pilis glanduliferis obsitis, remote foliosis. Foliis caudiculorum dense congestis, triquetris, lineari-subulatis, acuminatis, rigide mucronatis, juxta marginem cartilagineum 7 fovearum serie notatis, basi breviter fimbriatis, junioribus calcareo-crustatis; foliis caulinis minoribus, adpressis. Calycis laciniis tubo glanduloso-hirsuto aequilongis, ovatis, acutiusculis. Petalis obovato-subrotundis, basi subunguiculatis, patentibus, nervis ramosissimis, flexuosis. Staminibus calyci aequilongis. Capsula ovato-globosa stylis suberectis, calyceem superantibus coronata.

Flor. Martio, Maio.

Hab. Auf Kalk- und Dolomittfelsen meist in der Höhe von 2000 m bis 2300 m; aber mit Bächen auch viel tiefer hinabsteigend. In der südlichen Schweiz: auf den Tridentiner Alpen verbreitet: zwischen Venzona und Gemona, Mt. Baldo, Mt. Mariano Laghetta bei Trient, Mt. Venego im Val Sugana, Mt. Grappa bei Bassano, Val d'Agordo, Salurn, Schleern, auch unterhalb der Schleernklamm noch bei 1200 m etc.; auf den Karnischen Alpen: Magenzathal, Raibler See, Wochain. Kärnthen: Obir, Putschall im Möllthal, Heiligenblut. Salzburg: im Blühnbach bei Werfen auf den Radstadter Tauern, Untersberg, kleiner Göll, bei den niedern Joehkasern, auf den Kalkalpen von Lofer und Saalfelden (um 650 m), auch auf kalkhaltigen Glimmerschieferblöcken in den Forleiten und Rauris und bei Berchtesgaden. Steyrische Alpen: Admonter, Neuberger, Aflenzer und Vordernberger Alp, Reichenstein, Hochwart, Scheibenstein und Alpe Zeyner; Nieder-Oesterreich: auf dem Schneeberg; Siebenbürgen: Butsets; Dzeameanie der Rodnaer Alpen.

Icon. t. 81. 1. **Planta florens.** 1. Flos. 2. Petalum. 3. Fragmentum caulis cum folio. 4. Folium. 5. Idem sectum.

Saxifraga Caesia L.

Syn. *S. recurvifolia* Lap. fl. pyr. 30. hist. abr. 224. *Chondrosea caesia* Haw. l. c. 14. Sp. l. 399. 571. cod. 3143. Don. l. c. 402. excl. syn. Scop. Morett. l. c. 42 excl. syn. Scop. et var. Sternb. rev. 34. suppl. H. 57. Ser. l. c. 21. excl. var. β .

Caespitosa caudiculis lignosis curvatis, imbricato-foliosis. Caulibus floriferis subcorymbosis 2—6 floris, glabris vel pilis glanduliferis sparse obsitis. Foliis caudiculorum dense congestis, e basi arcuato-recurvis, lineari-oblongis, acutiusculis, juxta marginem 7 foveolatis, e basi ad medium fimbriatis, dorso convexis, obtuse carinatis, junioribus calcareo-crustatis, caulinis anguste spathulatis, leviter carinatis, 3—5 foveolatis, basi glanduloso-ciliatis. Calycis laciniis tubo subconico aequilongis, ovatis, obtusis sparse glandulosis, in apice scariosis, interdum ciliolatis. Petalis obovatis, laciniis fere triplo longioribus, 3—5 nerviis, nervis lateralibus arcuatis vel rectis. Capsula globosa, stylis divaricatis, lacinias calycis erectas paulo superantibus.

Flor. Junio, Julio.

Hab. In Alpidis altissimis et in montibus Alpidis subjectis satis frequens, neque tamen ubique, von 1300—2700 m: auf Kalk und Dolomit. Auf den Apuanischen Alpen, zerstreut in den Seealpen, der Dauphiné und den Savoyer Alpen: Mt. Cénis, Mt. Blanc: nicht selten in der Schweiz bis zu den Allgäuer Alpen, in den Trientiner Alpen und von da sich fortsetzend nach den Karnischen Alpen; sparsam in den Julischen Alpen, wo *S. squarrosa* häufiger. Tyroler Alpen; von den nördlichen Kalkalpen mit der Isar bis nach Mittenwald in Baiern herabsteigend. Salzburger Alpen: auf der nördlichen Kalkalpenkette nicht selten, weniger häufig in den kalkhaltigen Schiefergebirgen: im Buschweissbachthale bei 700 m: auf den österreichischen Alpen stellenweise bis zum Wiener Schneeberge; auf den Steyrischen Alpen sehr häufig. In den Liptauer und Zipser Karpathen sehr verbreitet, seltener auf der Centralkette der Tatra, so am Krivan und unterhalb der Lomnitzer Spitze.

Forma: var. glandulosissima Engl. Caulibus atque pedunculis calycibusque pilis glanduliferis dense obsitis. Apuanische Alpen: auf dem M. Forato.

Icon. t. 81. II. **Planta florens.** 1. Flos. 2. Petalum. 3. Floris transsegmentum. 4. 5. Folium.

Saxifraga Vandellii Sternb.

Syn. *S. foliis aggregatis* etc Vandellii istor. ined. test. Moretti. *S. Burseriana* var. L. Sp. II. 572. cod. 3144. *S. Burseriana* γ. Vandellii Don. l. c. 398. *S. jungens* Clair. Man. 140. *S. bryoides* Scop. insubr. I. 181. teste Rehb. fl. germ. excurs. *Chondrosea Vandellii* Haw. l. c. 15.

Caudiculis aretissime imbricatim foliosis atque valde congestis. Caulibus erectis supra 3—7—20 floris, pedunculis calycibusque pilis glanduliferis patentibus obtectis. Foliis caudiculorum erectis, lanceolatis, acutis, rigide mucronatis, tiquetris, juxta marginem cartilagineum 5—7 fovearum serie notatis, basi fimbriatis, junioribus tenuiter calcareo-erustatis; foliis caulinis atque prophyllis lineari-lanceolatis excepta parte apicali longe mucronatis pilis glanduliferis obsitis. Calycis laciniis ovato-lanceolatis, acutis, tubo longioribus. Petalis erectis, triplum vel quadruplum laciniarum aequantibus, obovatis, basim versus valde cuneatim attenuatis, multinerviis. Staminibus lacinias calycinas superantibus. Capsula ovato-globosa, stylis aequilongis, suberectis, calyceem longe superantibus coronata.

Flor. Maio, Junio

Hab. Auf dem Corni di Canzo am Comer See; Veltliner Alpen. Ortler Alpen: Val Vestino, Seortegada, Monte Stabolte, Val di Daone um 1600 m. Rhaetische Alpen: zwischen Livino und St. Giacomo di Fraele, bei Bormio am Umbrail, Unterengadin. Steyermark: Auf der Vorderberger Mauer.

Icon. t. 82. **Planta florens.** 1. Flos. 2. Folium.

Saxifraga diapiensioides Bell.

Syn. *S. caesia* β. Lam. in Poir. dict. VI. 633. — *S. caesia* γ. DC. fl. fr. IV. 363. *S. glauca* Murrit. *Chondrosea diapiensioides* Haw. l. c. 13.

Caudiculus numerosis densissime foliosis, columniformibus incurvis. Caulibus erectis, 2—3 floris, dense glanduloso-pilosis. Foliis caudiculorum dense imbricatis, erectis vel apice subrecurvis, lineari-oblongis, obtusis, dorso convexis, obtuse carinatis, supra 7 — foveolatis, basi subciliatis; junioribus calcareo-erustatis, caulibus lineari-spathulatis, dense glandulosis, apice cartilagineis. Pedicellis brevibus calycibusque glandulosis. Calycis laciniis oblongis acutiusculis. Petalis laciniis triplo longioribus, obovatis, basim versus attenuatis multinerviis. Staminibus petalis duplo brevioribus. Capsula ovata.

Flor. Jun. Julio.

Hab. Auf Kalkalpen von 1800—2000 m. Seealpen: Mont Orno unweit des Col de la Tenda. Dauphiné: Collette Verte, Ceillac, sur Guillestre. Savoier Alpen: Mt. Viso, Grande Serène, vallée de Cogne, St. Lucrète, Mt. Cenis, Eau Blanche. Penninische Alpen: auf dem grossen St. Bernhard und dem Mt. Rosa, im Wallis: Pierre à voir, vallée de Bagne. Trientiner Alpen: Corni di Tratto bei Riva, und auch sonst im Etschthal an verschiedenen Stellen.

Icon. t. 83. **Planta florida.** 1. Folium supra. 2. subtus. 3. Petalum.

Saxifraga squarrosa Sieber.

Syn. *S. caesia* Scop. fl. carn. I. p. 294. *S. imbricata* Bert. Annali di Storia nat. IV. 260.

Densissime caespitosa, caudiculis lignosis, densissime imbricato-foliosis, subeylindricis. Caulibus 2—6 floris, subtus glandulosus, supra sparse glandulosi aut glabri. Foliis caudiculorum imbricatis, erectis, apice tantum arcuato-patulis, lineari-lanceolatis, obtusis, submucronulatis, angustissime cartilagineo-marginatis, basi fimbriatis, dorso convexis, obtuse carinatis, supra 7-foveolis notatis, junioribus, calcareo-erustatis; foliis caulibus linearibus, leviter carinatis, 3—5-foveolatis. Pedicellis floribus aequilongis aut longioribus. Calycis glabri laciniis tubo subconico aequilongis, ovatis, obtusis, apice tenuissime cartilagineis. Petalis laciniis duplo longioribus subrotundo, obovatis, 5 nerviis, nervis rectis. Capsula globosa stylis divaricatis laciniis erectas paullo superantibus.

Flor. Jul. Augusto.

Hab. Auf Kalk- und Dolomitalpen von 1500—2300 m, auch mit den Bächen herabsteigend.

Tirol: Val Ledro, Santen. Ortlesspitz, Fleimserthal: Sarikofl und im Fassathal, sehr häufig an der Schleernklamm und mit den Bächen bis Razzes heruntergehend. Wolkensteins Haus, Kirschbaumalp, im Pusterthal, bei Lienz. Karnische Alpen: Dobratsch bei Bleiberg, auf dem Petzen und der Wochainer Alp; auch im nördlichen Teile der Julischen Alpen: Isonzothal oberhalb Trenta. Wird auch in Steyermark angegeben: Sulzbacher Gebirge und Hochzinken.

Icon. t. 84. **Planta florens.** 1. Petalum. 2. Folium caulinum supra, 3 a latere visum.

Saxifraga Rocheliana Sternb.

Syn. *S. pseudocaesia* Rochel. pl. banat. rar. 35 (1828) *S. rigens* vel *rigida* Kit. Addit. 170. Linnaea XXXII. 474.

Caespitosa densissime longeque. Caulibus floriferis erectis, corymboso-paniculatis, 3—9 floris, glanduloso-pilosis. Foliis inferioribus dense aggregatis, horizontaliter expansis, spathulatis, obtusis, glaberrimis, supra planis, subtus convexiusculis, basi ciliatis, juxta marginem cartilagineum 7—9 fovearum serie notatis, caulinis sparsis, obovato-spathulatis, excepta parte apiculi cartilaginea glanduloso-pilosis. Pedicellis erectis calycibusque glandulosus, pallide viridibus, laciniis ovatis obtusis erectis. Petalis obovatis, unguiculatim attenuatis, 7 nerviis, laciniis triplo atque stamina duplo superantibus. Capsula subrotunda.

Flor. Jul. Augusto.

Hab. Siebenbürgen: bei Klausenburg. Sekelykö bei Torotzko, auf dem Berge Torda hasadek bei Torda, im Banat bei den Herkulesbädern. Serbien: Kloster Rača an der Dzina.

Icon. t. 85. **Planta florida.** 1. Flos. 2. Petalum. 3. Capsula. 4. Folium basale. 5. 6. Folium caulinum.

Saxifraga pedemontana All.

Syn. *S. Allionii* Baumg. en stirp. Trans. ind. I. 378. *S. caespitosa* Wulf. in Jacq. coll. I. p. 290. *S. cymosa* WK pl. rar. hung. I. 91. — Poir. diet. suppl. V. 77. *S. heterophylla* Sternb. rev. 50. Sturm l. c. Haw. en. Sax. 25. Host. fl. aust. I. 513.

Sparse glanduloso-pubescens. Caespitosa caudiculis dense foliosis, scapis oligophyllis, glabriusculis supra corymboso-paniculatis. Foliis turionum atque caulinis inferioribus cuneatis vel obverse triangularibus, in petiolum planum limbo aequilongum vel breviorum ciliatum attenuatis, limbo 3-lobo, lobis porrectis, lateralibus bifidis omnibusve inciso-dentatis, dentibus obtusis vel acutiusculis, obsolete nervosis; bracteis inferioribus cuneatis, sessilibus 5—7 fidis vel lineari-oblongis, obtusis. Pedicellis tenuibus, floribus brevioribus calyceisque glanduloso-pilosis. Calycis laciniis tubo multo longioribus, linearibus, obtusis. Petalis laciniis plus duplo longioribus, obovato-cuneatis, in unguem attenuatis, trimerviis. Capsula ovata, stylis erectis, calycis laciniis erectas aequantibus.

Flor. Julio.

Hab. Auf Hochgebirgen in einer Höhe von 2000—2500 m über dem Meeresspiegel auf feuchten Felsen.

Seealpen. Piemontesische und Savoier Alpen: Bursonnette, Val Tournanche, Mt. Bissa am Col di Tenda, Vinadio, Mt. Rosa. Dann erst wieder auf den Siebenbürgener Karpathen von 2300—2500 m. Auf den Rodnaer Alpen häufig, Alpe Pietroza bei Bora, Kühnornalpe, Arpasch, Fogarascher Alpen. Nnökkö, Koehat bei Sziget; in der Marmaros; auf dem Sarkos im Banat.

Leon. t. 86. **Planta florida.** 1. Petalum. 2. Folium caulinum.

Saxifraga retusa Gouan.

Syn. *S. imbricata* Lam. fl. fr. III. 531. *S. purpurea* All. l. c. 1531. Mor. l. c. 13. *S. Wulfeniana* et *S. Baumgartenii* Schott. in Oestr. bot. Ztg. 1857. 125. 126. *S. scrobiculata* Schur. in herb. Vindob. *S. oppositifolia* var. γ . Willd. Sp. II. 648. *Antiphylla retusa* Haw. l. c. 44.

Caudiculis prostratis ramosissimis, ramis dense caespitosis, florigeris erectis, 1—4 floris, supra glanduloso-hirsutis. Foliis inferioribus atque ramorum steriliū quadrifariam imbricatis e medio patentibus aut recurvis, oblongo-lanceolatis, apice plano triangulari 3—5 foveolatis, triquetro-carinatis, superioribus obovatis, apice obtuso, incrassato, retuso ciliatis, basi hirsutis. Calycis hirsuti laciniis oblongis obtusis. Petalis lanceolatis, laciniis duplo longioribus, staminibus brevioribus. Capsula oblongo-ovata, stylis erecto-patentibus, laciniis plus duplo superantibus coronata. Seminibus oblongo-triquetris, rugosis.

Flor. Junio, Julio.

Hab. Auf den höchsten Alpen von 2000—2500 m, besonders auf Gneiss. Seealpen: Col de la Madonna de Fenestre; Dauphiné: M. Viso, Mt. Osso, vallée de Cogna, Col de Rietaz, nicht selten in den Savoier Alpen: Mt. Cénis etc., auf den Penninischen Alpen: Mt. Rosa um 3500 m, Simplon, vallée d'Aosta; Salzburg: nur am Hochgolling, Schwarzkopf in der Fusch, Nassfelder Tauern; Obersteiermark: am Reichart, Sirbitzkogl der Judenburger Alpen, Reiting. Tatza: Krivan, Kohlbacher Grat, am langen See im Völksgrunde und unterhalb der Lomnitzer Spitze. Siebenbürgen: auf der nördlichen Kette: Injen, Kühnorn bei Rodna, Fogarasch, Padraschel; Marmaros: Pietra Stoluby.

Leon. t. 87. **Planta florens.** 1. Folium supra, 2. idem subtus visum. 3. Fructus. 4. Petalum.

Saxifraga oppositifolia L.

Syn. *S. coerulea* Lap. fl. pyr. (1795—1801). Pers. ench. I. 488. *S. oppositifolia* L. var. ς . Willd. Sp. I. 648. — Poir. dict. VI. 185. *Antiphylla coerulea* Haw. en Sax. 43.

Caudiculis procumbentibus ramosissimis, ramis dense caespitosis, florigeris erectis unifloris, glabris. Foliis oppositis, inferioribus atque ramorum steriliū quadrifariam imbricatis, superioribus remotiusculis, oblongis aut obovatis, apice patenti-recurvo obtusis, incrassatis, 1—3 foveolatis, subtus triquetris carinatis.

Calycis laciniis ovatis obtusis, eglanduloso-ciliatis. Petalis obovatis-oblongis, 5 nerviis, calycis laciniis triplo, staminibus duplo longioribus. Disco annulari stylos eingente angustissimo subnulla. Capsula ovata. Seminibus oblongo-triquetris, rugosis.

Flor. Julio, Augusto.

Hab. Auf steinigten Plätzen in der alpinen und hochalpinen Region der Hochgebirge, mit Bächen und Gletschern in die Thäler herabsteigend (Granit, Gneiss, Glimmerschiefer, Kalk, Dolomit, Basalt). Auvergne: auf dem südlichen Jura: la Dôle, le Reculet, le Colombier. Apenninenkette. Seealpen, Savoier Alpen, auf den Grands mulets von 3200—3700 m, noch auf den Dents d'Oche und dem Mt. Buet; Schweiz und von da verbreitet durch Südtirol. Nordtirol, Salzburg, Kärnthen, Krain, Steyermark, Oberösterreich; Riesengebirge: Riesengrund. Schneegruben: nicht häufig in der Tatra, Sarkos im Banat. Siebenbürgen: Arpas, Butsets, Fogaras.

Icon. t. 88A. *Planta florida.* 1. Petalum, calycis lacinia, stamen. 2. Folium.

Saxifraga biflora All.

Syn. *S. rosea* Lap. fl. pyr. (1795). *S. oppositifolia* β . Willd. Sp. II. 648. *Antiphylla biflora* Haw. en. Sax 44.

Caudiculis prostratis ramosis, ramis adscendentibus, supra pilosis, corymboso-paniculatis, 2—9 floris. Foliis oppositis, remotiusculis, inferioribus obovato-retundis, superioribus obovato-spathulatis, apice obtusiusculo, rarius acuto subincrassatis, uniloveolatis, sparsae pilosis atque ciliatis, dorso subcarinatis. Calycis late ovati, glanduloso-hirsuti laciniis ovatis, obtusis, pilis glanduliferis ciliatis. Petalis lanceolatis, laciniis dimidio longioribus angustioribus, trinerviis, stamina paullo superantia. Disco annulari stylos eingente latiusculo. Capsula globosa, stylis brevibus coronata. Seminibus oblongo-triquetris, rugosis.

Flor. Junio, Julio.

Hab. Zwischen Geröll in den höchsten Alpen, an der Schneegrenze von 2300—3300 m, auch nicht selten auf Gletschermoränen, besonders auf Granit, Gneiss, Glimmerschiefer, Kalk. Savoier Alpen nicht selten: Mt. Cénis, Haute lucre; auf den Penninischen Alpen oberhalb Zermatt; Mt. Ceroin, Mt. Rosa bei 3300 m. St. Bernhard: in den Lepontinischen Alpen: an der Furca; in den Glarner und Rhaetischen Alpen. Tirol: Kalser Alpen bis zum Grossglockner, Venediger, im Moränensande gegen die schwarze Wand, Brenner, Pflitschthal, Serlosspitz bei Innsbruck etc. In die Salzburger Alpen nicht selten bei 2000—2600 m. Oberkärnthen: Katschthal a. der Sternspitze, Gamsgrube, Pasterzengletscher; Obersteyermark: Rottenmannertauern, Hochgolling. Mahntzer Tauern: auf dem Sarkos im Banat auf Felsen der Gropa Bistri.

Icon. t. 88B. *Planta florida.* 1. Petalum, calycis lacinia, stamen. 2 a 6 Folium.

Saxifraga Rudolphiana Hornschuch.

Syn. *S. oppositifolia* Reiner u. Hohenwart. Reise t. 7. Sturm l. c.

Ramus brevioribus densissimis caespitibus minoribus efformantibus. Foliis superioribus calycisque laciniis glanduloso-ciliatis. Petalis obovatis, 3—5 nerviis, staminibus paullo superantibus.

Flor. Junio, Julio.

Hab. Auf den Hochalpen von 2000—3000 m, selten. Tirol: Lienz, Ahrnthaler Alpen; in Salzburg: Rauriser Tauern, Brennkogl 3000 m. Kalserthörl. In Kärnthen: Grossfragant im Möllthal, Sagritz, Gamsgarkogl bei Gastein, Grossglockner. In Obersteyermark: Hochwart, Reiting, Judenburger Alpen. In Siebenbürgen: Bulla.

Icon. t. 89. **Planta florida.** 1. Petalum. 2. Caudiculum a latere. 3. idem supra visum. 4. Folium a latere visum.

Saxifraga macropetala Kerner.

Syn. S. Kochii Hornung in Flora 1835. p. 465. Aut. germ. et. helv. pr. p. S. biflora var. 2. Gaud. fl. helv. III. 96.

Caudiculis prostratis, ramosis, ramis adscendentibus breviusculis, imprimis supra pilis longiusculis villosis obsitis, dense cymosis aut corymboso-paniculatis, 2—5 floris. Foliis oppositis approximatis, inferioribus rotundato-obovatis, basi cuneatis, apice plus minusve truncatis, superioribus obovato-cuneatis, apice obtuso vix incrassatis indistincte unifoveolatis, glabris aut sparse ciliatis, dorso planis. Calycis late ovati pilis glanduliferis sparse obsiti laciniis ovatis, valde obtusis, pilis glanduliferis ciliatis. Petalis late ellipticis, apice obtusiusculis, basin versus attenuatis, plus duplum laciniarum atque staminum longitudine aequantibus latitudine fere superantibus, 5 nerviis. Disco annulari stylos cingente latiusculo.

Flor. Julio, Augusto.

Hab. Schweiz: im Wallis: auf dem Gries, oberhalb Dala; Kärnthen: am Pasterzengletscher um die Johanneshütte und die Gamsgrube in Gesellschaft der S. biflora All. Tirol: bei Kals.

Icon. t. 90. **Planta florida.** 1. Petalum. 2. Capsula. 3. Folium.

Saxifraga Kochii Hornung.

Syn. P. hybrida Kerner. Tauschkatalog des Innsbr. Gart. 1866. S. spuria Kerner in Oest. bot. Ztg. 1870. p. 147. S. superbiflora × oppositifolia Kerner l. c., wahrscheinlich Hybride: S. oppositifolia × biflora.

Caudiculis lignosis, laxe quadrifariam foliosis. Caulibus foliosis foliis sese attingentibus vel remotis, canescenti-pilosis pilis glanduliferis intermixtis, supra cymoso-racemosis 1—3 floris, floribus valde congestis. Foliis obovatis, rotundatis, vix foveolatis, superioribus ciliatis, summis calycisque laciniis glanduloso-ciliatis. Petalis laciniis calycinis duplo longioribus, oblongo-lanceolatis, violaceis. Staminibus $\frac{2}{3}$ petalorum aequantibus antheris croceis. Disco annulari angusto.

Flor. Julio, Augusto.

Hab. Schweiz: Furka zwischen Mürren und Kienthal im Berner Oberland, Gemmi. Tirol: Ahrnthaler Alpen im Pusterthal, Serlosspitze im Stubai Thal, Kalser Thörl, Dornspitze oberhalb des Brenners und Wildseespitz in Pfisch.

Icon. t. 91. **Planta florida.** 1. Petalum. 2. Folium.

Saxifraga aspera DC.

Fl. fr. IV. 363. V. 378. — Gaud. fl. helv. III. 108. — Ser. l. c. 46. — Goodr. et Gren. fl. l. 640.

Plus minusve caespitosa caudiculis prostratis, gemmiferis, caulibus floriferis adscendentibus vel erectis, supra 1 floris aut paniculatis, paucifloris, remote foliosis. Foliis lanceolato-linearibus, spinuloso-aristatis ciliatisque, apice 1 porosis; foliis caudiculorum axillis gemmiferis. Pedunculis glabris, floribus multo longioribus. Calycis subtus sparse glandulosi laciniis petalis ovato-triangularibus, mucronulatis. Petalis oblongis vel obovato-oblongis, trinerviis, laciniis duplo longioribus. Staminibus petalis paullo brevioribus. Capsula ovata, laciniis erecto-patentibus duplo longiore. Seminibus oblongis, oblique truncatis, tuberculorum seriebus instructis.

Flor. Julio, Augusto.

Var. *elongata* Gaud. fl. helv. III. 108.

Folia caulina atque caudiculorum distantia, patula, viridia, 0,01—0,015 m longa, 0,002 m lata; gemmae caudiculorum folio fulerante brevioris. Caules 3—10 flori, 0,1—0,15 m longi.

Hab. Auf Hochalpen und in den Thälern von 1000—2700 m an feuchten Stellen (besonders auf Thonschiefer, Glimmerschiefer, Gneiss, Granit). Florentiner Apennin. Apuanische Alpen. Auf den Seealpen: auf den Savoier Alpen bis zum Mt. Buet 1000 m und noch im Jardin des Mer de Glace bei 2700 m, auf allen Schweizer Alpenketten, von da durch Tirol nach den Karnisehen Alpen. In der Centralkette der Salzburger Alpen nicht selten und bis Hüttschlag herabgehend; auf den Rottenmanner Tauern und den Steyerischen Alpen nicht selten. Oestlich wieder im Banat.

Var. *S. intermedia* Hegetschweiler. fl. helv. I. 288.

Folia caudiculorum distantia, patula; gemmae folio fulerante breviores, folia caulina minuta mitiusque ciliata.

Hab. Schweiz: Montanvert oberhalb Chamouny; an der Gotthardstrasse oberhalb Göschenen; auf der oberen Sandalp in den Glarner Alpen. Tirol: Rittner Alp.

Var. *S. bryoides* L. Sp. I. 400. II. 572. cod. 3146. — Don. l. c. 381. — Morett. l. c. 32. — Sternbg. rev. 30.

Folia caudiculorum densissima, tenuissime ciliata, apice incurva, 0,005—0,007 m longa, 0,001 m lata; gemmae majores folio fulerante aequilongae; folia caulina subapproximata, erecta, cauli apressa. Caules 0,03—0,08 m alti, 1—2 flori.

Hab. Wie die erste Form, aber noch höher gehend und an trockneren Stellen, jedoch auch stellenweise mit derselben vergesellschaftet. Seealpen. Savoier Alpen: Bizzum Mt. Buet (1000 m); im Jardin des Mer de glace (2800 m) und auf den Grands Mulets 3200—3500 m. Schweiz. Tirol. Karnische Alpen: häufig in der Centralkette der Salzburger Alpen; in der Rauris noch bei 1300 m. Steyrische Alpen. Niederösterreich, kleine Schnee-grube im Riesengebirge. Häufig in den Liptauer Karpathen und der Tatra; auf der Alpe Pietrosa und Marmaros; Siebenbürgen: Butsets und Banat: Sarkos und zwischen Murarn und Gugna.

Icon. t. 92. **Planta florida.** 1. Caudiculum. 2. Flos. 3. Petalum. 4. Fructus. 5. Folium.

Icon. t. 93. *Saxifraga bryoides* L. (als Art) wahrscheinlich *S. aspera* var. *bryoides* L. **Planta florida.** 1. Flos. 2. Folium.

***Saxifraga tenella* Wulf.**

Syn. *S. arenarioides* Brign. fasc. pl. torajul. 24. — Sternb. rev. 59. — Ser. l. c. 22. *S. nitida* Schreb. in litt. Sternb. rev. 32. — Ser. l. c. 22. *Chondrosea tenella* Haw. l. c. 15.

Laxe caespitosa caudiculis foliosis, prostratis erectisque, caulibus erectis, tenuibus, glabris, supra paniculatis, paucifloris. Foliis inferioribus atque caulinis lineari-subulatis, cuspidato-aristatis, margine sparse setuloso-ciliatis vel glabris basin versus glanduloso-ciliatis, apice l. perosis. Pedicellis tenuibus floribus longioribus. Calycis glabri laciniis triangularibus, acutis, tubum aequantibus. Petalis obovato-oblongis, laciniis duplo longioribus, supra recurvis, trinerviis. Capsula subglobosa laciniis calycinis erectis atque stylis divaricatis coronata. Seminibus oblongis, truncatis, tuberculorum seriebus instructis.

Flor. Junio, Julio.

Hab. Auf Kalkalpen in der Buchenregion von 1000—1600 m. Auf den julischen Alpen: Stupizza oberhalb Cividale, Mte. Camino, Mt. Longanino, Mangert, im Isonzothal oberhalb Sotcha und

auch sonst am Fusse des Terglou; bei Dziazzi, Sagor, häufig am rechten Ufer der Save bei Mitalovska Skala gegenüber Trifail; Carnizza im Resiathal. Obersteiermark: Krenze bei St. Lambrecht.

Icon. t. 94. *Planta florida.* 1. Flos. 2. Folium.

Saxifraga aizoides L.

Syn. *S. autumnalis* L. Sp. I. 402. II. 575. cod. n. 3160. *Leptasea aizoides* Haw. en. Sax. 39.

Laxe caespitosa caudiculis decumbentibus vel adscendentibus et e basi ramosis, glabris aut brevissime atque sparse pilosis, foliosis, unifloris, saepius supra racemosis, multifloris. Foliis inferioribus linearibus vel lineari-oblongis, mucronatis, subtus planis supra convexiusculis, glabris aut plus minusve rigide ciliatis apice uniporosis, superioribus remotiusculis, minoribus oblongis, obtusiusculis, rarissime ovatis; prophyllis linearibus. Calycis laciniis patentibus, muticis, oblongo-triangularibus, obtusis, in fructu patentibus. Petalis oblongis, laciniis sesquolongioribus, uninerviis. Staminibus petalis subaequilongis. Capsula ovato-globosa, stylis duplo brevioribus coronata.

Flor. Junio—Augusto.

Hab. An feuchtem Felsgestein, an Bächen und Quellen, auf Gletschermoränen etc., meist von 1000—2000 m, meist auf thonigem oder kalkigem Gesteine; aber auch auf Granit und Glimmerschiefer. Jura: Colombier, Reculet. Schwarzwald. Auf den Florentiner Apenninen nicht häufig; auf den Apuanischen Alpen; Seealpen; Savoier Alpen; auf dem Mt. Rosa noch bei 3300 m heruntergehend bis Armoy am Genfersee. Durch die ganze Schweiz, noch auf den Inseln der Aar bei Aaran, Tirol bis nach den bayrischen Alpen: Tegernsee, und auf den Inseln der Isar bis nach München herabsteigend. Salzburg. Karnische Alpen, Steirische Alpen, Ober- und Niederösterreich: Schneeberg. Barania bei Teschen, auf dem Rózsudec, Stoch und dem kleinen Krivan und von da durch die ganzen galizischen und ungarischen Karpathen häufig; Petrosa in den Marmaros; Sarkos im Banat; Siebenbürgen.

Icon. t. 95. *Planta florida.* 1. Flos. 2. Fructus. 3. Petalum. 4. Stamen. 5. Folium. 6. idem transsectum.¹

Saxifraga hirculus L.

Syn. *S. lutea* Gilib. fl. litt. V. 179. *S. propinqua* B. Br. in Ross. voy. ed. 2. II. 192. suppl. in Porry 3. voy. 273. *S. nutans* Adams in mem. de Moscou. IX. 242. *Hirculus ranunculoides* Haw. en. Sax. 40. *Hirculus propinquus* Haw. l. c. 41.

Caulibus erectis, foliosis, apice 1—3 floris, subtus glabri, supra ac pedunculi erecti uniflori fusco-villosis, glutinosis. Foliis lanceolatis, planis, integerrimis, obtusis, mediis atque superioribus sessilibus infimis spathulatis, in petiolum ciliatum, basi dilatatum attenuatis. Calycis sepalis oblongis, obtusissimis. Petalis sepalis triplo longioribus, oblongis, vel ovato-oblongis, basi bicallosis, trinerviis, nervis lateralibus longe trifidis. Staminibus sepalis longioribus, dimidium petalorum aequantibus. Capsula ovata, stylis brevibus divaricatis coronata.

Flor. Julio—Sept.

Hab. Auf Mooren der Ebene, besonders der nördlich gemässigten und Polarzone. Nicht selten auf dem mittleren Jura und im Gebiet desselben noch bei Vevey; nördlich von den bayrischen und Salzburger Alpen. Elixhausen unweit Salzburg, Schonrammer Moor bei Reichenhall, Deiringer Moor, Murnau, Haspelmoor bei Augsburg, Riederfilz bei Gräding etc. Regensburg, Löhden in Westphalen, Hannover, Schleswig-Holstein, Aalborg; ehemals bei Beneschau, Czenschkowitz u. Poln. Neukirch in Oberschlesien; zerstreut an mehreren Orten in Branlenburg, Mecklenburg, seltener in Posen; Pommern, sodann in Preussen, Litthauen, Volhynien, Podolien und an der Ostsee entlang durch Kurland.

Leon. t. 96. **Planta florida.** 1. Flos. 2. Alabastrum. 3. Petalum. 4. Fructus. 5. Stamina.

Saxifraga stellaris L.

Syn. S. Redowskyi Adams in Mém. de Moscou IX. 241. Spathularia stellaris Haw. l. c. 49.

Caudiculis brevissimis vel longioribus, prostratis, sparse foliatis, apice rosulatis scapo uno vel pluribus subnudis, molliter pilosis, paniculatis ramis erectis vel erecto-patentibus. Foliis basalibus obovato-cuneatis vel spathulato-cuneatis, in petiolum brevissimum attenuatis; apice dentato-serratis, dentibus brevibus acutis vel obtusiusculis, bracteis cuneatis apice dentatis, prophyllis lineari-lanceolatis. Calycis sepalis oblongo-lanceolatis, obtusiusculis. Petalis duplo longioribus, patentibus, lanceolatis, breviter unguiculatis. Staminibus petalis brevioribus. Capsula ovata, stylis erectis, brevissimis coronata. Seminibus fusiformibus, tuberculorum oblongorum seriebus instructis.

Flor. Julio, Augusto.

Hab. An Bächen, Quellen, feuchten Plätzen der subalpinen und alpinen Region der mitteleuropäischen Hochgebirge und im hohen Norden verbreitet auf Granit, Gneiss, Glimmerschiefer, Kalk, Dolomit.

Forma vulgaris.

Foliis spathulato-cuneatis, utrimque atque margine pilis adpersis instructis. Caule erecto corymboso-racemoso vel corymboso-paniculato. Petalis aequalibus, albis, basi punctis duobus citrinis notatis.

Hab. Nicht häufig auf dem Toscanischen und Ligurischen Apennin. Seealpen, Savoier Alpen (M. Rosa bis 10 060'), auf allen Schweizer Alpenketten verbreitet; auf den Vogesen häufig: Ballons de Soultz et de St. Maurice, Hohneck; Lac noir etc. Schwarzwald: Belchen, Feldberg. Sehr verbreitet auf allen deutschen Alpenketten bis in die bayrischen Alpen und bis zum Wiener Schneeberg; auf der Babia Gora, selten auf der Tatra: grosser Krivan; im Bihariagebirge; Petrosa, Pop Ivan in der Marmaros; häufiger auf den Siebenbürgener Karpathen: Fogaras, Ollan, Arpas, Butsets etc. Sarkos im Banat.

Forma glabrata Sternb. suppl. II. 13.

Tota glaberrima: saepius foliis minoribus remotiusculis, apice tantum dentatis vel integris. Pedicellis tenuissimis.

Hab. An sehr feuchten, quelligen Plätzen.

Forma hispidula Rochel. pl. ban. rar. 34. Foliis hispido-hirsutis.

Hab. Am häufigsten von allen Formen.

Var. robusta Engl.

Syn. S. Clusii aut. germ. S. stellaris β leucanthemifolia Hausm. Fl. v. Tir. 337. Major; caule multifloro, corymboso-paniculato. Foliis oblongo-cuneatis. Petalis inaequalibus, tribus ovato-lanceolatis, distincte unguiculata, duobus lanceolatis, basi attenuatis.

Hab. Nicht selten in den Alpen: so in der westlichen Schweiz am Simplon, in Tirol: auf der Seiseralp, den Ritten, Krähkogel im Oetzthal und in Salzburg auf dem Untersberg.

Var. obovata Engl.

Tota glabra. Foliis obovatis, basi attenuatis, apice paullum dentatis.

Hab. Siebenbürgen: Rodnaer Alpen.

Forma pauciflora Engl.

Humilis, 1—2 flora. Foliis plerumque latioribus, obovato-cuneatis, hirsutis. Capsula major.

Hab. Auf den höchsten Alpen.

Icon. t. 97. **Planta florida.** 1. Capsula. 2. Petalum.

Saxifraga Clusii Gouan.

Syn. *S. leucanthemifolia* Lap. fl. pyr. 49. Sterb. rev. 10. suppl. II. 14. Don. l. c. 358 nec. Michx. *S. stellaris* β *leucanthemifolia* Duch. in Ann. d. sc. nat. 1836. p. 248. Godr. et Gren. fl. d. Fr. I. 638. *Spathularia Clusii* Haw. l. c. 48.

Caudiculis brevissimis apice rosulatis, scapo parce folioso subtus et supra patenti-piloso, e basi vel e medio paniculatim ramoso, ramis erecto-patentibus, fructiferis horizontaliter patentibus, multifloris. Foliis teneribus, basalibus spathulatis, in petiolum marginatum sinuato-attenuatis, e medio grosse dentatis, superioribus spathulatis integris, summis linearibus. Pedicellis tenuissimis floribus longioribus. Calycis laciniis oblongis, obtusiusculis. Petalis sepalis duplo longioribus, aequalibus vel inaequalibus, tribus longioribus unguiculatim attenuatis, basi bipunctatis. Capsula ovato-globosa, stylis brevissimis coronatis, usque ad medium vel ultra medium dehiscente.

Flor. Junio, Julio.

Hab. Auf feuchten, quelligen Plätzen und an Bächen der Pyrenäen um 1800 m; in den Cevennen und dem Jura.

Icon. t. 98. **Planta florida.** 1. 2. Petala. 3. Folium.

Saxifraga lingulata Bell.

Syn. *S. Cotyledon* var. γ Vitm. sag. ist. erb. 31. — *S. pyramidalis* Ten. prod. fl. neap. 25. — *S. longifolia* γ . Ser. l. c. 19. partim.

Caudiculis adscendentibus, ramosis, foliorum vestigiis appressis obtectis, caespitem formantibus. Caulibus erectis vel adscendentibus, plerumque glabris aut pilis tenuibus glanduliferis sparse obsitis, foliosis, superne vel e medio thyrsoido-paniculatis, ramis tenuibus apice corymboso-paniculatis 3—5 floris, tenuibus, saepissime secundis. Foliis basalibus numerosis, rosulatis, supra sulcatis, plerumque lineari-spathulatis, acutiusculis, basi parte media latiore ciliatis, margine eroso-crenulatis, calcareo-crustatis; foliis caulinis brevioribus, margine cartilagine minus crustatis; bracteis atque prophyllis linearibus. Calycis glabri laciniis ovatis vel oblongis, obtusissimis, margine membranaceis, minutissime ciliatis. Petalis ovatis vel obovato-oblongis, basim versus attenuatis, trinerviis, laciniis calycinis duplo triplove longioribus.

Flor. Junio, Julio.

Hab. Auf Kalkbergen von 1200—1600 m. Auf dem Apennino buccchese und pistojese, Lunga, la Linea. Monte Regnolo, Mt. Cornu, auf den Apuanischen Alpen, Carrara. Ligurische Apenninen. Seealpen: Val de la Vesubia, Col di Tenda.

Icon. t. 99. **Planta florens.** 1. Flos. 2. Petalum. 3. Folium basale.

Saxifraga cuneifolia L.

Syn. *S. punctata* Gunnar. norv. et act. Nafn. *S. daurica* Schleich exsicc. *S. excavata* Kze. pug. pl. med. I. II. *S. Robertsonia cuneifolia* Haw. en. 56. — *S. multicaulis* Lge. ind. sem. hort. Haun. 1864.

Laxe caespitosa caudiculis sublignosis, tenuibus apice rosulatis, caulibus teneris, erectis, breviter atque tenuiter glandulosus, nudis supra laxè paniculatis, ramis 1—3 floris. Foliis glaberrimis, obovatis vel subrotundis, in petiolum longiorem, planum, ciliatum cuneatim attenuatis, obtusissimis, margine tenui cartilagineo repando-crenatis, poris minutis instructis, prophyllis linearibus. Pedicellis floribus triplo quadruplo longioribus. Calycis laciniis oblongo-triangularibus obtusissimis. Petalis oblongis, trenerviis. Stamina petalis paullo superantibus. Capsula ovata, stylis brevibus erectiusculis coronata.

Flor. Junio, Julio.

Hab. An schattigen, moosigen und feuchten Plätzen der subalpinen Region der Hochgebirge von 1300—2000 m. Vom Toscanischen Apennin bis zum Ligurischen nicht häufig. Seealpen: in der Dauphiné, noch bei Grénoble. In den Piemontesischen und Savoier Alpen; noch bei Meillerie am Genfer See; ausserdem in der südlichen Schweiz zerstreut: St. Gotthardt, Zermatt, Mt. Auvert; Graubündtner Alpen etc.; im südlichen Tirol; sowie im Iselthal und bei Kitzbühel; Untersteiermark: Neuhaus, Ruine und Teufelsgraben bei Cilli, Heediggraben bei Schönstein, Reifenstein; Kärnthen: Karawanken, Loibl. In den Voralpen von Krain: Steinalpe, Poutaf, am Terglou. Istrien: Aquileja. Croatien: Agram; im Banat: Rezbanya, am Fusse des Bagyes bei Lunkany und Gladna im Com. Krassó; bei den Hereulesbädern; Bihariagebirge; in den Siebenbürgischen Karpathen: Thorpass, Coinschiza, Gurarin, Fogaras, Kapellenberg bei Kronstadt und am Ursprung der schwarzen Theiss.

Var. subintegra Ser. I. c. 12.

Syn. *S. apennina* Bert. fil. in Bull. delle science med. ser. II. vol. 9. 65. Bert. fl. ital. IV. 478. *S. capillipes* Rehb. fl. germ. 560. *S. cuneifolia* var. Reut. in hort. Genev.

Caudiculis longis parce foliosis, apice rosulam gerentibus. Foliis minoribus, retusis, pauci dentatis vel integerrimis, petiolo aequilongo suffultis. Caulibus paucifloris, simpliciter paniculatis.

Hab. Mit der Normalform auf den Apenninen von Pistoja; auf den Seealpen: Col de Braus, Col di Tenda; ? auch in den Berner Alpen und im südlichen Tirol.

Icon. t. 100. **Planta florida.** 1. Folium basale. 2. Flos. supra. 3. Eadem subtus visa. 4. Capsula.

Saxifraga umbrosa.

Syn. *S. spathularis* Brot. fl. lusit. II. 172. *Robertsonia umbrosa brevipes et longipes* Haw. l. c. 55. *S. umbrosa d. crenata* Ser. I. c.

Laxe caespitosa caudiculis sublignosis, caulibus erectis, nudis, supra laxè paniculatis, ramis 3—6 floris breviter glanduloso-hirsutis. Foliis rosularum oblongis vel obovato-oblongis sparse hirsutis, in petiolum ciliatum, rarius glabrum subaequantem attenuatis, obtusissimis, margine tenui cartilagineo obtuse crenatis, dente apicali obtuso latiori, poris distinctis. Prophyllis linearibus. Pedicellis floribus triplo quadruplo longioribus. Calycis laciniis oblongis, obtusiusculis. Petalis oblongo-oratis trinerviis. Stamina clavatis, petala paullo superantibus. Capsula ovata supra attenuata stylis dimidium aequantibus erectiusculis coronata.

Flor. Junio.

Hab. Verwildert im Jura, im Elsass: Ballon de Sulz 1300 m oberhalb Colmar; ehemals am Mönchsberge bei Salzburg, Reichenstein in Obersteiermark und im mährischen Gesenke.

Icon. t. 101. **Planta florens.** 1. Flos supra. 2. Eadem subtus vita. 3. Capsula. 4. Eadem transsecta.

Saxifraga moschata Wulf.

Syn. *S. caespitosa* L. Sp. I. 404, II. 578. cod. 3172. pr. p. etc. *S. muscoides* auct. plurim. *S. secunda* Mor. l. c. 20. Sternb. suppl. I. 11. *S. hypnoides* Vitm. ist. herb. 26. 29. — Savi due cent. 110. *S. muscosa* Suter fl. helv. I. 251. *S. varians* Sieber fl. aust. exs. 132.

Caespitosa caudiculis herbaceis vel sublignosis foliosis, caulibus floriferis erectis, oligophyllis, subglabris vel glanduloso-pilosis. Foliis laevibus, nervis haud prominulis, glabris vel glanduloso-pilosis, caudiculorum linearibus, integris, obtusis, vel cuneatis, trifidis, rarius quinque fidis lobis linearibus, obtusis, porrectis, turionum plerumque indivisis; caulinis sparsis, trilobis vel integris, bracteis atque prophyllis linearibus, obtusis. Floribus I—10 in racemis aut paniculis. Calycis laciniis ovatis, obtusis. Petalis patentibus, oblongis, obtusis, laciniis calycinas paullo superantibus, trinerviis, nervis lateralibus ex parte media provenientibus. Capsula ovato-globosa, stylis laciniis calycinas vix superantibus. Seminibus obovato-oblongis, tuberculorum minorum seriebus instructis.

Flor. Julio, Augusto.

Hab. Auf Hochgebirgen und Steingeröll, an trockenen und feuchten Stellen in der Höhe von 1200—3000 m verbreitet, auch bis 3500 m emporsteigend und nicht selten mit Bächen in die Thäler herabgehend (auf Granit, Gneiss, Glimmerschiefer, Kalk, Dolomit, Basalt etc.).

Forma vulgaris.

Syn. *muscoides* Wulf. in Jacq. misc. II. 123. Sternb. rev. 39. excl. syn. plur., suppl. II. 65 et auct. plurim. *S. pyrenaica* Vill. fl. Dauph. III. 671. *Muscaria muscoides* Haw. ex. 37.

Caespitosa, caulibus floriferis 3—10 floris racemosis aut paniculatis, subtus glabriusculis, supra glandulosis obtectis. Foliis glabris vel basi glandulosis, linearibus, obtusis atque cuneatis, in petiolum attenuatis, trifidis vel quinquefidis. Pedicellis atque calycibus glandulosis. Petalis oblongis vel ovalibus laciniis calycinas latitudine vix superantibus.

Hab. Auf der Apenninenkette von den Abruzzen bis zum Ligurischen Apenninen; auf den Apuanischen Alpen. Jura: Reculet, Colombier, La Dole. In den Seealpen und Savoier Alpen, auf dem Mt. Buet unter 1000 m, in der Schweiz nicht überall, sondern stellenweise durch *S. exarata* Vill. vertreten, von da durch die ganze Alpenkette und Voralpenkette verbreitet bis zum Wiener Schneeberg, am nördlichsten in der Kleinen Schneegrube im Riesengebirge; durch die ganze Karpathenkette vom Choč und Rozsudec bis in die Siebenbürgischen Karpathen und im Banat.

Forma glandulosa.

Syn. *S. moschata* Wulf. l. c. vera.

Dense caespitosa, caulibus subtus et supra glandulis obtectis. Foliis glandulis brevissimis dense pubescentibus, viscidis, cuneatis, in petiolum attenuatis, trifidis, turionum trifidis aut linearibus. Petalis luteo-viridibus vel luteis.

Hab. Mit der Hauptform verbreitet, doch mehr im südlichen Theil der Alpen und im Urgebirge, als im nördlichen Gebiet der Voralpen.

Forma compacta Mert. et Koch Deutschl. Fl. II. 142.

Syn. *S. muscoides* α . *hemisphaerica* Sternb. suppl. II. 65. *S. acaulis* Gaud. in Meisn. Anz. 1829 p. 68. *S. muscoides* var. *acaulis*, *uniflora* et *crassifolia* Gaud. fl. helv. III. 127. Ser. l. c. 25. *Muscaria acaulis* Haw. en. 38.

Densissime caespitosa, caudiculis brevibus, caulibus floriferis brevissimis subunifloris. Foliis imbricatis, fere obovato-cuneatis, integris atque trifidis.

Hab. An höher gelegenen Stellen als die normale Form, bei 3000—3500 m; so am Mt. Fouly, am Gornergrat oberhalb Zermatt etc.

Var. *S. pygmaea* Haw. misc. nat. 168. Don. l. c. 439. excl. syn. Lap. Pers. et Sternb.

Syn. *paradoxa* Kit. Add. l. c. 478. *S. moschata* β Lap. l. c. 62. etc.

Dense caespitosa. Foliis crassiusculis omnibus integris apice rotundato-obtusis, vel apice trirenatis.

Hab. Mit der Hauptform nicht selten.

Var. *S. atropurpurea* Sternb. rev. 41.

Syn. *S. atropurpurea* Sternb. in Sturm fl. germ. 33. Gaud. fl. helv. III. 129. *S. ampullacea* Ten. fl. neap. prod. app. IV. 59. *S. muscoides* β . *purpurea* Sternb. suppl. II. 65. *S. porphyrantha* hort. Goett. *Muscaria atropurpurea* Haw. l. c. 26.

Petalis atropurpureis atque interdum obovato-oblongis.

Hab. Zerstreut in der Schweiz: Grandoire zwischen dem Dent de Morele und dem Fouly; Tirol: Grundowitzer Alpe, Schleern. Krain: auf dem Kru, auf der Jezerithalp unterhalb des Terglou.

Var. *S. crocea* Gaud. in Meisn. Anz. 1818. fl. helv. III. 133. Ser. l. c. 25.

Syn. *Muscaria crocea* Haw. l. c. 38.

Caespitosa caulibus brevibus supra subeymosis. Petalis calycis laciniis vix superantibus croceis.

Hab. In den Alpen des südlichen Savoien. Von der vorigen wahrscheinlich nur wenig verschieden.

Forma laxa Sternb. suppl. II. 65.

Syn. *caespitosa* var. *cum surculis* Lap. l. c. 60. *S. muscoides* ϵ *lineata* Sternb. suppl. I. 40. *S. elongella* Haw. misc. nat. 167. *Muscaria muscoides* β *elongella* Haw. en. Sax. 37. *S. Rhei* Schott. Anal. bot. 30.

Laxe caespitosa caudiculis longioribus, caulibus elongatis, plerumque multifloris paniculatis. Foliis caudiculorum longe petiolatis, trifidis vel quinquefidis lobis linearibus.

Hab. An feuchteren und schattigeren Orten, als die übrigen Formen.

Var. *S. Allionii* Gaud. in Meisn. Anz. 1818. p. 28.

Laxe caespitosa robusta caulibus 0,08—0,15 altis, multilloris, paniculatis. Foliis longe petiolatis, apice 3—5-lobis, lobis brevibus obtusissimis. Petalis latioribus, obovatis.

Hab. Schweiz: Mt. Fouly.

Leon. t. 102. **Planta florens.** 1. Calycis lacinia. 2. Folia. 3. Flos. 4. Stamen. 5. Flos transsecta. 6. Petalum.

Saxifraga exarata Vill. fl. Dauph. III. 674.

Caespitosa caudiculis subligosis vel herbaceis, apice rosulatis, caulibus floriferis erectis oligophyllis, subtus pilis mollibus hirsutis, supra glandulis tenuibus intermixtis, supra paniculatis, 4—10-floris. Caudiculorum foliis cuneatis, sessilibus vel petiolatis, trilobis lobo medio oblongo, obtuso, lateralibus aut

indivisis aut bipartitis acutiusculis, petiolo lobisque distincte nervosis, turionum foliis trifidis aut lanceolatis, indivisis, foliis caulinis tripartitis; bracteis lanceolatis. Pedicellis calyceibusque breviter glandulosis. Calycis laciniis obtusis vel subacutis. Petalis obovatis vel obovato-oblongis, trinerviis, laciniis duplo longioribus. Stamina dimidium petalorum aequantibus. Capsula ovata vel ovato-globosa, basi truncata.

Flor. Junio, Julio.

Hab. In der alpinen Region der Hochgebirge von 1800—2700 m. stellenweise bis 3600 m zwischen Felsblöcken an trockenen und feuchten Plätzen (auf Granit, Gneiss, Glimmerschiefer, Kalk).

Forma vulgaris.

Syn. *S. exarata* Vill. fl. Dauph. III. 674. Don. l. c. 432. excl. var. β . — Morett. l. c. 20. — Ser. l. c. 27. excl. *S. palmata*. — Sternb. suppl. II. 70. — *S. hypnoides* All. fl. ped. 72. n. 1338. *S. striata* Hall. fil. ex herb. Gaud. fl. helv. III. 129. *S. caespitosa* Wühlbg. fl. helv. 80. — Gaud. fl. helv. III. 125. et auct. helv. *S. leucantha* Thomas cat. 1818 et in Reichb. exsicc. Germ. *S. exarata* α major Ser. *S. exarata* α compacta Koch Syn. 1838. p. 274.

Tota planta glanduloso-viscida. Caulibus floriferis erectis, oligophyllis, paucifloris racemosis aut multifloris, paniculatis. Foliis obscure viridibus, nervis imprimis in petiola valde prominulis, aut euneatis aut unguiculatim in petiolum attenuatis, trifidis lobis porrectis. Petalis obovatis vel obovato-oblongis, laciniis calycinis duplo longioribus, albidis.

Flor. Junio, Julio.

Hab. Auf den Seealpen, auf den Cottischen Alpen bis Avignon, auf den Savoier Alpen (Grands mulets 3000—3600 m, Mt. Rosa bis 3500 m). Ziemlich häufig auf den Schweizer Alpen, besonders in Graubünden, ebenso in den angrenzenden Ortler Alpen; sehr häufig auf dem Stifser Joch bis 2700 m. Zerstreut in den Tiroler Dolomiten: Fassathal, Seiseralp. In Kärnten und Krain. Zerstreut in Untersteiermark: Sulzbacher Alpen. Obersteiermark: Judenburger Alpen, Reichenstein. Tatra.

Var. *maculata* Rehb. fl. germ. excurs. 555.

Dense caespitosa. Foliis euneatis, in petiolum longiorem attenuatis, indivisis vel apice trifidis lobis lateralibus brevissimis. Petalis albidis, inferne maculis oblongis purpureis notatis.

Hab. Savoien: Mt. Cervin; Schweiz: zwischen dem St. Gotthardt und der Furca; am Rhone-gletscher.

Forma laxa Koch Synops. 1837. p. 235.

Syn. *S. intermedia* Gaud. fl. helv. III. 122.

Caudiculis elongatis, laxius foliosis caulibus floriferis erectis longioribus. Foliis plerumque palmato-5-fidis lobis lateralibus paullo divaricatis. Petalis albidis.

Hab. An niedriger gelegenen Orten in der Schweiz nicht selten.

Icon t. 103. *Caespes plantarum floridarum*. 1. Flos. 2. 3. 4. Folia.

***Saxifraga decipiens* Ehrh.**

Syn. *S. caespitosa* Koch Synops. 1857. l. 235. *S. caespitosa* Baker in Journ. of bot. 1870. v. VIII. p. 281. pr. p.

Caespitosa caudiculis herbaceis, rarius sublignosis, foliosis, caulibus erectis, oligophyllis, glabris, vel imprimis supra glanduloso-pilosis, 1—9-floris, floribus paniculatis. Foliis obovato-euneatis vel spathulato-euneatis, in petiolum planum, uninerviis attenuatis, apice aut tricuspidatis aut trilobis, lobis latera-

libus bilobis vel trilobis vel etiam medio trilobo; lobis oblongis obtusiusculis vel acutis; caulinis obovato-cuneatis, 3—5-lobis, lobis lineari-oblongis; bracteis linearibus. Pedicellis calycibusque glandulosis. Calycis laciniis tubo aequilongis, ovato-oblongis, obtusiusculis vel acutis. Petalis laciniis triplo, staminibus duplo longioribus, obovatis, trinerviis. Capsula ovata vel ovato-globosa, stylis laciniis superantibus coronata. Seminibus oblongis, fusiformibus tuberculorum minorum seriebus instructis.

Flor. Junio, Julio.

Hab. An freien steinigten Orten und in Laubwäldern der niedrigeren, mitteleuropäischen und nordeuropäischen Gebirge auf Basalt, Trachyt, Phonolith, Porphyr etc., sowie auch im hohen Norden.

Forum vulgaris.

Syn. *S. petraea* Roth. tent. V. l. p. 184. With. Brit. 890. *S. villosa* Willd. hort. berol. I. 464. *S. Lapeyrousi* Sternb. rev. 51. *S. caespitosa* β. Smith. Engl. Fl. II. 274. *S. latifida* Don l. c. 420. Sternb. suppl. I. 78. *S. tridentata* Don l. c. 426. *S. latifolia* Ser. l. c. 32. *S. Steinmanni* Tausch. hort. Canal. *S. hypnoides* δ *villosa* Walk. Arn. et Ser. in DC. Prod. IV. 32. excl. syn. *S. atropurpurea* hort. Jen. teste Regel. *S. geranoides* hort. Goett. teste Regel. *S. serrata* hort. Paris. teste Regel. *S. Stephaniana* hort. Brux. teste Regel.

Laxe caespitosa, villosa, canescens. Caulibus erectis, foliosis, 4—9-floris, floribus longe pedicellatis. Foliis inferioribus late cuneatis vel spathulatis, in petiolum longiorem attenuatis, profunde 3-fidis vel 5-fidis, rarius 7-fidis lobis oblongis, obtusis, muticis; foliis turionum trifidis. Calycis laciniis ovatis, obtusis, muticis.

Hab. Häufig im Harz: Unterharz, Bodehal, Rosstrappe, Rübeland; auf dem Scharfenberge zwischen Hessen und Westfalen; Nürnberg, auf den Bergen von Bayreuth, bei Gossweinstein; Fichtelgebirge: Grünstein vor Gefrees, Elsterthal bei Plauen. Böhmen: St. Ivan bei Prag. Bilin, Milleschauer etc. In Mähren nicht selten; in Schlesien ehemals nur bei Dörnikan an der Heuscheuer.

Var. *S. Sternbergii* Willd. h. berol. I. 462. Sternb. rev. 56. Don l. c. 425.

Syn. *S. elongata* Panz. *S. palmata* Smith. brit. tl. II. 456. *S. hirta* Don. hort. cant. ed. V. 507. Smith Engl. Bot. t. 2291. *S. hibernica* Haw. l. c. 29. *S. incurvifolia* Don. l. c. 423. Sternb. suppl. II. 78. *S. intermedia* Tausch in Link en. hort. ber. I. 415. *S. geranoides* h. Turic. teste Regel.

Foliis ciliatis, subpedatitidis, lobo medio integro, lateralibus bifidis aut lobo medio atque lateralibus trifidis, laciniis obtusiusculis.

Hab. Häufig im Harz. Nürnberg.

Var. *S. groenlandica* L. Sp. pl. 578. Ser. l. c. 27.

Syn. *S. caespitosa* α *compacta* Koch. l. c. 236.

Dense caespitosa. Caulibus oligophyllis, paucifloris. Foliis late cuneatis, palmatis 3—5-fidis, lobis ovato-lanceolatis acutis.

Hab. Auf den höchsten Punkten im Harz.

Icon. t. 101. **Planta florens.** 1. Flos. 2. Folium basale. 3. Folium caulinum.

Saxifraga sponhemica Gmel. fl. bad. III. 226.

Syn. *S. decipiens* var. *quinquefida* Haw. Misc. nat. teste Baker l. c. 283. *S. condensata* Gmel. fl. bad. III. 226. *S. hypnoides* Dub. bot. 210. Godr. fl. lorr. ed. I. l. p. 265. et auct. angl. *S. platy-*
8*

petala Smith in Transact. of the Linn. soc. X. 391. Don. l. c. 422. *S. elongella* Smith. l. c. 340. Don. l. c. 449. *S. decipiens* var. *acutiloba* Sternb. suppl. II. 76. *S. laevis* Haw. Misc. aut. 165. en. Sax. 30. Shirta Haw. Misc. nat. 164. *S. trifida* Haw. Misc. nat. 165. en. Sax. 34. *S. caespitosa* γ *spontemica* Koch in F. Schultz. Fl. gall. et germ. exsicc. 1840. Fl. Pfalz. 1845. p. 172. Arch. de la Fl. de Fr. et d'All. 1848. *S. affinis* Don. l. c. 418. *S. laetevirens* Don. l. c. 451. *S. sedoides* Hort. *S. ceratophylla* hort. Hamb. teste Regel. *S. pedatifida* hort. Goett. teste Regel.

Caulibus glabriusculis. Foliis subglabris, cuneatis, trilobis, rarius quinque-lobis, lobis porrectis, lanceolatis, mucronulatis: foliis caulinis lanceolatis mucronulatis. Calycis laciniis acutis.

Flor. Julio, Augusto.

Hab. Vogesen: Hohnack, am See von Lispach. An der Nahe bei Oberstein, Kirn und Kreuznach. Rheinpfalz: zwischen Burgsponheim und Winterburg, Irzweiler, Niederalben, Steinalb, Cusel. Fichtelgebirge: bei Stain. Luxemburg: im Thal der Semoy, Viandem, Membre bei Namur. Belgien: Lüttich, Spaa, Pont Chiny, Herbeaumont, Bonillon etc.

Icon. t. 105. **Planta florens.** 1. Flos. 2. Fructus. 3. Folium basale. 4. Folium caulinum.

Saxifraga hypnoides L.

Sp. I. 405. Sp. II. 579. cod. 3176. Mor. l. c. 24. Sternb. rev. 45. suppl. II. 79. pr. p. Don. l. c. 447. pr. p. Ser. l. c. 31. pr. p. et excl. plur. syn. Syn. *S. enhypnoides* var. *gemmifera* Syme. Eng. Bot. ed. 3. vol. IV. 83. *S. scariosa* Schleich.

Laxe caespitosa, caudiculis herbaceis, laxe foliosis, caulibus erectis tenerrimis glandulis obsitis, paniculatis, 3—7-floris, floribus longe pedicellatis. Foliis caudiculorum erassiusculis pilis tenerrimis, sparsis obsitis, serius glabriusculis limbo suborbiculari usque ad basin inciso, trilobo, petiolo longiore, plano, uninervio, latiusculo, ciliato suffultis, lobis lineari-lanceolatis, medio paullo dilatatis, acutis vel mucronatis, lateralibus divaricatis, saepe bilobis; turionum foliis superioribus tridentatis in petiolum longum attenuatis, summis linearibus lanceolatis; gemmis coniformibus, cataphyllis exterioribus lanceolatis, carinatis, mucronatis, nervo medio herbaceo excepto scariosis, longe densissimeque arachnoideo-ciliatis; foliis caulinis sparse atque bracteis lineari-lanceolatis, ciliatis, acutis vel mucronatis. Calycis densissime glandulosi laciniis oblongo-triangularibus, mucronulatis, tubo aequilongis. Petalis obovatis, trinerviis, laciniis staminibusque duplo longioribus. Capsula ovato-globosa stylis erectis, laciniis calycinis persistentibus erecto-patentibus paullo longioribus coronata.

Flor. Junio.

Hab. In Felsspalten niedriger und höherer Kalkgebirge vorzugsweise des südwestlichen Europas. Auf den Gebirgen zu beiden Seiten der Rhone bis Lyon (?).

Icon. t. 106. **Planta florens.** 1. Petalum.

Saxifraga stenopetala Gaud.

Syn. *S. aphylla* Sternb. rev. 40. suppl. II. 62. *S. uniflora* Froelich. *S. leptophylla* Froelich. *S. sedoides* γ Don. l. c. 408. excl. syn. Whlbg. *Muscaria stenopetala* Haw. l. c. 39.

Laxe caespitosa caudiculis numerosis, sparse foliatis apice rosulatis, floriferis supra nudis, sparse glanduloso-pilosis, unifloris, rarius bifloris, pedunculis tenuioribus prophyllis linearibus obtusis instructis. Foliis inferioribus integris vel 3—5-cuspidatis laciniis ovato-lanceolatis obtusis, muticis. Calycis laciniis

ovatis, acutis, tubo aequilongis. Petalis linearibus, acutis laciniis aequilongis. Stamina paullo brevioribus. Capsula ovato-globosa, stylis divaricatis coronata. Seminibus magnis, ovatis, sublaevibus, nigris, nitidis.

Flor. Junio, Julio.

Hab. Zwischen Geröll der höchsten Alpen von 2300—3000 m, nicht selten (auf Kalk, Glimmerschiefer mit Vorliebe). Auf den Berner, Glarner und Allgäuer Alpen, auf den Graubündtner Alpen und Rhätischen Alpen nicht selten, auf dem Wormser Joch und den Tiroler Alpen: Hochleiten, Schleern, Laas, Kitzbühel, Solstein bei Innsbruck; im Allgäu und auf den oberbayrischen Alpen verbreitet: Karwendel, Zugspitze, Watzmann etc. In Salzburg selten: hoher Goell, Pflugthal, Tennengebirge, grosser Rettenstein, Kamehlhorn, Buchener Scharte, Nebelsberg; auf den Kalkalpen von Obersteiermark: am Sparafeld, dem höchsten Gipfel des Kablings bei Admont, Reichenstein, Hochschwab, Reiting, Reichart. Oberösterreich: hohe Priel, Schneealpe; Niederösterreich: am Kaiserstein des Schneeberges.

Icon. t. 107. *Plantae floridæ*. 1. Flos. 2. Petalum. 3. Calyx. 4. Folium. 5. Caulis fragmentum.

***Saxifraga sedoides* L.**

Sp. I. 404. S. X. n. 26. Sp. II. 572. cod. 3145. Sternb. rev. 27. Mor. I. c. 15. Don. I. c. 408. excl. S. Seguieri et syn. Seg. et var. γ . Haw. I. c. 35. Ser. I. c. 23. Syn. S. trichodes Scop. fl. carn. 295. S. aphylla Ten. prod. fl. neap. app. IV. 21. excl. syn. S. androsacea Comolli prod. fl. Com. 78. excl. syn. S. saginoides Froel.

Glabra vel sparse pilosa caudiculis numerosis, sparse foliatis, apice rosulatis, floriferis basi ramosis pedunculis multo longioribus, 1—3-floris. Foliis lanceolatis, acutis vel mucronatis, integris, brevissime ciliatis, basi in petiolum dilatatum attenuatis, in siccitate trinerviis, prophyllis linearilanceolatis, acutis. Pedicellis elongatis floribus triplo quadruplo vel plus longioribus. Calycis laciniis tubo in anthesi aequilongis, in fructu brevioribus, ovatis, acutis. Petalis lanceolatis, acutis, laciniis aequilongis, at angustioribus. Stamina laciniis aequilongis. Capsula obovata, stylis tenuibus divaricatis coronata.

Flor. Julio, Augusto.

Hab. An trockenen und feuchten Plätzen der Hochalpen von 2000—2300 m, nicht selten, aber zerstreut (besonders auf Kalk und Dolomit). Auf dem Mt. Vergy bei Genf; Veltliner Alpen: Monte Codero bei Lecco, Monte Legnone, Val Sasina, M. Paralba, Val Visunza; Trientiner Alpen: Baldo. Tirol: Schleern, Grunsberg, Pusterthal, Kalkalpen bei Lienz; in den Salzburger Alpen sehr selten auf den Fuscher Tauern und der Gnadentalpe am Radstadter Tauern; auf dem Sulzbacher Gebirge in Untersteiermark und auf den meisten Alpen in Obersteiermark: Hochschwab, Wascheneck in Oberösterreich; Kärnten: Kühweg-Alpe, Berge bei Villach; in den Julischen Alpen: Jezerith-Alp. Siebenbürgen, Kroatien.

Icon. t. 108. *Planta florida*. 1. Folium. 2. Flos.

***Saxifraga planifolia* Lap. (S. muscoides All.)**

Sternb. rev. 28. suppl. II. 63. Haw. I. c. 35. Mor. I. c. 17. Ser. I. c. 24. Syn. S. muscoides All. II. ped. II. 70. S. tenera Sut. fl. helv. I. 245. Vill. fl. Dauph. III. 666. Don I. c. 410.

Dense caespitosa caudiculis brevibus, dense imbricato-foliosis, columniformibus, caulibus foliatis, 1—5-floris, cinereo-pilosis. Foliis linearibus, rotundato-obtusis, basi attenuatis, emortuis trinerviis, apice

cinereis. Floribus brevissime pedicellatis. Calycis laciniis tubo aequilongis, ovatis, obtusis. Petalis rotundo-obovatis, obtusissimis, leviter emarginatis, trinerviis, laciniis duplo longioribus. Stamina laciniis calycinis aequilongis.

Flor. Julio, Augusto.

Hab. Auf den höchsten Gipfeln der Hochgebirge in der Nähe des ewigen Schnees bei 2—3100 m Höhe. Auf den piemontesischen Alpen nicht selten: Mt. Cenis, graviers de Ronches, Eau Blanche. Savoien: Pointe aux Agneaux, Mont Vergy; auf den penninischen Alpen nicht selten: so im Val de Bagne, Col de la Fenêtre, oberhalb Zermatt, Mt. Cervin, Mte. Rosa; Berner Alpen: Faulhorn 2700 m; Glarner Alpen; Graubündtner Alpen: Senevedo, Piz Padella oberhalb Samaden; Veltliner Alpen; Tirol: Monte Baldo, Schleern, Brenner. Salzburg: in der Zwing, Nassfeld, Gamsgarkogl, Rathhausberg bei Gastein; Kärnthen: Katschthal; Oesterreich: auf dem hohen Priel.

Icon. t. 109. **Planta florida.** 1. Petalum. 2. Folium basale. 3. Folium caulinum.

Forma *S. citrina* Hegetschw.

Fl. de Schw. ed. II. p. 398. Petalis citrinis.

Hab. Zermatt, Monte Rosa.

Var. *S. Facchinii* Koch in Flora 1842. p. 624. Leybold in Flora 1855.

Caulibus 1—4-floris. Petalis obovato-cuneatis vel oblongis, basin versus attenuatis, integris vel emarginatis, latitudine calycis lacinias aequantibus, longitudine paullo superantibus.

Hab. Im südöstlichen Tirol: sehr häufig auf dem Plattekofl auf der Seiseralp, Rosengarten und Alpe Contria im Fassathal, Montalon im Val Sugana. (Dolomit.)

Icon. t. 110. **Planta florens.** 1. Petala et calycis lacinae. 2. Folium basale. 3. Folium caulinum.

Saxifraga Seguieri Spreng.

Nov. pl. cent. 40. — Sternb. suppl. II. 63. Haw. l. c. 36. — Mor. l. c. 16. Ser. l. c. 25. Syn. *S. angustifolia* Hall. fil. in Ser. herb. post. n. 289. *S. sedoides* Whlbg. fl. helv. 79 excl. plur. syn. DC. fl. fr. suppl. 518. excl. pl. syn. Don l. c. 408. pr. p. *S. planifolia* γ. *Seguierii* Sternb. rev. 28. Poll. fl. ver. II. 23.

Dense caespitosa, caudiculis brevibus, caulibus erectis, brevibus, supra brevissime pilosis, nudis vel unifoliis, 1—3-floris, pedicellis brevibus, floribus vix aequilongis. Foliis spathulato-lanceolatis, in petiolum ciliatum attenuatis, obtusis, integerrimis, emortuis 5—7 nerviis. Calycis laciniis ovatis, obtusiusculis, tubo brevioribus. Petalis oblongo-linearibus, laciniis angustioribus aequilongis vel eas paullo superantibus, trinerviis. Stamina laciniis aequilongis. Capsula obovata, stylis lacinias paullo superantibus coronata.

Flor. Julio, Augusto.

Hab. Auf den höchsten Alpen bei 2700—3200 m, in der Nähe des ewigen Schnees und der Gletscher. Schweiz; auf den penninischen Alpen: Mt. Gries, Mt. Nufenen, Mt. Cervin, Mt. Rosa. Zermatt. Col de la Fenêtre, Val de Bagne; auf den Lepontinischen Alpen: Simplon, Furca; St. Gotthardt; Berner Alpen: Rossboden, Wendenstock, Faulhorn, Aargletscher, Grimsel, Galenstock; Glarner Alpen; Rhätische Alpen: Albula, Val Surley, Scaletta, Piz Languard, Val di Fain, Tschüffer, Wormser Joch, Stilsfer Joch. Veltliner Alpen: Monte Legnone, Val Sasina und Trientiner Alpen: Monte Baldo, Val Sugana. Tirol: Ortles, Roskogel, Cima del Frate; Lienz und Karlsjoch bei Innsbruck.

Icon. t. 111. **Plantae floridae.** 1. Flos. 2. Calycis lacinia. 3. Petalum. 4. 5. Folia.

Saxifraga androsacea L.

Sp. l. 399. S. X. n. 3. Sp. II. 571. cod. 3112. Sternb. rev. 42. suppl. II. 64. Morett. l. c. 14. Don l. c. 106. Haw. l. c. 35. Ser. l. c. 24. Syn. S. lanceolata Kit. Add. l. c. 476. S. depressa Sternb. rev. 42. suppl. II. 64. Haw. l. c. 31. Ser. l. c. 24. S. tenera Sternb. rev. t. 96. excl. descr.

Caespitosa foliis basalibus atque inferioribus aggregatis, sessilibus, caulibus subnudis, sparse glandulosis pauci (1—3)-floris, rarius 5-floris. Foliis spatulatis vel obovatis, cuneatis, apice integris vel 3—5-dentatis, dentibus brevibus acutis, emortuis tantum 5—11 nerviis, margine ciliatis, apice glanduloso-ciliatis; foliis caulinis oblongo-lanceolatis. Calycis laciniis ovatis, obtusis, basi margineque glandulosis. Petalis obovatis-oblongis, trinerviis, apice emarginatis, superiore parte reflexis, calycis laciniis longitudineque duplo superantia. Staminibus laciniis aequilongis. Capsula obovata stylis laciniis superantibus coronata.

Flor. Junio, Julio.

Hab. An feuchten, steinigen Plätzen der Hochalpen, nicht selten am ewigen Schnee bei 1800 bis 3200 m Höhe (besonders auf Granit, Gneiss, Glimmerschiefer, Kalk, Dolomit). Seealpen; Savoier Alpen: noch auf den Dents d'Oche, Haut de Lin bei Abondance, Roc d'Enfer bei Biot: alsdann verbreitet durch die Schweiz, Tirol, Salzburg; die bairischen Alpen, Kärnthen, Krain, Steyermark, auf dem Schneeberg bei Wien; Karpathen: vom Choc und Rohac bis auf die Leiten, auf den siebenbürgischen Karpathen: Keriman, Arpas, Fogaras, Marmaros: Petrosa.

Forma S. pyrenaica Scop. fl. carn. 296.

Syn. S. androsacea β tridentata Gaud. Syn. Sax. in Meisn. Anz. 1818. p. 67. fl. helv. III. 115. Ser. l. c. 24. S. androsacea trifida Haw. l. c. 35. S. androsacea latifolia Sternb. suppl. 11.

Foliis obovato-cuneatis, in petiolum attenuatis apice tridentatis, rarius 5 dentatis.

Hab. Nicht selten mit der normalen Form, besonders an höher gelegenen Standorten.

Icon. t. 112. **Planta florida.** 1. Calyx. 2. Folium basale. 3. Petalum.

Saxifraga adscendens L.

Syn. S. tridactylites var. β alpina L. Sp. l. 404. fl. lapp. 173 excl. syn. Ponaë. S. petraea Gunn. fl. novo. Willd. Sp. II. 651. Godr. et Gren. fl. fr. I. 643. Hook. fl. Am. bor. I. 245. Torr. et Gr. fl. 574. S. hypnoides Scop. fl. carn. 296. S. rupestris Lap. abr. 233. S. Vahlî Ram. Pyr. ined. S. tridactylites L. β alpicola Mor. l. c. 25. Don. l. c. 441. S. controversa Sternb. rev. 43. Ser. l. c. 31. M. K. III. 162. S. ramosissima Schur in herb. Vindob. Tridactylites petraea Haw. l. c. 22.

Tota brevibus pilis glanduliferis obsita, viscidula. Caulibus erectis, e medio vel e basi ramosis corymbosis, ramis erectis. Foliis basalibus confertis caulinis sparsis, cuneatis, ad basin utque sensim attenuatis, apice rotundatis vel truncatis, 3—5 lobis, lobis subaequantibus oblongis vel ovatis, obtusiusculis vel acutiusculis; prophyllis trilobis, aut oblongo-linearibus. Pedunculis anthesi calyce brevioribus. Calycis glanduloso-pilosi tubo campanulato per anthesin laciniis oblongis aequilongo. Petalis calycis laciniis duplo longioribus, cuneatis, emarginatis, subquinqnerviiis. Capsula ovato-globosa truncata plerumque pedunculo paullo brevioris suffulta.

Flor. Junio, Julio.

Hab. An feuchten, steinigen Plätzen und Felsen der alpinen und subalpinen Region der Hochgebirge von 1000—2000 m nicht selten, aber zerstreut. (Kalk, Granit, Gneiss, Glimmerschiefer, Chloritschiefer.) Apenninen. Seealpen, Savoier Alpen, Schweiz, Tirol, selten in den Salzburger Alpen, häufiger in Kärnthen, Steyermark, auch am Schöckel nächst Graz, Niederösterreich. Ungarn: auf dem Strašov

im Comit. Trenczin, Rodsudec, Salatin, der Fatra, Choč; Liptauer Alpen häufig. Tatra, Zipser Alpen. Im Bihariagebirge. Murany im Comit. Gömör, Domugled und im Banat auf dem Szarko. In Siebenbürgen bei Sekelykö, auf dem Thorda, bei Kronstadt. Kroatien, Dalmatien, Bosnien: Wlassich etc.

Icon. t. 113. *Planta florens*. 1. Flos. 2. Petalum. 3. Folium caulinum.

***Saxifraga tridactylites* L.**

Sp. I. 404. S. X. n. 25. Sp. II. 578. cod. 3169. Sternb. rev. 41. suppl. II. 88. Don I. c. 441 excl. var. β . Ser. I. c. 35. Syn. S. trifida Gilib. II. lith. V. 181. Ej. exerc. phytol. I. 314. S. annua Lap. fl. pyr. 53. *Tridactylites annua* Haw. I. c. 21.

Planta annua, tota pilis brevibus glanduliferis obsita, viscidula. Caulibus erectis vel adscendentibus curvatis, simplicibus vel e basi ramosis, ramis erectis. Foliis basalibus confertis, spathulatis indivisis vel cuneatis profunde trilobis lobo medio majore, caulinis sparsis, medio subito attenuatis, 3—5 lobis, lobo medio lateralibus oblongis vel linearibus acutiusculis majore; prophyllis trilobis vel integris, summis linearibus, obtusis. Pedunculis anthesi floribus duplo vel plus longioribus, arcuato erectis. Calycis glanduloso-pilosi tubo campanulato, per anthesin laciniis aequilongo, fructifero basi paulum attenuato laciniis triplo longiore. Petalis laciniis calycinis duplo longioribus, obovato-cuneatis, trinerviis. Capsula ovata, pedunculo multo longiore suffulta.

Flor. Apr.—Jun.

Hab. Auf feuchten, sandigen Aeckern und Brachen, auf nicht allzu nassen, torfigen Wiesen und Ackerland mit torfigem Boden nicht selten und stellenweis grosse Strecken bedeckend. Im hügeligen und ebenen Deutschland nördlich von den Alpen, auch bei Botzen. Ungarn: im mittellungarischen Bergland am Rand des Bihariagebirges bei Grosswardein. Siebenbürgen; Dalmatien; Bosnien. Litthauen, Polen.

Icon. t. 114. *Planta florida*. 1. Flos. 2. Folium caulinum.

***Saxifraga petraea* (Pona) L.**

S. X. n. 25. E. Sp. II. 578 cod. 3170. Mor. I. c. 22. Don. I. c. 443. Sternb. suppl. II. 88. Ser. I. c. 34. Syn. S. alba petraea Pona bald. apud Clus. hist. 2. p. 337. S. Ponae Sternb. rev. 47. Poll. fl. ver. I. 31 excl. syn. S. geranioides Host. Synops. 231. S. rupestris Willd. Sp. II. 653. S. bianca Calecl. It. 12.

Pilis mollibus tota planta plus minusve dense obsita, vel glabra. Caulibus adscendentibus, saepius e basi ramosis ramis decumbentibus, flaccidis. Foliis basalibus rosulam hibernantem efformantibus. Atque inferioribus caulinis palmato-trifidis laciniis oblongis, obtusiusculis vel subtrifidis basi reniformibus petiolo longiore, semiterecti, canaliculato, basi vaginante petiolatis, superioribus in petiolum aequilongum cuneatim attenuatis; prophyllis sessilibus, basi cuneatis, trifidis lobis acuminatis aut integris, late lanceolatis. Floribus longe pedicellatis. Calycis laciniis obtusis, tubo obconico anthesi longioribus, in fructu brevioribus. Petalis obovato-cuneatis, valde emarginatis, 3—5 nerviis, laciniis quadruplo, staminibus duplo longioribus. Capsula ovata, laciniis erecto-patentibus coronata. Seminibus fusiformibus, angulosis, minute tuberculatis.

Flor. Junio, Julio.

Hab. In Höhlen und an schattigen Plätzen von Kalkgebirgen bis zu 2000 m. Auf den südlichen und südöstlichen Voralpen. Hügel von Brianza am Comer See: Erba, Corni di Canzo etc. Südtirol: am Monte Baldo, im Val Stagno bei Bassano, Ponte di Cividale, Buco del Piombo. Krain: Krainburg, am rechten Saveufer bei Portschenweissern, im Jschkathal bei Laibach, an der Planinaböhle,

Caporetto, Sotcha, am Predil etc. Istrien: St. Canziano bei Triest. Croatien: an der Korana und Sluinica, bei dem Schloss von Shin; an den Plitvice-Seen. Ungarn: auf der Voralpe Ohuisto im Liptauer Comit. at.

Icon. t. 115. *Plantae floridae apex*. 1. Flos. 2. Folium basale. *Planta tota*.

***Saxifraga granulata* L.**

Sp. I. 403. Fl. succ. I. n. 350. Sp. II. 576. cod. 3162. Sternb. rev. 16. suppl. II. 86. Mor. I. c. 28. Don. I. c. 362. Haw. I. c. 22. Ser. I. c. 35. Syn. s. *rotundifolia alba* Baul. Pin. 309. Erndt Virid. warsow. 109. S. *alba* Dod. Pempt. 316. S. *corymbosa* Luce Fl. osil. 137. S. *earnosa* Luce I. c.

Caulibus adscendentibus vel erectis, molliter hirsutis, supra glanduloso-viscosis, parce foliosis plerumque subtus ramosis, laxè paniculatis. Foliis pilosis, in axillis bulbillos gerentibus, reniformibus, inciso-lobatis, lobis vel integerrimis vel crenatis, in petiolum hirsutum basi dilatatum decurrentibus; bulbillis subglobosis cataphyllis scariosis longissime ciliatis obtectis. Foliis caulinis subsessilibus, cuneiformibus, 3—5-fidis; prophyllis linearibus. Pedicellis calycibusque glandulosis. Calycis laciniis tubo ovato longioribus, lineari-oblongis, obtusis. Petalis laciniis triplo longioribus obovato-oblongis, basi valde attenuatis, trinerviis nervis lateralibus bifurcis vel trifurcis. Capsula ovata, stylis aequilongis erecto-patentibus laciniis calycinas superantibus coronata. Seminibus oblongis, subfusiformibus, tuberculatis.

Flor. Maio, Junio.

Hab. Auf Wiesen, Triften, in Gebüsch, an Dämmen in der Ebene und dem Vorgebirge verbreitet, stellenweise ins Hochgebirge emporsteigend. In den Vogesen, spärlich auf dem Jura und in der Schweiz; desgleichen im südlichen Deutschland, noch sehr selten in Salzburg, Steyermark, Oesterreich und Mähren, sehr verbreitet in Mittel- und Norddeutschland. In Ungarn nur zerstreut im Trencziner, Liptauer und Zipser Comit. at; dann erst wieder in Syrmien, Bosnien. In Litthauen, Polen: Warschau.

Icon. t. 116. *Planta florida*. 1. Flos franss. 2. Petalum.

***Saxifraga bulbifera* L.**

Sp. I. 403. S. X. n. 21. Sp. II. 577. cod. 3163. Sternb. rev. 15. suppl. II. 86. Don I. c. 363. Haw. I. c. 23. Mor. I. c. 27. Ser. I. c. 36. Syn. S. *granulata* Poll. fl. veron. II. 29. S. *vivipara* Vest in Flora 1820. vol. II. 405. S. *veronicaefolia* Pers. ench. I. 489. Bert. amoen. ital. 361.

Caulibus erectis simplicibus, foliosis, apice dense cymosis, pauci-(5—7)floris, breviter pilosis. Foliis axillis bulbillos carnosos gerentibus, basalibus petiolo lamina triplo longiore piloso petiolatis, reniformi-subrotundis, lobato-crenatis, lobulis medio excepto valde obtusis, caulinis inferioribus ovatis, in petiolum brevem attenuatis, superioribus sessilibus, inciso-lobatis, lobulis minus obtusis, summis trilobis, lobo medio lateralibus duplo longiore, acutis vel indivisis, lineari-lanceolatis. Pedicellis floribus vix longioribus. Calycis breviter pilosi laciniis ovatis, obtusis. Petalis oblongo-obovatis laciniis atque staminibus duplo longioribus. Capsula subglobosa.

Flor. Maio, Junio.

Hab. Auf trocknen, sandigen Weiden und grasigen Hügeln zerstreut, meist die *S. granulata* L. ersetzend, im mittleren und südlichen Europa, fehlt im westlichen und nördlichen. Oberitalien: von Toscana an verbreitet, bei Bologna, Mantua, Verona etc. Schweiz: im Unterwallis sehr selten bei Branson und Genoz. In Untersteiermark: Marburg, Pettau, Wurmberg, Neuhaus, Studenitz; in Niederösterreich: sehr häufig bei Wien. Nicht selten in Mähren: Bysterz bei Brünn etc.; zerstreut in Ungarn: im mittell-ungarischen Bergland bei Erlau, in der Matra, am Rande des Bihariagebirges und bei Grosswardein, im

Banat; in Slavonien; Siebenbürgen: Kronstadt. Kroatien; nicht selten in Dalmatien. Rumelien: auf dem Peklen bei Ipek.

Icon. t. 117. *Planta florida.* Fl. los. 2. eadem transs. 3. Petalum.

***Saxifraga cernua* L.**

Sp. I. 403. S. X. n. 22. Fl. suec. II. n. 373. Sp. II. 577. cod. 3164. Sternb. rev. 18. suppl. II. 30. Don I. c. 364. Ser. I. c. 36. Syn. S. bulbifera Gunn. fl. norv. No. 1006. (?) S. sibirica Torr. et Gr. fl. 573. (?) S. Cymbalaria Torr. et Gr. fl. 574. *Lobaria cernua* Haw. l. c. 20.

Caulibus erectis vel curvatis, adscendentibus, simplicibus, rarius subramosis, villosis, rarius subtus glabris, apice unifloris. Foliis glaberrimis, bulbillos cataphyllis scariosis ovato-lanceolatis obteetos gerentibus, basalibus atque inferioribus caulinis reniformibus palmato-5—7 lobis, petiolo longo, basi paulum dilatato villosa suffultis, mediis brevius petiolatis, caulinis in axillis bulbillos purpureos gerentibus, superioribus sessilibus, plus minusve cuneatim attenuatis, trifidis, lobis ovatis, obtusis vel acutis, rarius transverse latioribus, obtusissimis, summis lanceolatis vel ovato-lanceolatis, rarius ovatis integris. Pedicellis glanduloso-villosis, floribus longioribus. Calycis laciniis oblongis, obtusiusculis. Petalis obovato oblongis, cuneatis, apice emarginatis, trinerviis, lacinia duplo superantibus. Stamina laciniis paulo longioribus. Capsula ovato-globosa, rarissime evoluta stylis erectis.

Flor. Junio, Julio.

Hab. In der alpinen Region der Hoehgebirge. Piemont. In der Schweiz selten: Saaxen im Wallis; oberhalb Lenz in den rhaetischen Alpen; im italienischen Tirol: Padon in Livinalongo; Kärnthen: am Schober, Grossfraganteralpe am Wall im Möllthal. Steyermark: auf einem Gipfel des Eisenbuts; in den Karpathen: auf dem Czerwony Wierh, im Swistówkathal bei Zakopane, auf der Dzeameanie der Rodnaer Alpen.

Forma ramosa Gmel.

Fl. sib. IV. 163. Gunn. fl. norv. n. 528. Don. I. c. 364. Mor. I. c. 28. Sternb. rev. Ser. I. c. Syn. S. cernua β pauciflora Sternb. suppl. II. 30.

Caulibus supra ramosis, bulbillis superioribus in ramos evolutis; foliis ramorum in axillis foliorum bulbillos gerentibus; ramis bulbillis aut floribus solitariis terminatis.

Hab. Kärnthen: Grossfraganteralp.

Icon. t. 118. *Planta florida.* 1. 2. Folia caulina. 3. Bulbilli.

***Saxifraga rotundifolia* L.**

Sp. I. 401. S. X. n. 19. Sp. II. 576. cod. 3161. Sternb. rev. 17. suppl. II. 15. Don I. c. 360. Ser. I. c. 43. Syn. Geum rotundifolium Moench. Miscopetalum rotundifolium Haw. l. c. 323. en. 16.

Scapis erectis, remote foliosis e medio vel supra paniculatis, rhizomate crassiusculo. Foliis crassiusculis, basalibus atque inferioribus petiolo quadruplo-duplo longiore suffultis, reniformibus, basi cordatis, inaequaliter atque grosse crenatis vel dentatis; foliis caulinis superioribus fere sessilibus, basi obtusis vel cuneatis, lobis plus minusve inciso-dentatis, prophyllis linearibus, minimis. Floribus pedicellis teneris longioribus pedicellatis. Calycis tubo brevissimo laciniis oblongo-triangularibus, acutis. Petalis oblongis, vel oblongo-ellipticis, laciniis triplo longioribus, trinerviis, infra medium flavo —, supra medium purpureo-punctatis, raro omnino albis. Capsula oblonga, stylis brevibus divergentibus coronata. Seminibus oblongis, tuberculorum minorum seriebus instructis.

Flor. Junio, Julio, Augusto.

Hab. An etwas feuchten und schattigen Plätzen in der subalpinen Region, besonders auf Granit, Gneiss, Kalk, Dolomit, Glimmerschiefer.

Forma vulgaris.

Caulibus multifloris, subtus hirsutis, pedunculis pedicellisque glanduloso-hirsutis. Foliis crassiusculis, petiolo hirsuto suffultis, utrinque sparse hirsutis, sinu apertissimo cordatis, inaequaliter atque grosse crenatis vel dentatis. Petalis punctatis.

Hab. Auf der ganzen Jurakette, in den Vogesen verwildert. Häufig durch die ganze Alpen- und Voralpenkette: Seealpen, Schweiz, Tirol, Salzburg, bairische Alpen, Kärnthen, Krain, Kroatien, Istrien, Steyermark, Niederösterreich. In den Karpathen zerstreut: Kl. Krivan, Rozsudec, Choč, in den Central-karpathen nur im Dreischhäuschen, selten im Bihariagebirge. Banat: Domugled und Herculesbäder. Siebenbürgen: Arpás, Fogaras. Dalmatien, Montenegro; Bosnien.

Var. glandulosa Griseb.

Speil. fl. Rumel. I. 336. Syn. S. Heuffelii Schott. Anal. 28. S. angulosa Schott. l. c. 29. S. lasiophylla Schott. l. c. 29. Caulibus elatis, glanduloso-pubescentibus. Foliis basalibus obtuse crenatis, caulinis inciso-dentatis; ramis panicula effusa multifloris.

Hab. Istrien: Monte Maggiore. Kroatien: auf dem Velebit, Rumelien: am Peristeri von 1500 bis 2000 m.

Var. S. repanda Willd.

In Sternb. rev. Syn. S. rotundifolia β hirsuta Sternb. suppl. II. 16. Miscopetalum rotundifolium β repandum Haw. l. c. 17. Caulibus glanduloso-pubescentibus, panicula pilis glanduliferis dense obtecta. Foliis pilis densioribus canescentibus, repandis, crenis obtusis, breviter apiculatis vel non apiculatis, caulinis obtuse crenato-dentatis, haud incis.

Hab. Istrien: auf dem Monte Maggiore. Banat: Mehadia.

Icon. t. 119. *Saxifraga rotundifolia* L. *Plantae floridae apex*. 1. Rhizoma. 2. Petalum. 3. Flos. 4. Stamen. 5. Fructus.

Icon. t. 119a. Var. *glandulosa* Griseb. = S. Heuffelii Schott.

***Saxifraga arachnoidea* Sternberg.**

Rev. 23. Morett. l. c. 28. Ser. l. c. 34. Syn. S. sibirica Sternb. it. rhaet. 60. Poll. fl. ver. II. 30. *Lobaria arachnoidea* Haw. l. c. 20.

Pilis longissimis villosis, arachnoideis tota dense obtecta, partibus magis vetustis exceptis, caulibus procumbentibus, ramosissimis, foliosis. Foliis inferioribus subrotundo-obovatis, in petiolum acquilongum attenuatis, antice obtusissimis, 3—5 lobis, lobis brevissimis, obtusis; superioribus atque prophyllis ovatis vel ovato-ellipticis. Calycis laciniis ovatis acutis. Petalis ovatis, laciniis duplo, staminibus paullo longioribus.

Flor. Julio, Augusto.

Hab. In Höhen und an schattigen Felsen der Dolomitgebirge bei 300—1000 m Höhe. Südtirol: in den Val di Ledro-Alpen, im Val Ampola zwischen dem Lago di Ledro und Storo; am Monte Tombea, im Val di Lorina; im Val Vestino.

Icon. t. 120. *Planta florida*. 1. Flos. 2. Petalum. 3. Calyx. 4. Folium basale. 5. Folium caulinum.

Saxifraga nivalis L.

Sp. I. 401. S. X. n. 10. Fl. suec. II. 368. Sp. II. 573. cod. 3156. Sternb. rev. 12. suppl. II. 16. Don. I. c. 387. Ser. I. c. 38. Syn. S. longiscapa. Don. I. c. 388. Ser. I. c. 38. Sternb. suppl. II. 47. S. pauciflora Sternb. suppl. I. p. 6. S. punctata Rottb. act. hafn. 10 p. 445. S. primulaefolia Willd. herb. 8399. S. nigricans Fisch. in Willd. herb. 8399. Dermasea nivalis Haw. I. c. 9.

Rhizoma teretiuseculum, obliquum, scapo nudo adscendente vel leviter curvato, pilis brevibus, nonnullis glanduliferis intermixtis obsito, simplici, rarius apicem versus ramoso, corymboso-paniculato. Foliis basalibus rosulatis, subrotundo-ovatis aut oblongo-ovatis, in petiolum subaequilongum dilatatum attenuatis, glabris, margine subvillosis, grosse crenatis vel dentatis, junioribus sparse pilosis, subsessilibus, marginis inferiore parte inflexis. Bracteis oblongis, apice dentatis vel integris, obtusis. Floribus brevissime pedicellatis vel subsessilibus congestis. Calycis subglabri laciniis ovatis, obtusiusculis. Petalis oblongis, laciniis paullo tantum longioribus. Capsula ovato-oblongo, stylis brevissimis coronata. Seminibus oblongis, fusiformibus, minutissime tuberculatis.

Hab. Vereinzelt im Riesengebirge: am Basalt der kleinen Schneeegrube.

Icon. t. 121. **Plantae floridæ.** 1. Flos. 2. Folium basale.

Saxifraga hieracifolia W. et K.

Pl. rar. hung. I. 17. Don. I. c. 383. Sternb. rev. 9. suppl. I. 5. suppl. II. 13. Ser. I. c. 39. Syn. S. nivalis rar. racemosa Towns. it. hung. 486. S. plantaginifolia Hook. in Torrey's Voy. app. 394. S. rigida Chr. Sm. in herb. DC. S. uliginosa Fisch. in litt. 1829. Micranthes hieracifolia Haw. en. 45. Micranthes hirta Haw. en. 46. (?) Hermesia spicata Hoppe Taschenb. 1800 p. 209.

Rhizoma crassum radicibus fibrosis, scapo erecto, nudo, substriato, breviter piloso, racemoso, racemo basi subcomposito. Foliis fere omnibus basalibus, ovato-oblongis vel oblongis, remote atque repando-dentatis, in petiolum aequilongum basi dilatatum semi amplexicaulem attenuatis, obtusiusculis, supra glabris, margine atque subtus villosis; bracteis inferioribus oblongis vel oblongo-lanceolatis, apice tridentatis, superioribus linearibus, integris, ramos floriferos superantibus. Ramis 3—6 floris pedicellis floribus aequilongis vel brevioribus. Calycis laciniis ovatis, obtusis, patentim reflexis. Petalis ovatis, acutis, laciniis calyceinas aequantibus. Capsula ovato-globosa, ventricosa, stylis brevissimis divaricatis coronata.

Flor. Junio, Julio.

Hab. Obersteiermark: an der Wand oberhalb der Putzenthaler Seen bei Schladming, am Reichart, Hochwart, Lantscher Alpe. Nicht selten in den Karpathen: Liptau-Sohler Alpen: Djumbier und Kunstava; Choč, Rohak; Tatra: Pisna, Ornok, Raczkowa, Gewont, Mengsdorfer Thal, Thörichtergern, Durlberg, Scopapass, Kesmarker Leiten, am Langen See, am Weissen See etc. In den siebenbürgischen Karpathen: Dzeameanie, Stol, Rodnaer und Bistritzer Alpen.

Icon. t. 122. **Planta florida.** 1. Petalum et calycis lacinia.

Saxifraga Hostii Tausch.

Syll. soc. Ratish. II. 240 (1828). Neilr. Fl. v. N. Oe. II. 659. Syn. S. longifolia β media Sternb. rev. 1 (1810). Ser. I. c. 19. S. lingulata β media Don. I. c. 391. S. longifolia Host. fl. aust. I. 499. S. Besleri Sternb. suppl. II. 52. S. elatior M. K. Deutschl. Fl. VII. 115. (?) Chondrosea intermedia Haw. I. c. 11.

Caespitosa. Caulibus erectis, crassiusculis, pilis glanduliferis hirsutis, superne paniculatis, ramis elongatis nudis, pilis glanduliferis dense obsitis, apice corymbosis, 5—9-floris. Foliis basalibus numerosis,

erectiusculis lingulatis, apice obtusis, basi ciliatis, secundum marginem multiporosum crenulatis, crenis truncatis, foliis caulinis oblongis, obtusiusculis, crenato-serratis, bracteis atque prophyllis oblongo-linearibus, glanduloso-ciliatis. Pedicellis dense atque breviter glandulosis. Calycis laciniis ovato-triangularibus, obtusis, cartilagineo-marginatis. Petalis oblongis vel obovato-oblongis, laciniis duplo longioribus, trinerviis, albis aut ultra medium punctis purpureis notatis. Capsula ovato-globosa stylis brevioribus atque laciniis calycinis erecto-patulis coronata.

Flor. Julio, Augusto.

Hab. Apenninae: Pizzo d'Uccello, Giova Bruciana. Seealpen: Col di Tenda. An der Grenze der Lombardei und Graubündtens: am Fusse des Umbrail bei Bormio, M. Guilielmo bei Brescia. Im südöstlichen Tirol am Monte Pavione in Val Sugana und Primiero, Valle in Cadore. Venetien: im Gebiet von Feltre, auf der Grappa bei Bassano und bei Ponteba. Krain: in der Wochain, Poresenalp. Zhernapost, im Isouzthal hinab über Caporetto bis zum Tarnowaner Gebirgsstock bei Goerz. Kärnthen: am Plecken und auf den Karawanken (besonders auf Dolomit und Kalk).

Var. *S. rhaetica* Kerner.

Foliis basalibus lineari-lingulatis, apice acutiusculis, parte inferiore attenuatis, sed basilata sessilia, margine crenatis crenis longioribus angustissimis, laud reflexis, remotiusculis itaque squamulis calcareis vix cohaerentibus, dente terminali regulariter triangulari. Petalis obovato-oblongis, ultra medium punctis numerosis purpureis notatis.

Hab. Sehr häufig auf dem Ortlerstock, namentlich auf der Dopreta, am Anstieg zum Hochleiten oberhalb Trafoi und im Suldener Thale.

Icon. t. 123. **Planta florida.** 1. Flos. 2. Petalum. 3. Folium caulinum.

Saxifraga Geum L.

Sp. I. 401. S. X. n. 11 Sp. II. 574. cod. 3155. Syn. *S. hirsuta* L. γ Geum Walk. Arn. et Ser. l. c. 42. *S. Geum* Sternb. rev. 15. suppl. II. 4. Don. l. c. 349. *S. umbrosa punctata* Smith Engl. Fl. I. 263. *Robertsonia Geum, hirsuta, punctata* Haw. en. 53, 54, 55.

Caudiculis sublignosis, caulibus subundis, erectis, glanduloso-hirsutis, supra paniculatis, ramis 3—6-floris, pedicellis tenuibus, floribus longioribus. Foliis reniformi-cordatis, margine cartilagineo crenatis crenis aequalibus excepta summa in apice brevior, utrimque, imprimis subtus hirsutis, petiolis triplo quadruplo longioribus supra canaliculatis petiolatis, prophyllis lineari-oblongis. Calycis laciniis oblongis, obtusis. Petalis ovato-oblongis, laciniis duplo longioribus. Staminibus petalis paullo longioribus. Capsula oblongo-ovata, stylis brevibus, paullo divaricatis coronata.

Flor. Maio, Junio.

Var. *S. polita* (Haw.) Lk.

Folia glabra, nitida, subrotunda, basi cordata, crenata, crenis obtusiusculis.

Hab. In Gärten, verwildert bei Steyr. Auf dem Hoheneck in den Vogesen naturalisirt.

Var. *S. dentata* Lk. en. 413.

Syn. *S. hirsuta* L. S. X. n. 12. Sp. II. 574 cod. 3153. Don. l. c. 351.

Folia glabriuscula vel hirsuta, orbicularia, acute serrata; petiolis paulum longioribus, angustis, supra plenis, margine et subtus longe pilosis. Petala alba, uno puncto luteo vel etiam pluribus purpureis notata.

Hab. Auf niedrigen Kalkgebirgen.

Icon. t. 124. **Planta florida:** S. Geum L. 1. 2. Flos. 3. 4 Capsula.

Icon. t. 125. **Planta florida:** S. Geum var hirsuta. 1. 2. Flos. 3. 4. Capsula.

Saxifraga luteo-viridis. Schott et Kotschy.

Syn. S. tecta Kit. Addit. ad fl. Hung. ed. Kanitz in Linnaea XXXII. 473. S. luteo-purpurea WK. in Schult. I. 637. Baumgart. Transsylv. I. 372. Sternb. rev. p. J. (pr. p.) suppl. I. 2. in observ. S. luteo-purpurea var. Herb. select. 12. S. transsylvanica Willd. herb. n. 8384. S. Lapeyrousii Herb. stirp. 35 nec. Don.

Dense caespitosa caudiculis lignosis. Caulibus floriferis erectis, foliosis, pilis glanduliferis dense hirsutis, supra cymoso-paniculatis. Foliis basalibus imbricatis, explanato-depressis, spathulato-lingulatis, apice acutis vel obtusis, margine anguste cartilagineis, inferne ciliatis, juxta marginem 7—9—11 fovearum serie notatis; foliis caulinis spathulatis, excepta parte apicali glabra cartilaginea utrimque viscido-hirsutis, summis atque prophyllis linearibus. Pedunculis calyceibusque viridibus, dense glanduloso-strigosis. Petalis rectis, cuneato-obovatis, 3—5 nerviis, calycis laciniis lanceolatas dimidio superantibus. Stamina petalis paullo brevioribus. Capsula ovata, stylis brevissimis coronata. Seminibus ovato-triquetris, rugosis.

Flor. Junio, Augusto.

Hab. Auf Kalkgebirgen in einer Höhe von 1500—2300 m. Siebenbürgen: Szusul bei Hermannstadt, Piatra nari, Keriman, Butsets, Arpas, Marmaros, auf den Rodnaer Alpen: Fogaras, Czukas, Strunga, Obersi, Königstein, Csiblesz, Arsul und über Kirlibaba durch die Bucovina.

Icon. t. 126. **Planta florida.** 1. Petalum et stamen. 2. Flos transsectus. 3. Folium caulinum.

Saxifraga carpathica Rchb.

Fl. germ. exc. 552. Sternb. suppl. II. 32. Syn. S. sibirica Wahlbg. fl. carp. 121. S. rivularis Rochel pl. exs. Baumg. fl. transs. I. 383. Host. fl. austr. I. 504. Zaw. Gal. 51. Towns. it. hung. 487 et 346. Genersich cat. scepus. No. 128. S. bulbifera Geners. elench. pl. scep. a. 373.

Caulibus erectis vel adscendentibus, villosulis aut inferne glabris, simplicibus, 1—3-floris, oligophyllis. Foliis cum petiolis glabriusculis; foliis basalibus et caulinis inferioribus cordato-rotundis vel reniformibus, palmato- 5 lobis, petiolo longo basi dilatato petiolatis; caulinis superioribus trifidis, summis ovalibus vel lanceolatis, integris, lobis foliorum ovatis vel subrotundis obtusis vel acutis. Floribus breviter pedicellatis. Calycis laciniis oblongis, obtusiusculis, serius obtusis. Petalis obovatis-oblongis, trinerviis, laciniis calycinis duplo longioribus. Capsula ovata, stylis brevibus divaricatis coronata.

Flor. Julio, Augusto.

Hab. In Felsritzen und unter Steinblöcken an feuchten Stellen der Knieholzregion und darüber hinaus bei 1500—2000 m Höhe. Karpathen: Liptauer Karpathen: Djumbier, Raczkowa, Rohač, Pisna, Kosielsko, Gewont, Czernahora; Centalkarpathen: Kriwan, Lomnitzerspitze, Kohlbadthal, Trichtersee, grüner See, grosser polnischer Fischsee, Belkaer Spitze etc. Zipser Alpen: Leiten, Drechselhäuschen: Petrosa i. d. Marmaros; in den siebenbürgischen Karpathen: Dzeameanie, Rodna, Arpaseh, Obersi.

Icon. t. 127. **Planta florida.** 1. Flos. 2. Petalum. 3. Folium basale.

Zahlbrucknera Rchb.

Torus sentelliformis, ovario connatus. Calycis lacinae 5, oblongae, petalis paulum latiores et longiores. Petala viridia et non distincte articulata, in alabastro imbricata. Stamina 10, laciniis paullo

breviora, filamentum subuliforme, anthera cordata, basi biloba. Ovarium biloculare, styli 2, parvi, divaricati, stigmatibus capitata. Capsula foramine dehiscens. Semina oblonga, pusilla, rugosa. Herba parva caule terete, foliis longe petiolatis, cordiformibus vel nephroideis, 5—7 lobatis tenuibus, floribus parvis, viridibus capillare pedicellatis.

Zahlbrucknera paradoxa Rchb.

Planta biennis, 8—15 cm longa. Caule procumbente, remote folioso. Foliis inferioribus longe petiolatis, cordato-reniformibus, 5—7 lobatis lobis obtusis vel breviter acuminatis, superioribus 3 lobatis. Floribus postremo longissime pedicellatis, solitariis, semiinferis. Petalis linearilanceolatis, acutis, calycis laciniis angustioribus brevioribusque, viridibus.

Flor. Julio, Augusto.

Hab. An feuchten Felsen und Bächen. Bevorzugt überhängende Gneisplatten, in deren Höhlungen sie bis in die finstersten Winkel hinein gedeiht. Ostalpen. Kärnten: Lavantthal zwischen Woltsberg und Wiesenau; Steyermark: Schlucht bei Deutschlandsberg am Fusse der Koralpe, der Sallagraben und dessen Nebengraben am Fusse der Stupalpe, ein Graben bei Lägist, Gamisgraben bei Stainz und der Tonale an der Grenze zwischen Tirol und der Lombardei.

Leon. t. 128. **Planta florida.** 1. Flos.

Chrysosplenium Trn.

Plantae tenues carnosae, interne sparse pilosae, rhizomate repente, caulibus erectis vel ascendentibus angulosis. Folia alterna vel opposita, subrotundo-reniformia, inferiora longe petiolata, superiora subsessilia, sine stipulis. Flores subsessiles; Calyx semisuperus, 4 partitus, flore primo saepe 5 partitus. Corolla nulla. Stamina 8, erecta, pulvinari disciformi lobato luteo inserta. Capsula unilocularis polysperma birostris post dehiscentiam tota aperta, placenta basilari brevissima. Styli 2. Semina nitida.

Chrysosplenium alternifolium L.

Engl. Bot. 34. Fl. D. 366. Sturm I. 12. Schk. 108.

Laxe caespitosa, caulibus 3 angulosis, 0,15 m altis. Foliis inferioribus subrotulatis, omnibus alternis, reniformibus, profunde crenatis, crenis latis, truncatis, floralibus flavido-viridibus. Bracteis floralibusque luteis.

Flor. Martio et Aprile.

Hab. An Quellen, Bächen, unter Gebüsch, in Erlenbrüchen, feuchten Laubwäldern, sumpfigen Stellen; häufig.

Leon. t. 129. **Planta florida.** 1. Flos transsectus. 2. idem superne visus. 3. Fructus. 4. Semen transsectum.

Chrysosplenium oppositifolium L.

Engl. Bot. 490. Fl. D. 365. Sturm I. 4.

Caulibus 4 angulosis, 5—10 cm altis, foliis oppositis, semiorbiculatis, basi truncatis, plano-vel repando-crenatis, obscure viridibus.

Flor. Majo, Junio.

Hab. Ebenfalls an Quellen, Waldbächen, feuchten, schattigen Stellen. Seltener als vorige.

Leon. t. 130. **Planta florida.** 1. Flos a latere visus. 2. idem defloratus. 3. Fructus.

Parnassia Trn.

Plantae acaules glabrae, foliis inferioribus longe petiolatis, cordato-reniformibus. Flores magni, albi vel flavescentes. Calyx 5 sepalus, corolla 5 petaloidea. Stamina 5 sepalis anteposita, squamae 5 radiatae radiis capitellatis petalis antepositae. Ovarium superum vel semiinferum uniloculare, 4 placentis parietalibus, multis gemmulis libratis atropis patentibus. Capsula 4 valvis. Semina testa reticulata laxissima, embryo magnus.

Parnassia palustris L.

Engl. Bot. 82. Fl. D. 584. Schk. t. 86. Gärtn. 1. t. 60. f. I. Sturm D. Fl. 13. Hayne Arzng. H. t. 42. Sv. Bot. t. 172. Hook. Fl. Lond. t. 1.

Nectariis 9—13 radiatis, petalis brevemente unguiculatis, foliis radicalibus cordatis, caulino cordato-amplexicauli.

Flor. Julio, Augusto.

Hab. Nasse Wiesen, trockne Gypsberge, Moorwiesen, bis in die hohen Alpen.

Icon. t. 132. **Planta florens.** 1. Flos superne visus. 2. idem transsectus. 3. Fructus. 4. Staminodium fimbriatum. 5. Semen.

Parnassia alpina.

Probabiliter forma alpina Parnassiae palustris L.

Icon. t. 134. 1. **Planta florens.** 2. Flos superne visus. 3. idem transsectus. 4. Staminodium fimbriatum. 5. Fructus.

ADOXACEAE.

Herbae perennes, rhizomate. Folia caulina 2 opposita. Flores hermaphroditi 5—7 in glomerulo, perianthium simplex. 4—6 merum. Stamina fissa cum 8—12 antheris unilocularibus. Carpellis 3—5 (raro 2) ante perianthii lacinias insertis et cum staminibus duplicibus alternantibus, ovarium semiinferum constituentibus. Styli liberi 3—5. Ovarii loculi seminibus pendulis. Drupa 1—5 pyrena; embryo parvus in endospermio magno.

Adoxa L.

Floribus terminalibus 5 meris, lateralibus 4 meris. Stamina 4—5, fissa, ante corallae incisuras inserta. Styli 4—5, stigmata capitata. Drupa 4—5 pyrena.

Adoxa Moschatellina L.

Fl. dan. 94. Schk. t. 109. Gärtn. t. 112. Engl. Bot. 453. Sv. Bot. 435.

Caulis 8—10 cm altus. Rad. tuberosa, alba, herba tenera fugax; foliis rad. longe petiolatis, ternato-bipinnatis, foliolis crassiusculis obovato-rhombeis, extimis trifidis incis; caulina 1—2 ternata

aut simplex tripartitum incisum. Flores 4—6 in capitulo, virides moschodori, terminalis quadrifidus bibracteatus laterales subquinquefidi tribracteati, pyrenae margine complanatae, laeves.

Flor. Aprile, Majo.

Hab. In schattigen Vorhölzern, an Zäunen; Erlengebüsch; nicht selten.

Leon. t. 133. **Planta florida.** 1. Flos superne visus. 2, 3. idem inferne visus. 4. Flos transsectus. 5, 6. Fructus. 7, 8. Semina.

GROSSULARIACEAE DC.

Frutices foliis sparsis exstipulatis, membranaceis, coriaceis. Flores hermaphroditi racemosi. Ovarium totum immersum, stylus apice fissus, calyx limbo 5 partito. Stamina uniserialia, petalis alterna, petala 5, calyci alterna. Fructus bacca placentis parietalibus, semina numerosa oblonga in pulpa nidulantia funiculo plus vel minus elongato suspensa, albumen carnosum, embryo minutus ex apice acuto pendulus.

Ribes L.

Calyx urecolatus. Petala 5 in ore calycis in cisuris anteposita. Stamina 5. Pist. stigmata 2—4. Bacca polysperma.

Ribes Grossularia L.

Guimp. t. 23. Engl. Bot. 1292. Sv. Bot. 133. Sturm I. 4. R. Uva crispa Fl. D. 546. Gross. Uva Scop.

Ramis aculeatis, pedunculis unifloris, bracteis tripartitis, baccis glanduloso-hirsutis.

Flor. Aprile, Majo.

Hab. An Felsen im Gebüsch, häufig cultivirt.

Forma: Ribes Uva crispa L.

Ramis aculeatis, pedunculis unifloris, bracteis connato-tubulosis, baccis pilosellis glabrescentibus. Schmidt, ic. t. 1. Fl. D. 546. Reit. et Abel Abb. t. 67. Sturm 14. Guimp. t. 24

Ribes reclinatum L.

Ramis subaculeatis reclinatis pedunculis unifloris, ovarii calycibusque glabris petiolis, foliis bracteisque tripartitis ciliatis, fructu purpureo.

Leon. t. 134. **Ramus floridus.** 1. Flos. 2. idem transsectus. 3, 4. Stamina. 5 Fructus.

Ribes alpinum L.

Flor. D. 968. Jacq. austr. t. 47. Guimp. t. 21. B. Cab. 1486. Sturm 51. Sv. Bot. 223.

Dioicum inerme, racemis erectis, bracteis flore longioribus foliis 3-lobis, subtus lucidis.

Flor. Majo, Junio.

Hab. In Gebirgswäldern durch das ganze südliche und mittlere Gebiet, häufig auch in Böhmen, Sachsen, Thüringen und der Wetterau.

Leon. t. 135. **Ramus floridus.** 1. Flos transsectus. 2. Rudimentum fructus. 3, 4. Stamina.

Ribes rubrum L.

Engl. Bot. 1289. Flor. D. 967. Sturm I. 4. Schk. I. 48. Guimp. t. 19. Sv. Bot. 199. Hayne III. 25. *Grossularia rubra* Scop.

Inerme racemis glabris laxe nutantibus, floribus planatis, foliis obtuse 5 lobis, ramis erectis. Flor. Aprile, Majo.

Hab. Im südlichen Gebiete an Felsen im Gebüsch, in feuchten Wäldern und Hecken, anderwärts verwildert.

Icon. t. 136. **Ramus floridus.** 1. Flos transsectus. 2, 3. Stamina.

Ribes nigrum L.

Engl. Bot. 1291. Fl. D. 556. Guimp. t. 22. Sv. Bot. 169. Hayne III. 26.

Inerme racemis pilosis pendulis, floribus oblongo campanulatis, foliis 3—4 lobis, subtus glandulosis.

Flor. Aprile, Majo.

Hab. In niedrigen Waldungen, an Bächen und Sümpfen, in der Schweiz bei Bern, bei Zürich, in Piemont am M. Cenis, Novarese um Alagna und Ossola, anderwärts häufig cultivirt.

Icon. t. 137. **Ramus floridus.** 1. Flos a latere visus. 2. idem transsectus. 3, 4. Stamina.

Ribes petraeum Wulf.

Jacq. ic. r. t. 49. Guimp. 20. Engl. Bot. 704. Sturm 56.

Inerme, racemis pilosiusculis porrectis floribus planiusculis, foliis acuminato 5 lobatis incisodentatis ciliatis, caule erecto.

Flor. Majo, Junio.

Hab. An Felsen in den Voralpen in Steiermark, Kärnthen, Krain, Kroatien, den Sudeten; in der Schweiz bei Sitten, im Urserthale bei Trient, über Bex au Franchis, M. Suchet, um Longirod, im Veronesischen im Valle die Stagno bei Bassano am Flösschen, in der Region der Tannen und Buchen am Baldo bei i Labaci, Piemont.

Icon. t. 138. **Ramus floridus.** 1. Flos transsectus. 2. Stamen.

Ribes multiflorum Kitaib.

Inerme, racemis multifloris (60—80 flor.), longe pendulis. Pedicellis bracteis longioribus, floribus brevicampanulatis, vel pelviiformibus, vix longioribus eum latioribus. Floribus dilute virescentibus, gemmis purpureis. Petalis emneatis glabris. Foliis 7 cm longis et latis, cordatis, 5 lobis, grosse serratis, subtus tomentosis. Odoris cinicini.

Flor. Majo, Junio.

Hab. Kroatien.

Icon. t. 138a. 1. **Ramus floridus.** 2. Ramus hornotinus. 3. Flos. 4. Fructuum dispositio.

ARALIACEAE JUSS.

Arbores v. frutices, rarius herbae foliis oppositis, integerrimis v. palmatis v. pinnatipartitis v. compositis saepe stipulis. Floribus rarius solitariis, plerumque umbellis, capitulis v. spicis in racemos v. paniculas congregatis. Flos plerumque 5-, rar. 3- — ∞ merus, interdum calyce obsoleto. Stamina rar. plura quam petala. Carp. 1 — ∞ . Fructus baccae v. drupae. 1—8 pyrenis disjunctis.

Hedera L.

Calyx, margo obsolete sinuato — 5-dentatus. Pet. 5 libera plana. Stam. 5. Stylus coalitus, stigm. 1. Drupa 5-pyrena, pyrenae rugulosae.

Hedera Helix L.

Engl. Bot. 1267. Flor. Dan. 1027. Schk. t. 49. Guimp. t. 25. Bull. t. 133. Sv. Bot. 397.

Caule lignoso radicante, foliis coriaceis quinquangularibus quinguelobisque, inflorescentiae propinquis rhombeis acutis, umbella erecta. Truncus compressu in adultioribus 6—8 pollices crassus, cum ramis arboribus murisve radicularum ope affixus, 40—50-pedalis, nonnisi ad muros apricos adultus florens, umbellae simplices densae, racemosae, flores virentes, drupae succulentae nigrae.

Flor. Sept. — Octobr.

Hab. Wälder, Felsen, Mauern, häufig; nur im westlichen und südlichen Gebiet blühend.

Leon. t. 138b. **Ramus florens et folium.** 1. Flos. 2 idem transsectus. 3. Fructus. 4. idem transsectus. 5. Pyrena.

Corrigenda.

- p. 8 lin. 7 lege *θ alternifolium* Nechr.
p. 9 lin. 14 lege *florens*.
p. 11 lin. 24 lege Icon. t. 9. Planta florida. 1 Flos. 2a 6 Semen antice et a latere visum
p. 13 lin. 5 lege *siliquosa*.
p. 14 lin. 24 lege *sem. antice*.
p. 17 lin. 23 lege *nudo*.
p. 20 lin. 14 infra lege Don
p. 26 lin. 14 infra lege *Myriophyllum verticillatum* L.
p. 29 lin. 2 infra lege *Planta minima*.
p. 35 lin. 14 lege *ceterum vide Sedum acre*.
p. 40 lin. 15 lege *in acumine retrorsis*.
lin. 16 lege *Foliis caulinis pilosis*.
p. 49 lin. 2 lege *angustissimo subnullo*.
p. 50 lin. 9 lege *indistincte*.
lin. 18 lege *S. hybrida*.
p. 54 lin. 6 lege Don
p. 55 lin. 15 infra lege *Saxifraga umbrosa* L.
p. 58 lin. 1 lege *distincte*.
p. 60 lin. 3 lege *S. hirta* Haw.
lin. 4 infra lege Don
lin. 20 lege *tenerrimis*.
p. 61 lin. 15 lege Don
p. 61 lin. 8 infra lege *fractis*.
lin. 10 de infra lege *semitereti*.
lin. 16 de infra lege Don
p. 65 lin. 6 lege Don
p. 66 lin. 24 lege Don
p. 68 lin. 3 lege Don

Altera hujus voluminis pars brevi exire incipiet et insignietur
numero XXIV. t. 139 etc.

INDEX.

Adoxa L. 72.

— **Moschatellina** L. 72.

Antiphylla coerulea Haw. 48.

— *retusa* Haw. 48.

— *biflora* Haw. 49.

Antonia v. *St. Antonii* C. Gesn. 7.

Araliaceae Juss. 75.

Bulliarda DC. 30.

— **aquatica** DC. 30.

— Deleuze Till. Vaill. W. 30.

— **Vaillantii** 30.

Cepaea Matthioli Chus. 33.

Ceratophyllaceae Gray. 27.

Ceratophyllum L. 27.

— *apiculatum* Cham. et Schldl. 28.

— **demersum** L. 28.

— *nuticum* Cham. et Schldl. 27.

— *oxyacanthum* Cham. et Schldl. 28.

— **platyacanthum** Cham. et Schldl. 28.

— **submersum** L. 27.

— *verruculosum* Rich. Vaill. 27.

Chamaenerion C. Gesn. 4.

— *alpinum* fol. splend. dent. Lam. 8.

— — minus Tourn. 8, (23).

— *altissimum sylvaticum* Rupp. 4.

— *angustifolium* Scop. 4.

— *alpinum* Tourn. 5.

— *glabrum* Tournef. 20.

— C. Gesn. 4.

— *glabrum latifol. majus* Rupp. 7.

— — minus Rupp. 8.

— *majus* Tournef. 7.

— — minus Tournef. 13.

— *grandiflorum* Mönch. 11.

— *latifolium vulgare* Tournef. 4.

— — *alpinum* Tournef. 6.

— *medium salicariae foliis* Vaill. 20.

— *montanum* Scop. 7.

— *obscurum* Fl. Dan. 14.

— *palustre* Mönch. 20.

Chamaenerion palustre Scop. 5.

— *roseum* Schreb. 13.

— *sextum* C. Gesn. 5.

— *spec. altera* C. Gesn. 13.

— *tetragonum* Scop. 14.

Chondrosea mutata Haw. 44.

— *pyramidalis* Haw. 42.

— *Burseriana* Haw. 45.

— *caesia* Haw. 45.

— *Vandelli* Haw. 46.

— *diapsioides* Haw. 46.

— *intermedia* Haw. 68.

— *tenella* Haw. 51.

Chrysosplenium Tru. 71.

— **alternifolium** L. 71.

— **oppositifolium** L. 71.

Circaea Tourn. 25.

— **alpina** L. 26.

— *alpina* \times *lutetiana*. 25.

— *intermedia* Ehrhart. 25.

— *lutetiana* L. 25.

— *lutetiana* \times *alpina* G. Meyer. 25.

Crassulaceae DC. 29.

Crassula L. 31.

— *caespitosa* Can. 31.

— **Magnolii** Dec. 31.

— **rubens** L. 31.

Dautia palustris Karsch. 25.

Dermasea nivalis Haw. 68.

Epilobium L. 2.

— **adnatum** Griseb. 11.

— *alatum* Hegetschw. 22.

— *alpestre* Jacq. 19.

— — Schmidt 22.

— *alpinum* L. 23.

— — *mutans* Pohl. 18.

— — Willd. 18.

— **alsinefolium** Vill. 21.

— **anagallidifolium** Lamb. 23.

— **angustifolium** L. 4.

- Epilobium angustifolium* γ. L. 6.
 angustissimum Rehb. 6.
 — — Weber. 5.
 — — — cogn. 5.
 — *Antonianum* Al. Juss. 4.
 — *aquaticum* Thunb. 11.
 — *chordorrhizum* Fries. 17.
 — *collinum* Gmel. 8.
 — — — fl. bad. 8.
 — *decurrens* Spreng. 14.
 — *Dodonaei* Villars. 5.
 — — *prosp.* 5.
 — — — α *angustissimum* 5.
 — *Duriaei* Gay. 6.
 — *empetrifolium* Kunze. 23.
 — *flaccidum* Brot. 17.
 — γ *Fleischeri* 5.
 — — — Hochst. 6.
 — fol. (oppositis) ovatis dentatis L. 7.
 — fol. ovato-lanceolatis glabris dentatis Hall. 7.
 — *glabrum* Dill. 7.
 — *grandiflorum* Weber. 11.
 — *heterophyllum* Hegetsch. 18.
 — *hirsutum* L. 11.
 — — — α. *grandiflorum* Vill. 11.
 — *hypericifolium* Tausch. 8.
 — *Lamyi* F. W. Schultz. 15.
 — *lanceolatum* Seb. et Mauri. 9.
 — — — Hook. 9.
 — *latifolium glabrum* Dill. 4.
 — — — *Mattuschka* 1.
 — *molle* Lamb. et DC. 10.
 — *montanum* L. 7.
 — — — β. 8.
 — — — β. *alpestre* Pers. 8.
 — — — β. *lanceolatum* Rehb. Kirschl. 9.
 — — — b. *hypericifolium* Celak. 8.
 — — — δ. *alternifolium* Neilr. 8.
 — — — var. *alsinefolia* Rehb. 8.
 — — — — *parvifol.* Tsch. 8.
 — — — — *collinum* Spreng. 8.
 — — — — *Duriaei* F. W. Schultz. 6.
 — — — — *foliis ternis.* 19.
 — — — — Vill. 19.
 — *mutabile* Wender. 8.
 — *nitidum* Host. 8.
 — — — — Santer. 22.
 — *nutans* Schmidt. 18.
 — *obscurum* Schmidt. 14.
 — — — Schreber. 16.
 — *oliganthum* Michaux. 20.
 Epilobium origanifolium Kirschl. 6.
 — — — Lamb. 21.
 — — *palustre* L. 20.
 — — — β. *nutans* Graeb. 18.
 — — — *tetragonum* Kuntze. 17.
 — — — Vis. 10.
 — *parviflorum* Schreb. 10.
 — *pubescens* 10.
 — *purpurascens* Gilib. 17.
 — *roseo* < *montanum* Rehb. 9.
 — *roseum* Kitaib. 22.
 — *roseum* Schreb. 13.
 — *rosmarinifolium* Hauck. 5.
 — — — β. *alpinum* Lam. et DC. 6.
 — *Schmidtii* Flörke. 22.
 — *spicatum* Lamb. 4.
 — *sudeticum* Beurl. 18.
 — *tetragonum* Pollich. 16.
 — — — β. *Lamyi* F. Schultz. 15.
 — — — β. *pseudo virgatum* F. Schultz. 15.
 — — — β. *caule ramoso* Wender. 17.
 — *tomentosum* Gilib. 20.
 — — — Vent. 11.
 — *Tournefortii* Freyn. 14.
 — *trigonum* Schrank. 19.
 — *vestitum* Benth. 10.
 — *villosum* Besser. 10.
 — — — Thunb. 11.
 — *virgatum* Lamy. 15.
 — — — Spreng. 9, 17.
 — — — β. *lanceolatum* Rehb. 9.
 Geum rotundifolium Moench. 66.
 Grossularia rubra Scop. 74.
 — *Uva* Scop. 75.
 Hedera L. 75.
 — *Helix* L. 75.
 Hermesia spicata Hoppe. 68.
 Hippuridaceae Link. 27.
 Hippuris L. 27.
 — *vulgaris* L. 27.
 Hireulus propinquus Haw. 52.
 — *ranunculoides* Haw. 52.
 Isnardia L. 25.
 — *palustris* L. 25.
 — — — α. *paludosa* Rbh. 25.
 Leptasea aizoides Haw. 52.
 Lobaria ceruna Haw. 66.
 — *arachnoides* Haw. 67.
 Ludwigia palustris Elliot. 25.
 Lysimachia altera 4.
 — *Chamaenerion dicta alpina* C. Baulh. 6.
 — *minor* Tabern. 13.

- Lysimachia omnium maxima* Tabl. 4.
 — *siliquosa glabra minor* C. Bauh. 13.
 — — *purpurea Alpina trifolia* Bocc. 19.
Lythrum L. 28.
 — *acuminatum* Willd. 28.
 — *austriacum* Jacq. 28.
 — *hexagonum* Berchtold. 28.
 Hyssopifolia L. 29.
 hyssopifolium Sm. 29.
 — *parviflorum* Bad. 29.
 Salicaria L. 28.
 — — *γ. gracile* Dec. 28.
 — *virgatum* L. 28.
Mieranthes hieracifolia Haw. 68.
 — *hirta* Haw. 68.
Miscopetalum rotundifolium Haw. 66.
 — — *γ. repandum* Haw. 67.
Muscaria acaulis Haw. 56.
 — *atropurpurea* Haw. 57.
 — *crocea* Haw. 57.
 — *muscoidea* Haw. 56.
 — — *γ. elongella* Haw. 57.
 — *stenopetala* Haw. 60.
Myriophyllum Vaillant. 26.
 — *alterniflorum* DC. 27.
 — *spicatum* L. 26.
 — *verticillatum* L. 26.
Oenothera L. 24.
 — *biennis* L. 24.
 — — *α. A.* Gray. 24.
 — *muricata* L. 24.
Onagraceae Juss. 1.
Onagra biennis Scop. 24.
Parnassia Trin. 72.
 — *alpina* 72.
 — *palustris* L. 72.
Peplis L. 29.
 — *Portula* L. 29.
Pseudolysimachium purpureum L. Dodou. 7.
Rhodiola L. 30.
 — *odorata* Lam. 30.
 — *rosea* L. 30.
Ribes L. 73.
 — *alpinum* L. 73.
 — *Grossularia* L. 73.
 multiflorum Kitaib. 74.
 nigrum L. 74.
 petraeum Wulf. 74.
 reclinatum L. 73.
 — *rubrum* L. 74.
 Uva crispa Fl. D. 73.
 — — — L. 73.
Robertsonia umbrosa brev. et long. Haw. 55.
 — *Geum* Haw. 69.
 — *hirsuta* Haw. 69.
 — *purshata* Haw. 69.
Saxifraga L. 41.
 — *acaulis* Gaud. 56.
 — *adscendens* L. 63.
 — *affinis* Don. 60.
 — *aggregata* 46.
 — *aizoides* L. 52.
 — *Aizoon* Jacq. 43.
 — *alba* Dod. 65.
 — — *petraea* Pona. 64.
 — *Allionii* Baumg. 47.
 Gaud. 57.
 — *altissima* Kerner 43.
 — *ampullacea* Ten. 57.
 — *androsacea* L. 63.
 — — *Comolli* 61.
 — — *latifolia* Sternb. 63.
 — — *γ. tridentata* Gaud. 63.
 — — *trifida* Haw. 63.
 — *angulosa* Schott. 67.
 — *angustifolia* Hall. 62.
 — *annua* Lap. 64.
 — *apennina* Bert. 55.
 — *aphylla* Sternb. 60.
 — — Ten. 61.
 — *arachnoidea* Sternb. 67.
 — *arenarioides* Brign. 51.
 — *aspera* DC. 50.
 — *atropurpurea* hort. 59.
 — — Sternb. 57.
 — *autumnalis* Jacq. 43.
 — — L. 52.
 — *Baumgartenii* Schott. 48.
 — *Besleri* Sternb. 68.
 — *bianca* Calceol. 64.
 — *biflora* All. 49.
 var. L. Gaud. 50.
 brevifolia 43.
 — *bryoides* L. 51.
 — Scop. 46.
 — *bulbifera* L. 65.
 — — *Geners.* 70.
 — — *Gunn.* 66.
 — *Burseriana* L. 45.
 — — *γ. Vand.* 46.
 — — var. L. 46.
 — *Caesia* L. 45.
 — — Scop. 47.
 — — *γ. Lam.* 46.

- Saxifraga Caesia* γ. Du. 46.
caespitosa Baker. 58.
 — — Koch. 58.
 — — L. 56.
 — — β. Smith. 59.
 — — α. compacta Koch. 59.
 — — γ. sponhemica Koch. 60.
 — — var. Lap. 57.
 — — Wlbbg. 58.
 — — Wulf. 47.
 — *callosa* Smith. 44.
 — *capillipes* Rehb. 55.
 — *carnea* Luce. 65.
 — *carpathica* Rehb. 79.
 — *ceratophylla* hort. 60.
 — *cernua* L. 66.
 — — β. pauciflora Sternb. 66.
 — *citrina* Hegetschw. 62.
 — *Clusii*. 53.
 — *Clusii* Gouan. 54.
 — *coerulea* Lap. 48.
 — *compacta* Merk. et Koch. 56.
 — *condensata* Gmel. 59.
 — *controversa* Sternb. 63.
 — *corymbosa* Luce. 65.
 — *Cotyledon* L. 42.
 — — E. L. 43.
 — — var. γ. Vitm. 54.
 — — Wulf. 43.
 — *crocea* Gaud. 57.
 — *crustata* Vest. 44.
 — *cuneifolia* L. 54.
 — — var. Reut. 55.
 — *Cymbalaria* Torr. 66.
 — *cymosa* W. K. 47.
 — *daurica* Schleich. 54.
 — *decipiens* Ehrh. 58.
 — — var. *acutifolia* Sternb. 60.
 — — — *quinquefida* Haw. 59.
 — *dentata* L. K. 69.
 — *depressa* Sternb. 63.
 — *diapensioides* Bell. 46.
 — *elatior*. 43.
 — — M. K. 68.
 — *elongella* Haw. 57.
 — — Smith. 60.
 — *elongata* Engl. 43.
 — — Gaud. 51.
 — — Panz. 59.
 — *euhyponoides* var. *gemmifera* Syme. 60.
 — *exarata* Vill. 57, (58).
 — — Vill. var. β. 58.
 — *Saxifraga exarata* α. major Ser. 58.
 — — α. compacta Koch. 58.
 — *excavata* Kze. 54.
 — *Facchinii* Koch. 62.
 — *geranoides* hort. 59.
 — — Host. 64.
 — **Geum** L. 69.
 — — Sternb. 69.
 — *glabrata* Sternb. 53.
 — *glandulosa* 56.
 — — Griseb. 67.
 — *glauca* Murrith. 46.
 — *gracilis* Engl. 43.
 — **granulata** L. 65.
 — — Poll. 65.
 — *groenlandica* L. 59.
 — *heterophylla* Sternb. 47.
 — *Heuffelii* Schott. 67.
 — *hibernica* Haw. 59.
 — *hieracifolia* W. K. 68.
 — **Hirculus** L. 52.
 — *hirsuta* L. 69.
 — — L. γ. Jenm. Walk. 69.
 — *hirta* Don. 59.
 — — Haw. 60.
 — *hispidula* Rochel. 53.
 — **Hostii** Tausch. 68.
 — *hybrida* Kerner 59.
 — *hypnoides* All. 58.
 — — Dub. 59.
 — **hypnoides** L. 60.
 — — Scop. 63.
 — *hypnoides* δ. *villosa* Walk. 59.
 — — Vitm. 56.
 — *imbricata* Bert. 47.
 — — Lam. 48.
 — *incurvifolia* Don. 59.
 — *intermedia* Gaud. 58.
 — — Hegetschw. 51.
 — — Tausch. 59.
 — **Kochii** Hornung. 50, (59).
 — *laetevirens* Don. 60.
 — *laevis* Haw. 60.
 — *lanceolata* Kitaib. 63.
 — *Lapeyrousii* Don. 70.
 — — Sternb. 59.
 — *lasiophylla* Schott. 67.
 — *latifida* Don. 59.
 — *latifolia* Ser. 59.
 — *laxa* Koch. 58.
 — — Sternb. 57.
 — *leptophylla* Froel. 60.

- Saxifraga leucantha* Thomas 58.
leucanthemifolia Lap. 54.
 — **lingulata** Bell. 54.
 γ. *media* Don. 68.
longifolia Host. 68.
 — *media* Schleich. 43.
 γ. *media* Sternb. 68.
 γ. Ser. 54.
 γ. *minor* Sternb. et Ser. 44.
longiscapa Don. 68.
lutea Gilib. 52.
luteo-viridis Schott. et Kotschy. 70.
 — *luteo-purpurea* W. K. 70.
 var. *Herb.* 70.
 — **macropetala** Kerner. 50.
 — *maculata* Rehb. 58.
moschata Wulf. 56, 56.
 — — *γ*. Lap. 57.
 — *multicaulis* Lge. 54.
 — *multiflora* Ehrh. 42.
 — **mutata** L. 44.
 — *muscoides* All. 61.
 — 56.
 — — Wulf. 56.
 — — *α*. *hemisphaerica* Sternb. 56.
 — — var. *acaulis* Gaud. 56.
 — — *γ*. *purpurea* Sternb. 57.
 — — *α*. *lineata* Sternb. 57.
 — *muscosa* Suter. 56.
 — *nigricans* Fisch. 68.
 — *nitida* Schreb. 51.
 — **nivalis** L. 68.
 var. *racemosa* Towns. 68.
 — *nutans* Adams 52.
obovata Engl. 53.
 — **oppositifolia** L. 48.
 L. var. *γ*. Willd. 48.
 γ. Willd. 49.
 var. *γ*. Willd. 48.
 — Reiner et Hohenwart. 49.
 γ. *billora* 50.
palinata Smith. 59.
 Sternb. 58.
 — *paradoxa* Kitaib. 57.
pauciflora Engl. 54.
 Ser. 42.
 — — Sternb. 68.
 — *pedatifida* hort. 60.
 — **pedemontana** All. 47.
 — **petraea** (Sonn.) L. 64.
 petraea Gumm. 63.
 — *petraea* Roth. 59.
Saxifraga planifolia Lap. 61.
 — — *γ*. *Seguierii* Sternb. 62.
plantaginifolia Hook. 68.
 — *platypetala* Smith. 59.
 — *polita* Haw. 69.
porphyrantha hort. 57.
 — *primulaefolia* Willd. 67.
propinqua B. Br. 52.
pseudocaesia Rochel. 47.
 — *punctata* Gummer. 51.
 Rothb. 68.
pungens Clair. 46.
 — *purpurata* Gaud. 42.
purpurea All. 48.
 — *pygmaea* Haw. 57.
 — *pyramidalis* Lap. 42.
 — Ten. 54.
 — *pyramidata* Mill. 42.
pyrenaica Scop. 63.
 — Vill. 56.
 — *ramosa* Gmel. 66.
 — *ramosissima* Schur. 63.
 — *recurvifolia* Lap. 45.
Redowskyi Adams. 53.
 — *repanda* Willd. 67.
 — **retusa** Gouan. 48.
 — *rhaetica* Kerner. 69.
Rhei Schott. 57.
 — *rigens* vel *rigida* Kitaib. 47.
 — *rigida* Chr. Sm. 68.
 — *rivularis* Rochel. 70.
 — *Robertsonia cuneifolia* Haw. 51.
 — *robusta* Engl. 43, (53).
 — **Rocheliana** Sternb. 47.
 — *rosea* Lap. 49.
rosularis Schleich. 43.
 — *rosulenta* Ehrh. 43.
 — **rotundifolia** L. 66, (67).
 — — *γ*. *hirsuta* Sternb. 67.
 — — *alba* Bauh. 65.
 — **Rudolphiana** Hornschuch. 49.
 — *rupestris* Lap. 63.
 — — Willd. 64.
 — *saginoidea* Froel. 61.
 — *scariosa* Schleich. 60.
 — *serobiculata* Schur. 48.
 — *secunda* Mor. 56.
 — **sedoides** L. 61.
 — *sedoides* *γ*. Don. 60.
 — — Hort. 60.
 — — Whlbg. 62.
 — *Seguieri* 61.

Saxifraga Seguieri Spreng. 62.

- — var. γ . Haw. 61.
- serrata hort. 59.
- sibirica Sternb. 67.
- — Torr. et Gr. 66.
- — Wahlbg. 70.
- spathularis Brot. 55.
- sponhemica Gmel. 59.
- spuria Kerner. 50.
- squarrosa Sieber 47.
- Steinmanii Tausch. 59.
- stellaris L. 53.
- — β . leucanthemifolia Hausm. 53.
- — β . — Duch. 54.
- stenopetala Gaud. 60.
- Stephaniana hort. 59.
- Sternbergii Willd. 59.
- striata Hall. 58.
- styriaca Kerner. 43.
- subintegra Ser. 55.
- submutica Hort. 43.
- superbiflora \times oppositifolia Kerner. 50.
- tecta Kit. 70.
- tenella Wulf. 51.
- tenera Sternb. 63.
- — Sut. 61.
- transsilvanica Willd. 70.
- trichodes Scop. 61.
- tridactylites L. 64.
- — L. β . alpicola Mor. 63.
- — var. β . alpina L. 63.
- tridentata Don. 59.
- trifida Gilib. 64.
- — Haw. 60.
- uliginosa Fisch. 68.
- umbrosa L. 55.
- — d. crenata Ser. 55.
- — punctata Smith. 69.
- uniflora Froel. 60.
- VahlII Ram. 63.
- Vandellii Sternb. 46.
- varians Sieber 56.
- veronicaefolia Pers. 65.
- villosa Willd. 59.
- vivipara Vest. 65.
- Wulfeniana 48.

Sedum L. 31.


- acre L. 33.
- aestivum All. S. 34.
- albellum Bess. 34.
- (— album M. B.) 34.
- album L. 34.

Sedum alpestre Vill. 35.

- Anacampseros L. 32.
- annuum L. 34.
- anopetalum DC. 35.
- atratum L. 34.
- boloniense Loiseleur 35.
- caespitosum Dec. 31.
- Cepaea L. 33.
- cruciatum Desf. 37.
- dasyphyllum L. 35.
- divaricatum Lap. 34.
- elegans Lej. 36.
- Fabaria Koch. 32.
- galioides All. 33.
- glanduliferum Guss. 35.
- glaucum Don. 36.
- — W. Kit. 33.
- Guettardi Gmel. 33.
- haematodes Scop. M. 34.
- hispanicum L. 33.
- hybridum L. 37, (32).
- latifolium Bertol. 32.
- lividum Bernhardi 31.
- maximum Suter 32.
- monregalense Balb. 37.
- ochroleucum Vill. 35.
- Oederi Rtz. 34.
- oppositifolium L. 36.
- purpurascens Koch. 31.
- purpureum 32.
- purpureum Link. (et Tausch.) 31.
- recurvatum W. 36.
- reflexum L. 35.
- — L. var. glaucum 36.
- repens Schleich. 35.
- Rhodiola DC. 30.
- roseum Scop. 30.
- rubens HAUKE. 35.
- — L. 31.
- — Mattuschka 35.
- rupestre L. 35.
- — L. var. glaucum 36.
- — var. recurvatum Rehb. 36.
- — Vill. Rehb. 35.
- saxatile All. 35.
- — Wigg. 34.
- schistosum Lej. 35.
- sexangulare 35.
- sexfidum M. B. 33.
- spatulatum W. Kitaib. 33.
- spurium M. Biel. 32.
- stellatum L. 33.


Sedum tectorum Scop. 38.
Telephium Sm. 31.
 — var. *b. purpureum* L. 31.
 — var. *d. et e.* L. 32.
tevericum Rosbach. 36.
villosum L. 34.
virens Ait. 35.
Sempervivum L. 37.
acuminatum Schott. 38.
angustifolium Kern. 37.
arachnoideum L. 40.
arenarium Schott. 40.
Braunii Funk. 39.
Funkii B. Br. 39.
Gaudinii Christ. 39.
globbiterum Mill. 38.
 — *Wulf.* 39.
 — *hirtum* L. 40.
Mettenianum Lehmann et Schumacher.
 — *montanum* L. 38.
 — *Neilreichii* Schott. 41.
 — *pet. fimb. sobole* Schumacher.
Pittonii Schott. 39.

Sempervivum rupicolum Kern. 40.
soboliferum Sims. 38.
tectorum L. 38.
Wulfenii Hoppe 39.
Spathularia Clusii Haw. 54.
 — *stellaris* Haw. 53.
Telephium hispanicum L. Clus. 32.
Tillaea aquatica L. 39.
 — *Lam. Vaill.* 39.
erecta Saus. 31.
Micheli 29.
muscosa L. 39.
prostrata Schkuhr 39.
rubra Geu. 31.
Vaill. W. 39.
Trapa L. 26.
natans L. 26.
Tridaetylites annua Haw. 64.
 — *petraea* Haw. 63.
Umbilicus DC. 41.
 — *pendulinus* DC. 41.
Zahlbrucknera Rehb. 70.
 — *paradoxa* Rehb. 71.



Epilobium angustifolium L.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN



Epilobium Dedenacei Villars & angustissimum


LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN



Epilobium Sedgwickii Tatters & Henschen



Epilobium curvum Gay



Epilobium montanum L.



Sparganium angustifolium Michx.



Epilebium hypericifolium Rich

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.



Epilobium lanceolatum Sch. et Mauri

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN




Epilobium parviflorum Schreb.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN



LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN



Epilobium roseum Schreb.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.



Epilobium adnatum Presl

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.



Epilobium tamys F. Schultz

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.



Epilobium alpinum Sw.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN



Epilobium nutans Schmelt

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN



Epilobium trigynum Schrank




Epilobium pulchellum L.



Epilobium alpinogebum Vitt

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.



Epilegium anagallidifolium Lam

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.



Conoclinium bonariense L.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN



Conoclinium surculum L.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN



Isocardia palustris 1

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN



Circaea lutetiana L.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN




Ceratophyllum demersum L.




Verbena alpina - 1


LIBRARY
DENT
2011
CL 5




Urtica dioica L.




Myriophyllum verticillatum L.




Myricophyllum spicatum L.



Myriophyllum alterniflorum DC.



Heppia vulgaris L.




Ceratophyllum submersum L.




Ceratophyllum demersum L.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.




Cratogeomys platycanthus Cham et Schlecht

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.




Lythrum salicaria L.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.




Lythrum virgatum L.



Lylthrum hyssopifolium L.



Peplis Portula L.



Tillaea muscosa L.



Portulaca aquatica L.



Bullardia bullantii DC




Phedicta rosea L.



C. rubra L.



Crucifera Magnolia 11



Sedum purpureum Andrz.



Adiantum maximum Sw.



Sedum spectabile - H. Pick.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.



Adum - Tabaria - Hoch

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.




Sedum spectabile L.



Sedum stellatum L.






I



II



I *Sedum acre* L. II *S. hispanicum* L.




Sedum album L.



Adiantum atratum L.



Salix annua L.



Sedum album L.



Sedum densifolium L.



Salicornia tetraedra (L.)




Androsace repens Ledeb.



Phacelia heterophylla Nutt.



Sedum reflexum L.



Sedum elegans L.



telum glaucum n. s. n.



Sedum oppositifolium Sims.


LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.



Sedum hybridum L.




Sedum monregalense - Bull




Empetrum angustifolium Bern




Empetrum nigrum (L.)



Empetrum nigrum L.



Imperium montanum L.



Empetrum Hulpea Hoppo




Lemniscum Funkii Br.



Empetrum - Braun - Tunk



Lemnaceae arachnoides L.




Lemperocarpum hirtum L.



Empetrum nigrum (L.)

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.



Empetrum nigrum L.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.



Umbilicus pendulinus L.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN



Umbelularia penduliflora L.




Leucophaea cotyledon L.




Laryngis tixoon Jacq.



Laryngis albastrina Kerner



Saxifraga crustata Vest.



Lasiopogon multicaulis L.



I. *Asplenium adnigrum* L.


II. *Asplenium adnigrum* L.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.



Leuzopogon Lindleyi, Steud.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.



Lycopodium diaphanostichum Bull



La. repens aquatica - tuber



Leucophaea polystachya Steud.



Coriandrum pedunculatum - Willd.



Leucophaea retusa Linn.



A *Lasiacis oppositifolia* L.



B *Lasiacis bitoria* All.






La. cypraea macrophylla Turner




Leucophaea - Hechtia Weinm.




Lasiacis aspera 11



Saxifraga hypnoides L.




Eragrostis tenella Willd.



Taraxacum officinale L.



L. virginica *Viridula*



Saxifraga stellaris L.



lasioptera Clusi. Gouan




Lespedeza bicolor Willd

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.



Saxifraga cuneifolia L.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.



Saxifraga umbrosa L.



Larix morschuta Wulf. ? *glandulosa*



Saxifraga cernuola Till



Leontodon autumnalis L.



Saxifraga oppositifolia Sm.




Leucophaea hypnoides 1




Saxifraga stenopetala Griseb.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.



La. repens subulosa 1

CHERRY
AND
BUTTERFLY
GARDEN.



Laevoprasa planifolia Lape
et *monensis* Lill

LIBRARY
NEW
BOTANICAL
GARDEN



Leucophaea nivalis (L.) Tuckerm. - lichen

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.



Leucophaea leucophaea m.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.




Saxifraga umbrosa 1

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN



Laryngis adscendens 1



Verbena nudicaulis L.



Taraxacum officinale 1




Saxifraga granulata L.




Leucophaea bulbifera L.



Ascyragia cornuta L.



Saxifraga rotundifolia L.




Ranunculus flammula Schott



Taraxacum arachnoides Sternberg.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.



Saxifraga nivalis L.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.



Chrysopsis leucopetala H. et A.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN



Taraxacum officinale Hostia Tausch



Taraxacum officinale



Lysytraga hirsuta L.



Asclepias tuberosa var. *viridis* Schott et G. Schuy

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.



Saxifraga carpathica Richt.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.




1894. 10

Zahlbrucknera paradoxa Richt.

LIBRARY
MICHIGAN
BOTANICAL
GARDEN



Chrysosplenium alternifolium L.



Chrysosplenium oppositifolium L.



2



3



1




4




5

Parnassia alpina





Adonis meschiatellina /




Ribes Grossularia L.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.



Ribes alpinum L.


LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.



Rubus rubrum L.



Rubus nigrum L.



Rubus petraeum Wulf



Ribes multiflorum Sibth.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.




Mimosa Mucosa L.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

OK281 .R4 v.23
Reichenbach, H. G. / Icones florum Germani

gen



3 5185 00103 7181

